

Von den Eiern, die dort ausgenommen wurden, hat der Herr Oberförster Wiese seinem Freunde, dem Rector Pässler gesandt. Ein Exemplar vom Natternadler habe ich vor drei Jahren mitgenommen nach Stettin, um es dort dem Geh. Regierungs-Rath Schmidt vorzuzeigen, welcher es wegen seiner Grösse nicht anerkennen will. Betrachtet man das Verhältniss des gedrungenen Körpers von *Aquila brachydactyla* und das von *Aq. naevia* oder *haliaëtos*, so scheint das Ei gar nicht zu gross zu sein. Bis jetzt ist mir in Pommern kein anderer Ort bekannt, wo der Schlangennadler genistet hat. Ob der Conservator Schilling, nach dem *Aq. leucopsis* in Pommern nisten soll, ihn wirklich nistend gefunden hat, ist sehr zu bezweifeln, da dieser Ornitholog im vergangenen Jahre das ächte Ei noch nicht gekannt hat; denn er glaubte noch, dass das Ei dieses Adlers roth gefleckt sei, was er auch zu dem Herrn Geh. Reg.-Rath Schmidt geäussert hat.

Berlin, im Juni 1851.

T. Krüper.

Verzeichniss der in der Umgegend von Tanger und im nördlichen Fez vorkommenden Vögel. *)

Von

Carstensen, Stud. medic.

(NB. Die mit gesperrter Schrift gedruckten Species sind brütend aufgefunden.)

<i>Cathartes Percnopterus</i>	<i>Milvus ater</i>
<i>Vultur Kolbii</i>	„ <i>regalis</i>
<i>Aquila imperialis</i>	<i>Naucerus furcatus</i>
„ <i>Bonellii</i>	(Einmal in 14 Jahren!)
„ <i>pennata</i>	<i>Elanus melanopterus</i>
<i>Pandion haliaëtos</i>	<i>Falco Feldeggii</i>
<i>Circaëtos brachydactylus</i>	„ <i>peregrinus</i>
<i>Buteo vulgaris</i>	„ <i>subbuteo</i>
<i>Pernis apivorus</i>	„ <i>aesalon</i>

*) Die auf der N.-W. Küste Afrika's vorkommenden Vögel sind für die europäische Ornithologie um so wichtiger, als eine Anzahl derselben sicher und wahrscheinlich dem Süden der pyrenäischen Halbinsel — dieser *terra incognita* in so vielem Bezug — angehören. So z. B. *Strix capensis*, Smith, sicher, und wahrscheinlich u. a. *Parus ultramarinus*, *Picus numidicus* etc.

Falco cenchris
 „ *tinnunculus*
Astur palumbarius
Accipiter nisus
Accipiter Gabar
Circus rufus
 „ *cyanus*
 „ *cineraceus*
Syrnium aluco
Athene noctua
Strix flammea
Otus brachyotus
 „ *capensis*
Scops carniolica
Caprimulgus ruficollis
 „ *europaeus*
Cypselus melba (bei Gibraltar)
 „ *apus*
Hirundo riparia (selten!)
 „ *rupestris*
 „ *rustica*
 „ *urbica*
Merops apiaster
Alcedo rudis (am Tetuanflusse)
 „ *ispida*
Coracias garrula
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
 „ *numidicus* (wahrscheinlich auch in Spanien)
Coccyzus glandarius
Cuculus canorus
Lanius excubitor (sehr selten!)
 „ *meridionalis*
 „ *rufus*
 „ *cucullatus*
Muscicapa collaris
 „ *atricapilla*

Muscicapa grisola
Saxicola oenanthe
 „ *aurita*
 „ *stapazina*
Pratincola rubicola
 „ *rubetra*
Ruticilla atra
 „ *phoenicurus*
Petrocossyphus cyanus
Turdus torquatus
 „ *merula*
 „ *viscivorus*
 „ *musicus*
Agrobates galactodes
Ixos obscurus
Cyanecula suecica
 „ *coerulecula*
Luscinia aëdon
Sylvia orphea
 „ *cinerea*
 „ *conspicillata*
 „ *subalpina*
 „ *provincialis*
 „ *melanocephala*
 „ *hortensis*
 „ *atricapilla*
Phyllopneuste sibilatrix
 „ *icterina*
 „ *trochilus*
 „ *rufa*
 „ *Nattereri*
Hypolais olivetorum
 „ *vulgaris*
 „ *elaica*
Calamoherpe phragmitis
 „ *aquatica*
 „ *cisticola*
 „ *fluviatilis*
Troglodytes parvulus

Parus major (sehr selten)	Pterocles alchata, südlicher
" ultramarinus	Perdix francolinus (im Innern!)
Pyrhcorax Graculus	" petrosa
" alpinus	Coturnix communis
Corvus Corax	Hemipodius andalusicus
Pica melanoleuca	Cursor isabellinus
" cyanea	Glareola pratincola
Sturnus vulgaris	Otis tarda
" unicolor	" tetrax
Oriolus Galbula	Oedienemus crepitans
Motacilla Yarrellii	Aegialites hiaticula
" alba	" minor
" sulphurea	" cantianus
Budytes flava	Charadrius morinellus
" flaveola	" pluvialis
Anthus arboreus	" squatarola
" pratensis	Vanellus cristatus
" cervinus	Streptilas interpres
" aquaticus	Haematopus ostralegus
" campestris	Calidris arenaria
Alauda arborea	Pelidna minuta
" cristata	" alpina
" arvensis	" subarquata
" brachydactyla	Tringa canutus
" Calandra	Machetes pugnax
Emberiza hortulana	Actitis hypoleucos
" cirrus	Totanus glottis
Fringilla coelebs (var.)	" ochropus
" montifringilla	" Calidris
" domestica	Himantopus rufipes
" serinus	Recurvirostra avocetta
" cannabina	Telmatias gallinula
" carduelis	" gallinago
Loxia coccothraustes (sehr selten)	Scolopax rusticola
Columba livia	Limosa melanura
" oenas	" rufa
" palumbus	Numenius phaeopus
" turtur	" arquatus
Pterocles arenarius, südlicher	Ibis falcinellus

<i>Ardea cinerea</i>	<i>Larus glaucus</i>
„ <i>purpurea</i>	„ <i>marinus</i>
„ <i>garzetta</i>	<i>Lestris pomarinus</i>
„ <i>bubulcus</i> (Verany?)	„ <i>parasita</i>
„ <i>comata</i>	<i>Lestris Buffonii</i>
<i>Botaurus minutus</i>	<i>Thalassidroma Bulweri</i>
„ <i>stellaris</i>	<i>Puffinus cinereus</i>
<i>Nycticorax communis</i>	<i>Sula alba</i>
<i>Ciconia nigra</i>	<i>Phalacrocorax Cormoranus</i>
„ <i>alba</i>	„ <i>Desmarestii</i>
<i>Platalea leucorodia</i>	<i>Anser cinereus</i>
<i>Phoenicopterus antiquorum</i>	„ <i>segetum</i>
<i>Grus cinerea</i>	„ <i>aegyptiacus</i>
„ <i>virgo</i>	<i>Cygnus olor</i>
<i>Crex pratensis</i>	<i>Anas tadorna</i>
<i>Rallus aquaticus</i>	„ <i>rutila</i>
<i>Gallinula porzana</i>	„ <i>boschas</i>
<i>Stagnicola chloropus</i>	„ <i>strepera</i>
<i>Porphyrio hyacinthinus</i>	„ <i>pehelope</i>
<i>Fulica atra</i>	„ <i>acuta</i>
„ <i>cristata</i>	„ <i>querquedula</i>
<i>Sterna nigra</i>	„ <i>crecca</i>
„ <i>leucoptera</i>	„ <i>clypeata</i>
„ <i>leucopareia</i>	„ <i>angustirostris</i>
„ <i>minuta</i>	<i>Platypus niger</i>
„ <i>fluviatilis</i>	„ <i>fuscus</i>
„ <i>affinis</i>	„ <i>leucocephalus</i>
„ <i>cantiaca</i>	„ <i>rufinus</i>
„ <i>caspia</i> , nur ein Exemplar	„ <i>ferinus</i>
im Winterkleide, in vier	„ <i>fuligulus</i>
Jahren.	„ <i>leucophthalmos</i>
<i>Xema ridibundum</i>	<i>Podiceps minor</i>
<i>Larus tridactylus</i>	„ <i>cornutus</i>
„ <i>canus</i>	„ <i>cristatus</i>
„ <i>cachinnans?</i>	<i>Lunda fratercula</i>
„ <i>fuscus</i>	<i>Alca torda</i>

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [2_1](#)

Autor(en)/Author(s): Carstensen

Artikel/Article: [Verzeichniss der in der Umgegend von Tanger und im nördlichen Fez vorkommenden Vögel. 76-79](#)