

Das Gewicht unausgeblasener von 80 — 83 — 96 Gran, ausgeblasen der kleineren Art 82—87 Gran, 9 — 10 Gran. von der grösseren 101, ausgeblasene 11—12 Gran, das Ei glatter, die Poren merklich schwächer wie bei *Crex pratensis*.

Die Eier der Rallen sind denn im Allgemeinen grösser, bauchiger, dunkler gefärbt und schwerer wie die vom Wachtelkönig.

Hier endige ich meine Mittheilungen, vermögen sie den Leser nicht einzunehmen, was leicht zu begreifen ist, so werden sie gewiss in ihm die Lust erwecken, wenn er nicht wasserscheu ist, diesen so possi-lichen Vogel beim Neste zu beobachten, und ich kann den Forscher ver-sichern, dass er sich mehr unterhalten und lachen wird, als beim An-hören der besten Posse im Theater.

Krakau, den 9. Juni 1853.

Graf Wodzicki.

Verzeichniß

derjenigen Vögel, welche als Stand-, Zug- oder Strich-Vögel in Thüringen — in dem Distrikt, welchen die Saale bis Naumburg, die Unstruth bis Artern, der Harz, die Linie von Ellrich bis Witzzenhausen und endlich die Linie von der Werra bis zum Fichtelgebirge einschliesst — vorkommen.

Zeichen für die Namen der Naturforscher, nach welchen die Vögel benannt sind.

B. Bechstein.	C. Cuvier.	Lath. Latham.	M. Meyer.	W. Wolf.
Br. Brehm.	G. Gmelin.	L. Linné.	P. Pallas.	S. Savigny.
Briss. Brisson.	J. Illiger.	Leisl. Leissler.	T. Temminck.	

Ordnung I. Raubvögel. Accipitres. A. Tag-Raubvögel.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.				Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.				
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Jeden Winter.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.
						Manchen Winter.	Winter.			
a. Geierartige. Vulturidae. Vocat.										
b. Falkenartige Raubvögel Falco- nidae.										
Falke. Falco.										
Edle Falken. Falco. B.										
Wahre Falken, mit schar- fem Zahn. Falco.										
Falco peregrinus. Wanderfalke. L.	49	0								
„ subbuteo. Baumfalke. L.	50	—	—	000						
„ rufiges. Besecke. rothfüs- Lat. 1.		1	—	1						

Ordnung I.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
siger Falke, bei Gotha ge- schossen	52	—	—	—	—	—	—	—	***	
Falco aesalon. L. Zwergfalke .	51	—	—	—	*	—	—	—	—	
„ tinnunculus. L. Thurm- falke	54	—	—	000	—	—	—	—	—	
Unedle Falken.										
Adler. Aquila. C.										
Eigentliche Adler.										
Falco fulvus. L. Stein-Adler .	13	—	—	—	—	—	—	**	—	
„ imperialis. T. Kaiser-Adler.	14	—	—	—	—	—	—	—	***	
„ naevius. L. Schrei-Adler bei Neudietendorf, Arles- berg und Mühlhausen ge- schossen	19	—	—	—	—	—	—	—	***	
Fisch-Adler. C.										
Falco ossifragus. L. See-Adler	22	—	—	—	—	—	—	**	—	
„ leucocephalus. L. Weiss- köpfiger Adler	24	—	—	—	—	—	—	—	***	
Balbussarde. Savigny.										
Falco haliaëtus. L. Fluss-Adler	27	—	—	—	—	—	*	—	—	
Habichte. C.										
Falco pakumbarius. L. Tauben- habicht	39	0	—	—	—	—	—	—	—	
„ nisus. L. Sperber . . .	40	0	—	—	—	—	—	—	—	
Milanen. Milvus. B.										
Falco milvus. L. Rother Milan.	30	—	—	000	—	—	—	—	—	
„ fusco-ater. W. Rothbrauner Milan bei Weihe . . .	31	—	—	000	—	—	—	—	—	
Wespenbussard. Pernis.										
Falco apivorus. L. Wespenfalke.	36	—	—	000	—	—	—	—	—	
Bussarde. Buteo.										
Falco lagopus. L. Rauchfüssiger Falke	34	—	—	—	*	—	—	—	—	
„ buteo. L. Mäusefalke . .	33	—	00	—	—	—	—	—	—	
Weihen.										
Falco pygargus. L. Kornweihe	59	—	—	000	—	—	—	—	—	
„ cinerascens. M. GraueWeihe	60	—	—	000	—	—	—	—	—	
„ rufus. L. Rohrweihe . .	58	—	—	000	—	—	—	—	—	
B. Nächtliche Raubvögel.										
Eule. Strix.										
Ohrkauz. Otus. C.										
Strix otus. L. Mittlere Ohreule	78	0	—	—	—	—	—	—	—	
„ brachyotus. L. Kurzhörige Eule	79	—	—	—	*	—	—	—	—	
Schleier-Eulen. Strix exclusive. S.										
Strix flammea. L. Schleiereule	72	0	—	—	—	—	—	—	—	
Lat. 2.		4	1	7	3	—	1	2	4	

Ordnung II.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.			Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Eulen.										
Strix aluco. L. Nachtteule . .	70	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Uhus. Bubo. C.										
Strix bubo. L. Uhu	76	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Habichtseulen. Noctua. S.										
Strix nisoria. M. Spereule bei Ruhla geschossen . .	68	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ dasypus. B. Raufhü- ger Kautz	74	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ passerina. L. Kleiner Kautz	73	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Ohreulen. Scops. S.										
Strix scops. L. Kleine Ohreule bei Arlesberg geschossen	80	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Ordnung II.										
Sperlingsartige Vögel. Passeres.										
<i>A. An denen die äussere Zehe mit der inneren verbunden ist.</i>										
<i>Insectivorae. T.</i>										
Zahnsehnäbler. Dentiroses.										
Würger. Lanius. L.										
Lanius excubitor. L. Grosser grauer Würger	84	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ minor. L. Schwarzstirniger Würger	86	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ rufus. Rothköpfiger Wür- ger	88	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ spinitorquus. B. Dorn- dreher	89	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Eigentliche Fliegenfänger.										
Muscicapa grisola. L. Gefleckter Fliegenfänger	378	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ atricapilla. L. Schwarz- rückiger Fliegenfäng.	382	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ collaris. B. Halsband Fliegenfänger	379	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Seidenschwänze. Bombycivora. T.										
Bombycivora garrula. T. Euro- päischer Seidenschwanz	980	—	—	—	—	**	—	—	—	—
Drosseln. Turdus. L.										
Turdus merula. L. Schwarzdrossel	300	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ torquatus. L. Ringdrossel	301	—	—	—	*	—	—	—	—	—
„ viscivorus. L. Misteldrossel	293	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ pilaris. L. Wachholder- drossel	295	—	—	—	*	—	—	—	—	—
„ musicus. L. Singdrossel	294	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ iliacus. L. Rothdrossel	297	—	—	—	—	—	*	—	—	—
Lat. 3.		6	—	8	2	1	1	—	—	2

Ordnung II.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Wahre Pirole. Oriolus. L.										
Oriolus galbula. L. Europäischer Pirol	114	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Wasserschwätzer. Cinclus.										
Cinclus aquaticus. B. Weiss- bäuchiger Wasserschwätzer	289	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Feinschnäbler. Motacilla. L.										
Steinschmätzer. Saxicola. B.										
Saxicola rubicola. B. Schwarz- kehliger Steinschmätzer	315	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ rubetra. B. Braunkehl- cher Steinschmätzer	314	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ oenanthe. B. Grau- rückiger Steinschmätzer	309	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Sänger. Sylvia. M.										
Rothschwänzchen. Rubie- thes.										
Sylvia rubecula. Lath. Roth- kehlchen	352	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ suecica. Lath. Blaukehl- chen	341	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ phoenicurus. Latham. Schwarzkehlchen	348	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ titiys. Lath. Schwarz- bäuchig. Rothkehlchen .	350	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Grasmücken. Curruca. B.										
Sylvia luscini. Lath. Nachtigall	322	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ turdoides. M. Drossel- sänger	353	—	—	—	—	—	—	—	***	—
„ arundinacea. Lath. Rohr- sänger	354	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ palustris. B. Sumpfsän- ger	356	—	—	—	—	—	—	**	—	—
„ aquatica. T. Binsensän- ger	364	—	—	—	—	—	—	**	—	—
„ hortensis. Lath. Garten- sänger	328	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ atricapilla. Lath. Schwarz- scheitlicher Sänger . .	329	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ cinerea. B. Fahler Sänger	330	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ garrula. B. Klapper-Sän- ger	332	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Laubvögel. Regulus.										
Sylvia regulus. Gekrönter Sänger	374	—	—	—	*	—	—	—	—	—
„ ignicapilla. Br. Feuer- köpfiger Sänger	376	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ hypolais. Lath. Gelbbäu- chiger Sänger	369	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ sibilatrix. B. Grauer Sänger	370	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Lat. 4.		1	—	17	1	—	—	2	1	

Ordnung II.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Sylvia fitis. B. Fitis-Sänger . . .	373	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ rufa. Lath. Weiden-Sän- ger	374	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Zaunkönige. Troglodytes. C. Sylvia troglodytes. Lath. Zaun- könig	218	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Flüevogel. Accentor. Accentor modularis. Koch. Schie- ferbrüstiger F.	255	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Wahre Bachstelzen. Mota- cilla. C. Motacilla alba. L. Weisse Bach- stelze	247	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Gelbe Bachstelzen. Budy- tes. C. Motacilla flava. Gmel. Gelbe Bach- stelze	250	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ boarula. Gmel. Graue Bachstelze	246	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Pieper. Anthus. B. Anthus arboreus. B. Baumpieper	241	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ pratensis. B. Wiesenpie- per	242	—	—	—	—	—	*	—	—	—
„ aquaticus. B. Wasser- pieper	237	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ campestris. B. Brachpie- per	255	—	—	—	—	—	*	—	—	—
Schwalbenartige Vögel. Flssiro- stres. C. Tagschwalben. Hirundo. L. Segler. Cypselus. J. Cypselus apus. Mauersegler . .	400	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ melba. Br. Felsensegler bei Zelle St. Blasii ein- nem Wanderfalken ab- gejagt	399	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Wahre Schwalben. Hirundo. C. Hirundo urbana. L. Hausschwalbe	393	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ riparia. L. Uferschwalbe	394	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ rustica. Linné. Rauch- schwalbe	392	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Nachtschwalben. Capri- mulgus. L. Caprimulgus punctatus. M. Punk- tirtre Nachtschwalbe	404	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Kegelschnäbler. Lerchen. Alauda. L. Alauda arvensis. L. Feldlerche .	332	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Lat. 5.		1	—	13	—	—	2	—	2	

Ordnung II.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Alauda cristata. L. Haubenlerche	229	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ arborea. L. Baumlerche	230	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Meisen. Parus. L.										
Parus major. L. Kohlmeise . .	259	0	—	000	—	—	—	—	—	—
„ ater. L. Tannenmeise .	260	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ palustris. L. Sumpfmeise	259	—	00	—	—	—	—	—	—	—
„ coeruleus. L. Blaumeise	267	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cyanus. L. Lasurmeise, bei Ohrdruff geschossen . .	266	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ cristatus. L. Haubenmeise	264	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ caudatus. L. Schwanzmeise	269	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ biarmicus. L. Bartmeise										
bei Gotha geschossen . .	270	—	—	—	—	—	—	**	—	—
„ pendulinus. L. Beutelmeise										
bei Gotha geschossen . .	272	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Ammern. Emberiza.										
Emberiza citrinella. L. Goldammer	206	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ schoeniclus. L. Rohr- ammer	210	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ miliaria. L. Graueammer	240	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ hortulana. L. Fettammer	207	—	—	—	—	—	—	**	—	—
„ nivalis. L. Schneeammer	214	—	—	—	—	**	—	—	—	—
Finken. Fringilla.										
Sperlinge. Pyrgita. C.										
Fringilla domestica. L. Haus- sperling	182	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ montana. Feldsperling		0	—	—	—	—	—	—	—	—
Finken. Fringilla.										
Fringilla cölebs. L. Buchfink .	188	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ montifringilla. L. Berg- fink	189	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Distelfinken. Carduelis. C.										
Fringilla carduelis. L. Distelfink	201	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Leinfinken. Linaria. C.										
Fringilla linaria. L. Leinfink .	195	—	—	—	—	**	—	—	—	—
„ flavirostris. L. Gelb- schnäblicher Fink . .	196	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ cannabina. L. Hänfling	191	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ spinus. L. Zeissig .	198	—	—	—	*	—	—	—	—	—
Kernbeisser. Coccothraus- tes. C.										
Fringilla coccothraustes. L. Kirsch- kernbeisser	176	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ chloris. T. Grünling .	179	—	00	—	—	—	—	—	—	—
„ petronia. L. Grauer Kern- beisser	181	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ erythrina. M. Karmin- köpfiger Kernbeisser; bei Mühlhausen geschossen	171	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lat. 6.		13	2	5	2	2	—	2	2	

Ordnung II.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Gimpel. Pyrrhula. C. Pyrrhula vulgaris. L. Gemeiner Gimpel										
Kreuzschnabel. Loxia. Briss. Loxia curvirostra. L. Klein- schnäbliger Xschnabel	162	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ pytiopsittacus. B. Gross- schnäbliger Xschnabel	164	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Haken-Kernbeisser. Cory- thus. C. Loxia enucleator. L. Hakenkern- beisser, bei Erfurt ge- schossen	169	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Staare. Sturnus. Sturnus vulgaris. L. Gemeiner Staar	282	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Spechtmeise. Sitta. Sitta europaea. L. Gemeine Spechtmeise	148	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Raben. Corvus. L. Corvus corax. L. Kolkrahe	92	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ corone. L. Schwarze Krähe	94	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cornix. L. Nebelkrähe	95	—	—	—	*	—	—	—	—	—
„ frugilegus. L. Saatkrähe	96	—	—	—	*	—	—	—	—	—
„ monedula. L. Dohle	97	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Elstern. Pica. C. Corvus pica. L. Europäische Elster	98	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Heher. Garrulus. C. Corvus glandarius. L. Eichelheher	100	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Nussheher. Caryocatactes. C. Corvus caryocatactes. L. Gemeiner Nussheher	103	—	—	—	—	—	—	—	**	—
„ (nucifraga). Br. brachy- rhynchos. Kurzschnäb- licher Nussheher	104	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Raken. Coracias. L. Wahre Raken. Coracias garrula. L. Blaue Rake	112	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Dünnschnäbler. Wiedehöpfe. Upupa. L. Wahre Wiedehöpfe. Upupa. Upupa epops. L. Europäischer Wiedehopf	159	—	—	000	—	—	—	—	—	—
Baumläufer. Certhia. L. Wahre Baumläufer. Certhia. Certhia familiaris. Europäischer Baumläufer	151	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ brachydactyla. B. Kurz- zehiger Baumläufer	152	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Lat. 7.		8	—	3	2	—	—	—	3	2

Ordnung III. IV.	Follum in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.				
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.
					Jeden Winter.	Manchen Winter.			
B. Mit verbundenen Zehen. Syndactyli.									
Eisvögel. Alcedo.									
Alcedo ispida. L. Europäischer Eisvogel	120	0	—	—	—	—	—	—	—
Ordnung III.									
Kletter-Vögel. Scansores.									
Spechte. Picus.									
Picus martius. L. Schwarzspecht	133	0	—	—	—	—	—	—	—
„ viridis. L. Grünspecht . .	134	0	—	—	—	—	—	—	—
„ canus. Gmel. Grauspecht .	135	0	—	—	—	—	—	—	—
„ major. L. Grosser Bunt- specht	137	0	—	—	—	—	—	—	—
„ medius. L. Mittlerer Bunt- specht	140	0	—	—	—	—	—	—	—
„ leuconotus. B. Weissrücki- ger Specht bei Walters- und Eisenach geschossen .	138	—	—	—	—	—	—	—	***
„ minor. L. Kleiner Buntspecht	141	—	—	—	—	—	—	**	—
Wendehals. Yunx. L.									
Yunx torquilla. L. Europäischer Wendehals	145	—	—	000	—	—	—	—	—
Kuckuke. Cuculus.									
Cuculus canorus. L. Europäischer Kuckuk	124	—	—	000	—	—	—	—	—
Ordnung IV.									
Hühnerartige Vögel. Gallinaceae.									
Pfau. Pavo. L.									
Pavo cristatus. L. Federbuschpfau		0	—	—	—	—	—	—	—
Truthähne. Meleagris. L.									
Meleagris gallopavo. L. Gemeines Truthuhn		0	—	—	—	—	—	—	—
Fasanen. Phasianus. L.									
Hahn. Gallus.									
Gallus bankiva. Tem. Bankivischer Hahn		0	—	—	—	—	—	—	—
„ crispus. Strupphuhn . .		0	—	—	—	—	—	—	—
„ ecaudatus. Gluthuhn . .		0	—	—	—	—	—	—	—
Lat. 8.		11	—	2	—	—	—	1	1

Ordnung V.	Folium in Breilm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.				
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.
					Jeden Winter.	Manchen Winter.			
Fasan. Phasianus. L.									
Gemeiner Fasan.									
Phasianus colchicus. L. Kupfer- Fasan	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Halsband-Fasanen.									
Phasianus nyctemerus. L. Silber- fasan	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pictus. L. Goldfasan .	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Perlhuhn. Numida. L.									
Numida meleagris. L. Gemeines Perlhuhn	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldhuhn. Tetrao. L.									
Auerhühner. Lagopus. Briss.									
Tetrao urogallus. L. Auerhuhn	427	0	—	—	—	—	—	—	—
„ tetrix. L. Birkhuhn . .	432	0	—	—	—	—	—	—	—
„ bonasia. L. Haselhuhn	424	0	—	—	—	—	—	—	—
Rebhühner. Perdix.									
Perdix cinerea. Lath. Graues Reb- huhn	464	0	—	—	—	—	—	—	—
Wachteln. Coturnix.									
Coturnix dactylisonans. Tem. Europäische Wachtel	466	—	—	000	—	—	—	—	—
Tauben. Columba. L.									
Wahre Tauben. Columba.									
Columba palumbus. L. Ringel- taube	410	—	—	000	—	—	—	—	—
„ oenas. L. Holztaube .	414	—	—	000	—	—	—	—	—
„ livia. Briss. Feldtaube bei Creutzburg . . .	411	—	—	—	—	—	—	—	***
„ turtur. L. Turteltaube	415	—	—	000	—	—	—	—	—
„ risoria. L. Lachtaube	—	0	—	—	—	—	—	—	—
Ordnung V.									
<i>Sumpf-, Lauf- und Stelzenvögel.</i>									
<i>Grallae. L.</i>									
Feldläufer. Brachvögel.									
Pressirostres. L.									
Trappen. Otis.									
Otis tarda. L. Grosser Trappe	473	0	—	—	—	—	—	—	—
„ tetrax. L. Kleiner Trappe bei Tonen und. Ichtershau- sen geschossen	476	—	—	—	—	—	—	—	***
Regenpfeifer. Charadrius. L.									
Lat. 9.		10	—	4	—	—	—	—	2

Ordnung V.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.				
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.
					Jeden Winter.	Manchen Winter.			
Dickfuss. Oedienemus. C.									
Oedienemus crepitans. Tem. Ler- chengrauer Dickfuss	482	—	—	—	—	—	—	—	***
Eigentl. Regenpfeifer. Charadrius.									
Charadrius auratus. M. Goldregen- pfeifer	485	—	—	—	—	—	*	—	—
„ morinellus. L. Morinell	487	—	—	—	—	—	—	**	—
„ hiaticula. L. Halsband- Regenpfeifer	489	—	—	—	—	—	—	—	***
„ minor. M. Kleiner Re- genpfeifer	491	—	—	000	—	—	—	—	—
Kibitze. Vanellus.									
Eigentliche Kibitze. Van- neaux.									
Vanellus cristatus. M. Gemeiner Kibitz	513	—	—	000	—	—	—	—	—
Austernfischer. Haematopus. L.									
Haematopus ostralegus. L. Roth- füßig. A. bei Wal- tershausen geschos.	501	—	—	—	—	—	—	—	***
Messerförmige Schnä- bel. Cultriostres. C.									
Kraniche. Grus. C.									
Grus cinerea. M. Gemeiner Kranich	540	—	—	—	—	—	*	—	—
Reiher. Ardea. L.									
Ardea cinerea. L. Grauer Reiher	546	—	—	—	—	—	*	—	—
„ purpurea. L. Purpureireiher bei Gotha und auf dem Schneekopf geschossen .	548	—	—	—	—	—	—	—	***
„ ralloides. M. Rallenreiher bei Gotha geschossen .	567	—	—	—	—	—	—	—	***
„ minuta. L. Kleiner Reiher	559	—	—	—	—	—	—	**	—
„ stellaris. L. Rohrdommel- Reiher	554	—	—	—	—	—	—	**	—
Störche. Ciconia.									
Ciconia alba. Briss. Weisser Storch	535	—	—	000	—	—	—	—	—
„ nigra. B. Schwarzer Storch auf dem Dörn- berger und Dietzhoer Revier des Thüringer- waldes, zu Gotha gehö- rend	537	—	—	000	—	—	—	—	—
Langschnäbler. Longi- rostres.									
Ibis, Ibis Laced.									
Ibis falcinellus. T. Brauner Ibis									
Lat. 10.		—	—	4	—	—	3	3	5

Ordnung VI.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
bei Eisenach und Gotha ge- schossen	528	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Brachvogel. Numenius. C.										
Numenius arquata. B. Grosser Brachvogel	520	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Regenvögel. Phaeopus. C.										
Phaeopus borealis. C. Europäi- scher Regenpfeifer	522	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Schnepfe. Scolopax.										
Scolopax rusticola. L. Wald- schnepfe	617	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ gallinago. L. Heer- schnepfe	624	—	—	000	—	—	—	—	—	—
„ major. Gmel. Doppel- schnepfe	619	—	—	—	—	—	—	—	**	—
„ gallinula. L. Moor- schnepfe	626	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Sumpfläufer. Limosa. B.										
Limosa melanura. Leisl. Schwarz- schwänziger Sumpfläufer bei Mühlhausen und Gotha geschossen	609	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ rufa. Briss. Rostrother Sumpfläufer bei Gotha ge- schossen	611	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Sandläufer. Calidris. C.										
Calidris Temminckii. T. Temminck- scher Sandläufer	576	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ minuta. C. Kleiner Sand- läufer	577	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Meerlerchen. Pelidna. C.										
Pelidna variabilis. C. Gemeine Meerlerche	568	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Kampfstrandläufer. Machetes. C.										
Machetes pugnax. C. Kampfstrand- läufer	582	—	—	—	—	—	—	—	**	—
Sanderling. Arenaria. B.										
Arenaria calidris. M. Grauer San- derling	498	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Wasserläufer. Totanus.										
Totanus fuscus. Leisl. Brauner Wasserläufer	597	—	—	—	—	—	—	—	**	—
„ calidris. B. Rothfüssiger Wasserläufer	601	—	—	—	—	—	—	—	**	—
„ stagnatilis. B. Teich- wasserläufer bei Gotha geschossen	599	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ ochropus. Tem. Punk- tirter Wasserläufer	594	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Lat. 11.		—	—	2	—	—	—	3	6	7

Ordnung VI.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Totanus glareola. Tem. Wald- Wasserläufer	596	—	—	—	—	—	*	—	—	
„ hypoleucus. T. Trillernder Wasserläufer	590	—	—	—	—	—	*	—	—	
„ glottis. B. Grünfüßiger Wasserläufer	603	—	—	—	—	—	*	—	—	
Strandreuter. Himantopus. C. Himantopus atropterus. Cuvier. Schwarzflügler Strand- reuter bei Gotha gesch.	504	—	—	—	—	—	—	—	***	
Langzeher. Macrodac- tyli. C.										
Rallen. Rallus. L. Rallus aquaticus. L. Was- serralle.	632	—	—	000	—	—	—	—	—	
Schnarrer. Crex. B. Crex pratensis. B. Wiesenschnarrer	634	—	—	000	—	—	—	—	—	
Rohrühner. Gallinula. C. Gallinula porzana. Punkirtes Rohrhuhn	638	—	—	000	—	—	—	—	—	
„ pusilla. B. Kleines Rohrhuhn	640	—	—	—	—	—	—	—	***	
„ chloropus. Lath. Grün- füßiges Rohrhuhn	643	—	—	000	—	—	—	—	—	
Wasserhühner. Fulica. L. Fulica atra. L. Schwarzes Was- serhuhn	670	—	—	000	—	—	—	—	—	
Ordnung VI.										
<i>Vögel mit Schwimmfüßen.</i> <i>Palmpedes.</i>										
Kurzflügler oder Tau- cher. Brachypteri.										
Taucher. Colymbus. C. Steissfuss. Podiceps. Lath. Podiceps cristatus. Lath. Grosser Haubentaucher	865	—	—	—	—	—	—	**	—	
„ cornutus. M. Gehörnter Steissfuss	869	—	—	—	—	—	—	—	***	
„ auritus. Lath. Ohren- taucher	873	—	—	—	—	—	—	—	***	
„ suberistatus. B. Grau- kehliger Steissfuss	867	—	—	—	—	—	—	—	***	
„ minor. Lath. Kleiner Steissfuss	875	—	—	000	—	—	—	—	—	
Lat. 12,		—	—	6	—	—	3	1	5	

Ordnung VI.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Seetaucher. <i>Colymbus</i> . Lath.										
<i>Colymbus arcticus</i> . L. Arctischer Taucher; bei Arnstadt und Langensalza le- bendig gefangen und bei Zelle ein altes ♂ geschossen	885	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ <i>rufogularis</i> . M. Roth- kehliger Taucher . . .	893	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Langflügler. <i>Longipen- nes</i> . C.										
Raubmöve. <i>Lestris</i> . J.										
<i>Lestris parasitica</i> . Bss. Strunt- jäger	744	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ <i>pomarina</i> . T. Breitschwän- zige Schmarotzer-Möve .	741	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Möve. <i>Larus</i> . C.										
<i>Larus tridactylus</i> . Lath. Drei- zehige Möve	705	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ <i>ridibundus</i> . L. Rothfüßige Möve	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—
Meerschwalben. <i>Sterna</i> . L.										
<i>Sterna hirundo</i> . L. Gemeine See- schwalbe	688	—	—	—	—	—	*	—	—	—
„ <i>nigra</i> . L. Schwarze See- schwalbe	695	—	—	—	—	—	—	**	—	—
Scharben. <i>Carbo</i> . M.										
<i>Carbo graculus</i> . G. Krähenscharbe bei Mühlhausen geschossen	908	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ <i>cormoranus</i> . Coromoranen- Scharbe bei Langensalza u. Ichtershausen geschossen 1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mit gezähnten Schnä- beln. <i>Lamellirostres</i> .										
Entenartige Vögel. <i>Anates</i> .										
Schwäne. <i>Cygnus</i> .										
<i>Cygnus gibbus</i> . B. Höckerschwan	760	0	—	—	—	—	—	—	—	—
„ <i>musicus</i> . B. Singschwan bei Mühlhausen 3 Stück geschossen	771	—	—	—	—	—	—	—	—	***
„ <i>guinensis</i>	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Gänse. <i>Anser</i> .										
<i>Anser cinereus</i> . M. Graue Gans	767	—	—	—	—	—	*	—	—	—
„ <i>segetum</i> . M. Saatgans .	768	—	—	—	—	—	*	—	—	—
„ <i>bernici</i> . L. Ringelgans	777	—	—	—	—	—	—	—	—	***
Lat. 13.	2	—	—	—	—	—	4	1	8	

Ordnung III. IV.	Folium in Brehm.	In Thüringen brütende.			Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende.					
		Ueberwinternde.	Theilweise Ueberwinternde.	Im Herbst Weg- ziehende.	Ueber- winternde.		Jeden Herbst Durchziehende.	Manchen Herbst.	Höchst selten.	
					Jeden Winter.	Manchen Winter.				
Anser rufescens. Br. Russgelbe Gans	770	--	--	--	--	--	--	**	--	
Enten. Anas. M. Enten mit aufgeblasenen Schnäbeln.										
Anas nigra. L. Trauerente bei Langensalza geschossen .	820	--	--	--	--	--	--	--	***	
„ fusca. L. Sammtente . .	822	--	--	--	--	--	--	**	--	
„ leucocephala. L. Weissköp- fige Ente bei Mühlhausen geschossen	827	--	--	--	--	--	--	--	***	
Schellenten. Clangula.										
Anas glacialis. L. Eisente bei Waltershausen	840	--	--	--	--	--	--	--	***	
„ clangula. L. Schellente .	837	--	--	--	--	--	*	--	--	
Eiderenten.										
Anas mollissima. L. Eiderente b. Waltershausen geschossen	809	--	--	--	--	--	--	--	***	
Moorenten.										
Anas ferina. L. Tafelente. . .	828	--	--	--	--	--	*	--	--	
„ rufo. P. Kolbenente bei Mühlhausen geschossen .	826	--	--	--	--	--	--	--	***	
„ marila. L. Bergente . . .	830	--	--	--	--	--	--	**	--	
„ leucophthalmos. Weissäü- gige Ente	834	--	--	--	--	--	*	--	--	
„ fuligula. L. Haubenente	833	--	--	--	--	--	*	--	--	
Löffelenten.										
Anas clypeata. L. Gemeine Ente	778	--	--	--	--	--	*	--	--	
Brandenten.										
Anas moschata. L. Bisamente .	—	0	--	--	--	--	--	--	--	
„ acuta. L. Spiessente . .	796	--	--	--	--	--	*	--	--	
„ boschas. L. Stockente . .	791	0	--	--	--	--	--	--	--	
„ strepera. L. Schnatterente	794	--	--	--	--	--	*	--	--	
„ penelope. L. Pfeifente . .	798	--	--	--	--	--	*	--	--	
„ crecca. L. Krickente . .	802	--	--	--	--	--	*	--	--	
„ querquedula. L. Knäkente	800	--	--	000	--	--	--	--	--	
Säger. Tauchergänse. Mergus. L.										
Mergus merganser. L. Grosse Tauchergans	852	--	--	--	--	--	--	--	***	
„ serrator. L. Gezähnter Säger	855	--	--	--	--	--	--	**	--	
„ albellus. L. Weissesäger	—	--	--	--	--	--	--	--	***	
Lat. 14		2	--	1	--	--	9	4	7	

Uebersicht.

In Thüringen brütende:

1. Ueberwinternde	60 Species
2. Theilweise Ueberwinternde	3 »
3. Wegziehende	73 »

136 Species

II. Auf dem Zug oder Strich nach Thüringen kommende:

1. Ueberwinternd

a. Jeden Winter 10 Species

b. Manchen Winter 3 »

2. Jeden Herbst streichend 26 »

3. Manchen Herbst streichend 25 »

4. Höchst selten streichend 50 »

114 »

250 Species.

Gotha, den 25. Mai 1853.

Dr. A. Hellmann.

Verzeichniß

der in den Küstengegenden des Sees Wenern in Schweden
observirten Vögel.

Von

T. Hammargren.

Der Wener-See ist im mittleren Schweden zwischen 58° 20' — 59° 22' N. B. gelegen; dieser meerartige, stattliche See, mit seinen vielen Inseln, durch »Göthaelf« mit dem Meere verbunden, wird in N. und W. von ziemlich schroffen Urfelsen und Nadelwäldern in S. und O. aber von schönen Ueberresten der silurischen Formation, und flachen grabbewachsenen Ufern begrenzt. Daher finden sich auch hier Repräsentanten sowohl der Vogelfauna der Meeresküste als auch der eigentlichen Gebirgsgegenden. Die Provinzen Wermland, Dalsland und Westergöthland liegen am See ringsum. Mehrere Gebirgsketten streichen durch Werm-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Hellmann August

Artikel/Article: [Verzeichniß 276-290](#)