

# Zur Erklärung der Abbildungen der Kukkukseier.

Mit Tafel.

Wir geben auf dieser Tafel die möglichst getreue Abbildung von 16 verschiedenen Typen \*) der Eier von *Cuculus canorus*, unter Angabe des Nestes, aus dem sie genommen, und der Maasse des grossen und kleinen Durchmessers. Nur die Provenienz von Nr. 1 ist unsicher.

| Nr. | 1. | 2.      | 3.    | 4.  | 5.             | 6.                   | 7.                   | 8.               | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|-----|----|---------|-------|-----|----------------|----------------------|----------------------|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |    | Aus dem | Neste | von | L. rubecula?   | Gr. D.               | Kl. D.               |                  |    |     |     |     |     |     |     |     |
|     |    |         |       |     |                | 23 $\frac{1}{2}$ MM. | 16 $\frac{1}{2}$ MM. |                  |    |     |     |     |     |     |     |     |
| "   | "  | "       | "     | "   | C. arundinac.  | 21 $\frac{1}{2}$     | "                    | 15               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | S. hortensis   | 23 $\frac{1}{4}$     | "                    | 17               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | R. Phoenicurus | 22 $\frac{1}{4}$     | "                    | 15 $\frac{1}{2}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | S. atricapilla | 23 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | C. palustris   | 21                   | "                    | 16               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | F. hypolais    | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16 $\frac{1}{4}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | S. cyperea     | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16 $\frac{1}{2}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | Prat. rubetra  | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16 $\frac{1}{4}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | Mot. alba      | 23                   | "                    | 17               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | Lan. collurio  | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16 $\frac{1}{2}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | Anth. arboreus | 22                   | "                    | 16               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | L. rubecula    | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 17               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | S. nisoria     | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16 $\frac{1}{2}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | Al. arvensis   | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 17               | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |
| "   | "  | "       | "     | "   | Bud. flava     | 22 $\frac{1}{2}$     | "                    | 16 $\frac{1}{4}$ | "  | "   | "   | "   | "   | "   | "   | "   |

E. Baldamus.

## Einladung zur Subscription auf

### Alfred Edmund Brehm's Reiseskizzen aus Nord- Ost-Afrika,

oder den unter ägyptischer Herrschaft stehenden Ländern:

**Egypten, Nubien, Sennar, Roseeres und Kordofan.**

Der den Lesern der Naumannia schon bekannte Verfasser beabsichtigt das Merkwürdigste und Wissenswertheste seiner Erlebnisse und Erfahrungen während seiner fünfjährigen Reisen in N.O.Afrika zu veröffentlichen. Er ladet alle Freunde der Zoologie, Länder- und Völkerkunde zur Subscription ergebenst ein, in der angenehmen Hoffnung, dass seine Arbeit, welche sich im Manuscript des Beifalls sachkundiger Männer zu erfreuen hatte, nicht ohne Nutzen und Befriedigung gelesen werden wird.

Das Buch wird circa 30 enggedruckte Bogen in gr. 8. enthalten,

\*) S. Naum. 1853. III. p. 307. ff.

und in Kürze erscheinen. Der Preis ist für die Subscribenten 2 1/2 Thlr. Preuss. Cour.

Alle löbl. Buchhandlungen und verehrl. Subscribenten werden freundlich ersucht, sich durch Herrn Buchhändler Doeberer in Jena oder direkt an uns mittelst der beiliegenden Bestellzettel wenden zu wollen.

Renthendorf bei Triptis in Thüringen, im November 1854.

**A. E. Brehm.**

## Verzeichniss

der im Tausch oder käuflich abzulassenden Vögeleier, zu haben bei  
J. Zelebor, Conservator am K. Museum zu Wien.

|                                |              |       |
|--------------------------------|--------------|-------|
| Falco cenchris à . . . .       | 1 fl. — kr.  | C. M. |
| Astur palumbar. à . . .        | — 30 kr.     |       |
| Scops carniolica à . . .       | — 40 kr.     |       |
| Merops apiaster à . . .        | — 48 kr.     |       |
| Coracias garrula à . . .       | — 40 kr.     |       |
| Picus canus à . . . . .        | — 30 kr.     |       |
| Picus leuconotus à . . .       | 3 fl. — kr.  |       |
| Lanius rufus à . . . . .       | — 20 kr.     |       |
| Ruticilla atra à . . . . .     | — 10 kr.     |       |
| Cyanecula suecica à . . .      | — 20 kr.     |       |
| Parus barbatus à . . . .       | — 30 kr.     |       |
| Parus cristatus à . . . .      | — 10 kr.     |       |
| Anthus aquaticus à . . . .     | — 20 kr.     |       |
| Emberiza melanoceph. à . .     | — 30 kr.     |       |
| Fringilla serinus à . . . .    | — 10 kr.     |       |
| Pyrrhula vulgaris à . . .      | — 15 kr.     |       |
| Phasianus pictus à . . . .     | 1 fl. — kr.  |       |
| Phasianus nyctemerus à . .     | — 48 kr.     |       |
| Glareola pratincola à . . .    | — 48 kr.     |       |
| Oedicnemus crepitans à . . .   | — 24 kr.     |       |
| Ibis falcinellus à . . . . .   | 1 fl. 20 kr. |       |
| Ardea purpurea à . . . . .     | — 24 kr.     |       |
| Ardea garzetta à . . . . .     | — 48 kr.     |       |
| Ardea comata à . . . . .       | — 40 kr.     |       |
| Botaurus nycticorax à . . .    | — 30 kr.     |       |
| Ciconia nigra à . . . . .      | 1 fl. 30 kr. |       |
| Platalea leucorodia à . . .    | — 48 kr.     |       |
| Sterna leucoptera à . . . .    | — 24 kr.     |       |
| Sterna minuta à . . . . .      | — 15 kr.     |       |
| Phalacrocorax pygmaeus à 1 fl. | 30 kr.       |       |
| Anser cinereus à . . . . .     | 1 fl. — kr.  |       |

nebst vielen andern weniger seltenen Arten.

Dass die Eier sicher bestimmt und vortrefflich präparirt und gehalten sind, kann aus eigener Anschauung bezeugen

**E. Baldamus.**



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Brehm Alfred Edmund

Artikel/Article: [Alfred Edmund Brehm's Reiseskizzen aus Nord- Ost-Afrika 415-416](#)