

# Verzeichniss der europäischen Vögel nach den Species und Subspecies.

Von

Ludwig Brehm.

Wiederholten Aufforderungen des Herrn Herausgebers unserer Zeitschrift zufolge hat sich der Verfasser dieses entschlossen, ein Verzeichniss europäischer Vögel nach den von ihm aufgestellten europäischen Vögelarten und ihrer Unterarten oder Gattungen\*) hier mitzutheilen, damit die Freunde und Feinde der vielfach besprochenen Subspecies das Feld mit einem Blicke übersehen können. Nothwendig scheint die Erklärung, dass die Aufstellung der Unterarten europäischer Vögel auf einem sehr sorgfältigen Studium der Vögel in der freien Natur beruht und nicht etwa nach einzelnen Exemplaren, sondern nach einer genauen Musterung von 8000 Vögeln einer Sammlung europäischer Vögel,\*\* mit welcher sich keine andere auf der ganzen

\*) Der Ausdruck Gattung für Genus ist ganz unrichtig, wie schon Oken gezeigt hat, Gattungen (von sich gatten) sind eigentlich die Subspecies, dessen wegen muss Genus nicht durch Gattung, sondern durch Sippe bezeichnet werden.

\*\*) Möchte doch diese Sammlung sonder Gleichen, über deren Reichthum sogar Prinz Charles Lucien Bonaparte schon zu Anfang der vierziger Jahre (in seiner vor der Naturforscher-Versammlung in Florenz im Jahre 1842 gehaltenen Rede) sich bewundernd ausspricht, und die seit jener Zeit vielleicht ums Doppelte gewachsen ist — möchte doch dieses werthvolle Zeugniß eines beispiellosen Fleisses, einer unermüdlichen Ausdauer und Consequenz dem Vaterlande oder wenigstens Europa erhalten bleiben, und nicht etwa — wie es leider zu fürchten steht — den Weg über den atlantischen Ocean gehén! Wir sind — und mit uns viele Freunde und Gegner der Ansichten Brehm's — wir sind der Meinung, dass nicht nur viele der Brehm'schen „Originalexemplare“, sondern die ganze Sammlung sich dem Käufer verinteressiren dürfte, abgesehen davon, dass doch auch eine Belohnung so enormen Fleisses höchst wünschenswerth erscheint.

Wir selbst glauben uns den Dank der Ornithologen — Gegner wie Freunde der Brehm'schen Species und Subspecies — für die nach jahrelangem Bitten und Erinnern erreichte Aufstellung derselben erworben zu haben, und geben sogleich, wenn auch nur einen kleinen Theil, in den wenigen übrigen Blättern dieses Heftes.

Die Red.

Erde in Bezug auf den Reichthum der Reihefolgen vergleichen kann, und einer sorgfältigen Untersuchung von Hunderten gepaarter Paare gewagt worden ist. Sie ist die Frucht eines lebenslänglichen Studiums der europäischen Ornithologie, welche, die Gegner mögen noch so sehr dagegen eifern, immer für uns Europäer die Grundlage der Erforschung der gesamten Ornithologie bleiben wird.

Das Gesagte schien zur Begründung einer billigen Beurtheilung des Folgenden nothwendig. Zuweilen werden auch aussereuropäische, den unsrern nah verwandte Vögel mit aufgeführt werden. Diese Species und Subspecies sind beschrieben in Brehm's Handbuche und Brehm's Vogelfange, beide bei Voigt in Weimar.

### Vulturinae.\*)

#### I. Neophron, Savign.

1. *N. perenopterus, Sav.*

*N. supercnopterus, Brm.*, kurzer Schnabel.

2. *N. pileatus, Ill.*

*N. monachus, Brm.*, mit kurzem Schnabel.

#### II. Otagypus, Griff.

1. *Ot. nubicus, Griff.* (*Vultur auricularis auct.*), mit sehr vortretendem Flaum.

*Ot. pennatus, Brm.*, mit wenig bemerkbarem Flaum.

#### III. Vultur, L.

1. *Vultur cinereus, Raj.*

#### IV. Gyps, Sav.

1. *Gyps fulvus, Gray.* *Vultur fulvus, Linn.*

*G. albicollis, Brm.*, an *occidentalis, Schl.*

2. *Gyps Rüppellii, Alfr. Brm.*

### Gypaetinae.

#### I. Gypaëtos, Storr.

1. *Gypaëtos grandis, Storr.* (*G. barbatus auct.*)

a) *G. meridionalis, Brm.*, an *occidentalis, Schl.*

b) *G. nudipes, Brm.*, Südafrika.

### Falconidae.

#### Aquillinae.

#### I. Haliaëtus, Sav.

1. *Haliaëtus albicilla.*

a) *H. groenlandicus, Brm.*

b) *H. borealis, Brm.*

c) *H. islandicus, Brm.*

d) *H. orientalis, Brm.*

e) *H. cinereus, Brm.*

f) *H. funereus, Brm.*

2. *H. leucocephalus, Pall.*

3. *H. vocifer, auct.*

4. *H. leucorypha.*

#### II. Aquila, Briss.

1. *Aq. fulva, Brm.* (*Falco fulvus, Linn.*)

*Aq. melanætos, Brm.* (*Falco melanætos, Linn.*)

2. *Aq. chrysætos, Brm.* (*Falco chrysætos, L.*)

3. *Aq. fuscicapilla, Brm.*

4. *Aq. heliaca, Sav.* (*Aq. chrysætos, Leisl.* *Aq. imperialis, Bechst.*)

5. *Aq. rapax, auct.*

a) *Aq. raptor, nobis.*

b) *Aq. variegata, nobis.*

6. *Aq. Pallasi, Alfr. Brm.*

7. *Aq. clanga, Pall.*

*Aq. unicolor, Brm.*

\*) Von *Sarcoramphos* wurden in der *Isis* beschrieben:

1. *S. gryphus*, sehr gross mit einem schwarzen Querbande auf dem weissen Flügelschild.
2. *S. condor*,  $\frac{1}{3}$  kleiner mit keinem schwarzen Querbande auf dem weissen Flügelschild.

- I. Aq.  
 8. Aq. fusca, *Brm.*  
 a) Aq. pomarina, *Brm.*  
 b) Aq. subnaevia, *Brm.*  
 c) Aq. fulviventris, *Brm.*  
 9. Aq. fuscoatra, *Brm.*  
 10. Aq. naevia auct. (*Falco naevius, L.*)  
 11. Aq. Brehmii, *Müller.*  
 12. Aq. pennata, *Cuv.* (*Falco pennatus, L.*)  
 13. Aq. minuta, *Brm.*  
 14. Aq. Bonellii, \*) *Bp.*  
 15. Aq. Wiedii, nobis.

III. Pandion, *Sav.*

1. Pandion haliaëtos, *Cuv.* (*Falco haliaeëtos, Linn.*)  
 a) P. alticeps, *Brm.*  
 b) P. planiceps, *Brm.*  
 c) P. albicularis, *Brm.*  
 d) P. minor, *Brm.*  
 e) P. fasciatus, *Brm.*

IV. Circaëtos, *Vieill.*

1. Circaëtos leucopsis, *Brm.* (*C. gallius, Vieill.*)  
*Circ. anguum, Brm.*  
 2. Circ. hypoleucus, *Vieill.* (*Accipiter hypoleucus, Pall.*)  
 3. Circ. orientalis, nobis.

Buteoninae.

I. Butaëtos, *Naum.*

1. But. leucurus, *Naum.*  
 2. But. rufinus, *Brm.* (*Buteo rufinus, auct.*)

II. Archibuteo, *Brm.*

1. Archibuteo lagopus, *Brm.* (*Falco lagopus, L.*)  
 a) A. planiceps, *Brm.*  
 b) A. alticeps, *Brm.*

III. Buteo, *Bechst.*

1. Buteo vulgaris, *B.* (*Falco buteo, L.*)  
 a) B. major, *Brm.*  
 b) B. septentrionalis, *Brm.*  
 c) B. medius, *Brm.*  
 d) B. murum, *Brm.*  
 e) B. minor, *Brm.*  
 f) B. albidus, auct.

Milvinæ.

I. Pernis, *Cuv.*

1. Pernis apivora, *Cuv.*  
 a) P. apium, *Brm.*  
 b) P. vesparum, *Brm.*  
 c) P. platyura, *Brm.*

II. Milvus, *Briss.*

1. Milvus regalis, *Br.* (*Falco milvus, L.*)  
*M. ruber, Brm.*  
 2. M. niger, *Briss.* (*Falco ater, Linn.*)  
*M. fuscus, Brm.*  
 3. M. parasiticus, *Le Vaill.* (*Falco parasiticus, Daud.*)  
*M. leucorhynchus, Brm.*  
 4. M. Forskali, *Brm.* (*Falco Forskali, L.*)

III. Nauclerus, *Vig.*

- Nauclerus furcatus, *Vig.* (*Falco furcatus, Linn.*)  
*Elanus, Sav.*  
 Elanus melanopterus, *Leach.* (*Falco melanopterus, Daud.*)

Falconinae.

I. Hierofalco, *Cuv.*

1. Hierofalco islandicus, *Cuv.* (*Falco islandicus, Brm.*)  
 a) Hier. groenlandicus, *Brm.* (*Falco candicans, L.*)  
 b) Hier. gyrfalco, *Brm.* (*Falco gyrfalco, L.*)

2. Hierofalco lanarius, *Brm.* (*Falco lanarius, Cuv.*)

II. Falco, *Linn.*

1. Falco peregrinus, *Gm., Linn.* (*Falco communis, L.*)  
 a) F. griseiventris, *Brm.*  
 b) F. abietinus, *Bechst.*  
 c) F. leucogenys, *Brm.*

2. Falco Feldeggii, *Schl.* (Mittelzehe länger, als die Fusswurzel, bei den drei folgenden ist sie kürzer.)

3. Falco cervicalis, *Mus., Berol.*

4. Falco biarmicus, auct.

5. Falco taenopyterus, *Mus., Berol.*

III. Dendrofalco, *Bp.*

1. Dendrofalco concolor, *Brm.* (*Falco concolor, Temm., Susem.* (Tafel 54, 4.)

\*) Ich schreibe, und gewiss nicht mit Unrecht, alle Eigennamen hinter dem Namen der Sippe gross, werden doch im Lateinischen die davon herrührenden Beiwörter gross geschrieben.

2. Dendrofaleo arcadicus, *Brm.* (Falco arcadicus, *Linderm.*, *Susem.* (Taf. 54, 3.)
3. Dendrofalco Eleonorae, *Bp.* (Falco Eleonorae, *Géné.*, *Sus.* Taf. 53.)
4. Dendrofalco subbuteo, *Bp.* (Falco subbuteo, *L.*)
  - a) Dendr. Hirundinum, *Brm.*
  - b) Dendr. arboreus, *Brm.*
5. Dendrofalco gracilis, nobis. (Falco gracilis, nobis.)

#### IV. Aesalon, *Kaup.*

1. Aesalon lithofalco, *Kaup.* (Falco lithofalco, *Gm.*, *Linn.*)
2. Aesalon orientalis, nobis. (Falco acesalon, *Linn.* et *Brm.*)

#### V. Cerchneis, *Baje.* (Tinnunculus, *Vieill.*)

1. Cerchneis tinnuncula, *Baje.* (Falco tinnunculus, *L.*)
  - a) C. murum, *Brm.*
  - b) C. media, *Brm.*
  - c) C. taeniura, *Brm.*
  - d) C. intercedens, *Brm.*
  - e) C. accedens, *Brm.*
2. C. rupicolaeformis, *Paul de Wrttb.*
3. C. guttata, nobis.
4. C. fasciata, *Brm.*
5. C. ruficeps, nobis.
6. C. ruficauda, nobis.
7. C. cenchris, *Baje.*
  - a) C. subtinnuncula, *Brm.*
  - b) C. paradoxa, *Brm.* \*)

#### VI. Erythropus, *Brm.*

1. Eryth. vespertinus, *Brm.* (Eryth. obsecurus, *Brm.*, Falco vespertinus, *L.*)
  - a) Erythr. pallidus, *Brm.*
  - b) Erythr. minor, *Brm.*

#### Accipitrinae.

##### I. Astur, *Bechst.*

1. Astur palumbarius, *Bechst.* (Falco palumbarius, *L.*)
  - a) Astur gallinarum, *Brm.*
  - b) Astur brachyrhynchos, *Brm.*
2. Astur paradoxus, *Brm.*

##### II. Melierax, auct.

Melierax gabar, *Brm.* (Falco gabar, auct.)

- III. Nisus, *Cuv.* (Accipiter, *Ray.*)
  1. Nisus communis, *Cuv.* (N. fringillarum, *Brm.* Falco nisus, *Linn.*)
    - a) N. peregrinus, *Brm.*
    - b) N. elegans.
    - c) N. intercedens (♂ alt fast rein rotlich am Unterkörper).

#### Circinae.

##### I. Circus, *Lacep.*

1. Circus aeruginosus, *Bp.* (Falco aeruginosus, *L.*)
  - a) Circus arundinaceus, *Brm.*
  - b) Circus rufus, *Brm.*

##### II. Strigiceps, *Bp.*

1. Strigiceps cyanens, *Bp.* (Circus cyanus, *Bechst.* F. cyaneus, *L.*)
  - a) Str. cinereus, *Brm.* (Circus cinereus, *Brm.*)
  - b) Str. nigripennis, *Brm.* (Circus nigripennis, *L.*)
  - c) Str. pallens, *Brm.* (Circus pallens, *Brm.*)
2. Str. pallidus, *Bp.* (Circus pallidus, *Bruch.*)
  - a) Str. Swainsonii, *Bp.* (Circus Swainsonii, *Smith.*)
  - b) Str. desertorum, *Brm.* (Circus desertorum, *Brm.*)
3. Str. cineraceus, *Bp.* (Circus Montagui, *Vieill.* C. cineraceus, *Cuv.* F. cineraceus, *Mont.*)
  - a) Str. pratorum, *Brm.* (Circus pratorum, *Brm.*)
  - b) Str. elegans, *Brm.* (Circus elegans, *Brm.*)

#### Strigidae.

##### Surninae.

##### I. Surnia, *Dumer.*

1. Surnia funerea, *Dum.* (Strix funerea, *Lath.*)
  - a) S. nisoria, *Brm.* (Str. nisoria, *Mey.*)
  - b) S. hudsonia, *Brm.* (Str. hudsonia, *L.*)

##### II. Nyctea, *Steph.*

1. Nyctea erminea, *Steph.* (Strix nyctea, *L.*)
  - Nyctea candida, *Brm.*

\*) Alle bestimmt nach mehr als 200 Exemplaren.

III. *Glaucidium*, *Baje.*

1. *Glaucidium passerinum*, *Baje.* (Str. *passerina*, *L.*)
  - a) *Gl. microrhynchon*, *Brm.*
  - b) *Gl. pygmaeum*, *Brm.* (Str. *pygmaea*, *Bechst.*)

IV. *Athene*, *Baje.*

1. *Athene passerina*, *Baje.* (Strix *noc-tua*, *Retz.*)
 

*Athene psilodactyla*, *Brm.* (Strix *psilodactyla*, *Nilss.*)
2. *Athene indigena*, *Brm.* *Griechenld.*
3. *Athene meridionalis*, *Brm.* (Strix *meridionalis*, *Brm.* *Noctua ni-lotica*, *Paul de Wrttb.*)

V. *Nyctale*, *Brm.*

1. *Nyctale pinetorum*, *Brm.* (Strix *Tengmalmi*, *Gm.*, *Linn.*)
  - a) *N. abietum*, *Brm.*
  - b) *N. planiceps*, *Brm.*
  - c) *N. minor*, *Brm.*
2. *Nyctale Baedckeri*, *Brm.*

VI. *Ptrynx*, *Blight.*

1. *Ptrynx uralensis*, *Bl.* (Strix *uralen-sis*, *Pall.*)
2. *Ptrynx litorata*, *Brm.*

VII. *Syrnium*, *Sav.*

1. *Syrnium cinereum*, *Gr.* (Str. *cincerea*, *Gm.* Str. *lapponica*, *Retz.*)
2. *Syrnium aluco*, *Sav.* (Str. *aluco*, *L.*)
  - a) *S. macrocephalum*, *Brm.* (Strix *mácrocephala*, *Meisn.*)
  - b) *S. aedium*, *Brm.* (Str. *aedium*, *Zander.*)
  - c) *S. rufescens*, *Brm.*
  - d) *S. stridulum*. (Str. *stridula*, *L.*)

VIII. *Ulula*, *Cuv.*

1. *Ulula nebulosa*, *Cuv.* (Strix *nebu-losa*, *L.*)

IX. *Strix*, *Linn.*

1. *Strix flammea*, *Linn.*
  - a) *Str. guttata*, *Brm.*
  - b) *Str. adspersa*, *Brm.*
  - c) *Str. margaritata*, *Paul de Wrttb.*
2. *Str. maculata*, *nobilis*. (*Nordostafrika*)
3. *Str. splendens*, *Hempr.*

X. *Ascalaphia*, *Is.* *Geoffr.*

1. *Ascalaphia Savignyi*, *Is.* *Geoffr.*

(*Bubo ascalaphus*, *Sav.* Str. *ascalaphus*, *Sav.*)

XI. *Bubo*, *Cuv.*

1. *Bubo maximus*, *Sibbald.* (*Bubo ger-manicus*, *Brm.* *Strix bubo*, *Linn.*)
  - a) *B. septentrionalis*, *Brm.*
  - b) *B. melanotus*, *Brm.*
2. *Bubo sibiricus*, *auct.* (*Bubo palli-dus*, *Brm.*)

XII. *Otus*, *Cuv.*

1. *Otus capensis*, *auct.*
2. *Otus vulgaris*, *Flemm.* (*Otus syl-vestris*, *Brm.* *Strix otus*, *Linn.*)
  - a) *Ot. major*, *Brm.*
  - b) *Ot. gracilis*, *Brm.*
  - c) *Ot. arboreus*, *Brm.*
  - d) *Ot. minor*, *Brm.*
3. *Otus assimilis*, *Brm.*

XIII. *Brachyotos*, *Gould.*

1. *Brachyotos palustris*, *Bp.* (Strix *bra-chyotos*, *Gm.*, *L.* *Otus bra-chyotos*, *Baje.*)
 

*Brach. agrarius*, *Brm.* (*Otus agra-rius*, *Brm.*)
2. *Brachyotos leucopsis*, *Brm.* (*Otus leucopsis*, *Brm.*)

XIV. *Scops*, *Sav.*

1. *Scops zorca*, *Sav.* (*Scops carniolica*, *Brm.* Str. *scops*, *L.*)
  - a) *Sc. minor*, *Brm.*
  - b) *Sc. rupestris*, *Brm.*
  - c) *Sc. rufescens*, *Brm.*
2. *Scops pygmaea*, *nobilis*.

*Chelidones.**Caprimulgidae.*

- I. *Caprimulgus*, *Linn.*
  1. *Caprimulgus europaeus*, *L.* (*Capr. punctatus*, *Brm.*)
    - a) *Capr. maculatus*, *Brm.*
    - b) *Capr. foliorum*, *Brm.*
  2. *Capr. ruficollis*, *Temm.*

*Capr. torquatus*, *Brm.*
  3. *Capr. longicaudus*, *Steph.* (*Capr. climacturus*, *Vieill.*)

*Cypselidae.*

- I. *Cypselus*, *Illiger.*
  1. *Cypselus melba*, *Ill.* (*Hirundo melba*, *L.* *Cypselus alpinus*, *Temm.*)
    - a) *Cyps. alpinus*, *Temm.*
    - b) *Cyps. fuscicollis*, *Brm.* *Afrika.*
  2. *Cyp. apus*, *Ill.* (*Hirundo apus*, *Linn.*)
    - a) *Cyps. murarius*, *Temm.*
    - b) *Cyps. turrium*, *Brm.*
  3. *Cyps. murinus*, *nobilis*.

**Hirundinidae.****Hirundininae.****I. Cecropis, Boje.**

1. Cecropis rustica, Boje. (Hirundo rustica, L.)  
 a) Cecr. stabulorum, Brm.  
 b) Cecr. pagorum, Brm.
2. Cecr. cachirica, Brm. (Hirundo cachirica, Licht. H. Boissonneau, Temm.)
3. Cecr. rufula, Boje. (Hirundo alpestris, Keys. et Blas.)

**II. Chelidon, Boje.**

1. Chelidon urbica, Boje. (Hirundo urbica, L.)  
 a) Chel. tectorum, Brm.  
 b) Chel. fenestrarum, Brm.  
 c) Chel. rupestris, Brm.

**III. Cotyle, Boje.**

1. Cotyle riparia, Boje. (Hirundo riparia, L.)  
 a) Cot. fluviatilis, Brm.  
 b) Cot. microrhynchos, Brm.
2. Cot. rupestris, Boje. (Hirundo rupestris et montana, Gmel., Linn.)
3. Cot. cachirica, Paul de Wrttb.

**IV. Progne, Boje.**

Prongne purpurea, Boje.

**Meropidae.****Meropinae.****I. Merops, L.**

1. Merops apiaster, L.  
 a) M. Hungariae, Brm.  
 b) M. elegans, Brm.
2. Merops aegyptius, Forsk. (Merops Savignyi, Cuv.)  
 Merops persicus, Pall.

**Alcedinidae.****Alcedininae.****I. Alcedo, Linn.**

1. Alcedo ispida, L.

a) Alc. subispida, Brm.

b) Alc. brachyrhynchos, Brm.

2. Alc. pallida, nobis.

3. Alc. bella, Brm. (Alc. ispida, L.)

**II. Ceryle, Boje.**

1. Ceryle rudis, Boje. (Alcedo rudis, L.)
2. Ceryle leucomelas, Brm.
3. Ceryle alcyon, Bp. (Alcedo alcyon, L.)

**Cuculidae.****Cuculinae.****I. Oxylophus, Sw.**

1. Oxylophus glandarius, Sw. (Cuculus glandarius, L.)
2. Oxylophus minor, Brm. (Cuculus macrourus, Brm.)

**II. Cuculus, L.**

1. Cuculus canorus, Linn.  
 a) Cuc. cinereus, Brm.  
 b) Cuc. longipennis, Brm. (mit kleinem Schnabel und sehr langen Schwingen.)

**III. Cureus, Boje.**

- Cureus americanus, Bp. (Cuculus americanus, carolinensis et dominicus, L.)

**Oriolidae.****Oriolinae.****Oriolus galbula, Linn.**

- a) Oriol. aureus, Brm.
- b) Oriol. garrulus, Brm.

**Coraciacidae.****Coracinae.****1. Coracias garrulus, Linn.**

a) Cor. germanicus.

b) Cor. planiceps.

**2. Coracias glaucopterus, Brm. (Coracias garrulus, L.)**

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie,  
vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Brehm Christian Ludwig

Artikel/Article: [Verzeichniss der europäischen Vögel nach den Species  
und Subspecies. 266-271](#)