

N. 24. (18.)

Verzeichniss

der bis jetzt in Tyrol beobachteten Vögel.

Von

Luigi Althammer.

(Aus dem Italienischen vom Herausgeber.)

-
1. *Falco communis*. Ist ziemlich selten; zeigt sich im Herbst und Frühjahr. Nur einmal erhielt ich das Nest mit zwei Eiern.
 2. „ *subbuteo*. Nistet in grosser Anzahl; man sieht und fängt besonders viele im August, wenige dagegen im Frühjahr. Selten im nördlichen Tyrol.
 3. „ *aesalon**). Seltener als *subbuteo*. Nistet. Sehr selten im nördlichen Tyrol.
 4. „ *tinnunculus*. Standvogel, findet sich das ganze Jahr hindurch in grosser Anzahl.
 5. „ *rufipes*. Erscheint nur in den spätern Tagen des April, und ist zu keiner andern Zeit beobachtet worden. Sehr selten in Nord-Tyrol.
 6. *Astur palumbarius*. Ziemlich selten. Nistet.
 7. „ *nisus*. Standvogel; sehr zahlreich in allen Jahreszeiten.
 8. *Circus rufus*. Ziemlich selten; zeigt sich im Herbste, aber sehr selten im vollkommenen Kleide. Nistet.
 9. „ *cyaneus*. In Nord-Tyrol im Sommer nicht selten und dasselbst nistend; ist er in Süd-Tyrol ziemlich selten und ich

*) Die vielen von mir in der Gefangenschaft erhaltenen *F. aesalon* wurden von mir mit dem Fleische von *Salmo Fario* (gemeine Forelle) gefüttert, worauf sie, wie es schien, mehr als auf jede andere Speise begierig waren.

Althammer.

Der Merlin ist so oft als in Mitteleuropa nistend angegeben worden, als diese Angaben bezweifelt worden sind. Es wäre in der That sehr erwünscht, darüber endlich völlig ins Klare zu kommen.

Baldamus.

habe nur ein einziges Individuum in vollkommen ausgefärbtem Kleide gesehen.

10. „ *cinereus*. Wie der vorhergehende, aber seltener.
11. *Aquila fulva*. Standvogel in ganz Tyrol, wo er an mehreren Orten nistet. In der Nähe von Roveredo wurden 1852 sechs Stück erlegt.
12. „ *imperialis*. Sehr selten; ich kenne nur 2 in Tyrol erlegte Exemplare.
13. „ *naevia*. Ziemlich selten.
14. *Haliaët. albicilla*. Ziemlich selten in Süd-Tyrol, weniger selten in Nord-Tyrol, wo von Zeit zu Zeit junge Individuen getödtet worden.
15. *Pandion Haliaëtos*. Einmal an der Etsch erlegt, und dies das einzige Mal, dass dieser Vogel in Tyrol beobachtet wurde.
16. *Buteo vulgaris*. Sehr gemein, und zwar das ganze Jahr hindurch.
17. „ *lagopus*. Sehr selten; ich kann noch nicht sagen, ob er in Tyrol nistet.
18. *Pernis apivorus*. Selten in Nord-Tyrol, ist er in Süd-Tyrol in der guten Jahreszeit nicht selten, und nistet auch daselbst.
19. *Circætos gallicus*. Sehr selten in Nord-Tyrol; in Süd-Tyrol werden alljährlich im August und September 5 oder 6 Individuen erlegt. Noch habe ich das Nest und die Eier dieses Vogels nicht gefunden, aber zu Anfang August 1846 wurde mir ein junger Vogel von einem Hirten gebracht, welcher mir versicherte, dass er ihn auf dem Monte Baldo gefunden habe.
20. *Milvus regalis*. Ziemlich selten; sehr selten in Nord-Tyrol.
21. „ *actolius (niger)*. Ziemlich selten, aber in Nord-Tyrol noch nicht beobachtet.
22. *Vultur fulvus*. Obgleich nach der Angabe vieler Autoren diese Art in Tyrol nicht selten sein soll, so ist das doch jedenfalls ein Irrthum, und *V. fulvus* ist in Tyrol nur als eine Species von zufälligem Vorkommen oder zufälligem Durchzuge zu betrachten. Ich weiss nur von dem Fange eines einzigen Individuums vor 14 Jahren an der Grenze von Tyrol und Cadorino.
23. *Gypæët. barbatus*. Seit 1810 erinnert sich Niemand diesen Vogel in Tyrol gesehen zu haben. In jenem Jahre wurden ein Männchen und Weibchen in der Nähe von Innsbruck er-

- legt; es sind dieselben Exemplare, glaube ich, welche man in der ornithologischen Sammlung der Universität von Monaco sieht. Seit dieser Zeit ist meines Wissens kein anderes Exemplar in Tyrol erlegt worden.
24. *Otus Bubo*. Standvogel; viel häufiger im Spätherbste und Winter als in jeder andern Jahreszeit.
 25. „ *otus*. Sehr gemein in jeder Jahreszeit.
 26. „ *brachyotus*. Zeigt sich häufig im Herbste, auch im Frühjahr. Nistet*).
 27. „ *scops*. Kommt im April an und zieht gegen Ende des August fort. Nistet in grosser Anzahl. In Nord-Tyrol noch nicht beobachtet.
 28. *Strix flammea*. Standvogel. Selten in Nord-Tyrol.
 29. „ *noctua*. Selten. Nistet. In Nord-Tyrol noch nicht beobachtet.
 30. „ *passerina*. Standvogel. Nistet; aber selten.
 31. „ *Tengmalmi*. Erscheint im Spätherbste, und ist in Nord-Tyrol weniger selten. Ich bin noch nicht gewiss, ob sie in Tyrol nistet.
 32. „ *aluco*. Standvogel.
 33. *Hirundo rustica*. Erscheint im März, und zieht im September fort, nachdem sie genistet.
 34. „ *urbica*. Wie vorige.
 35. „ *riparia*. Wie vorige, aber in geringer Anzahl.
 36. „ *rupestris*. Kommt später, als *H. rustica*, und wandert später fort. Sie nistet an den abschüssigsten und unersteiglichen nackten Felswänden; deshalb konnte ich mir hier noch nicht das Nest mit den Eiern verschaffen.
 37. *Cypselus apus*. Kommt im April an und geht im September fort, nachdem er genistet.
 38. *Melba*. Wie vorhergehender.
 39. *Caprimulg. europ.* Trifft in den letzten Tagen des April ein, und verlässt uns im August. Nistet hier.
 40. *Lanius excubitor*. Kommt im Mai und zieht in den ersten Tagen des September fort**), nachdem er genistet hat.
 41. „ *minor*. Wie voriger.
 42. „ *rufus*. Wie vorige, aber seltener.

*) Sehr interessant, wenn kein Irrthum! B.

***) Sollte er nicht Standvogel, wie im übrigen Europa sein ?

43. *Lanius collurio*. Wie vorige, ist die zahlreichste Art dieses Genus.
44. *Muscicapa grisola*. Kommt in den letzten Tagen des April, nistet und verlässt uns im September.
45. „ *atricapilla*. Wie voriger; aber seltener.
46. „ *albicollis*. Wie *grisola*.
47. „ *parva*. Ich sah diese Art nur einmal in Tyrol.
48. *Sylvia nisoria*. Kommt im Mai an, nistet und zieht im Oct. fort.
49. „ *cinerea*. Wie vorige, zieht aber Mitte Septembers fort.
50. *curruca*. Wie vorige.
51. „ *orphea*. Ziemlich selten; nistet.
52. „ *atricapilla*. Findet sich fast das ganze Jahr im südlichen Tyrol; und nur vom April bis September im nördlichen.
53. „ *hortensis*. Trifft nach Mitte Mai ein, nistet und zieht im September fort.
54. *Ficedula Trochilus*. Kommt im April, nistet, zieht im September fort.
55. „ *rufa*. Kommt im März, nistet, zieht gegen Mitte Octobers fort.
56. „ *sibilatrix*. Wie vorige*).
57. „ *Bonellii*. Diese Species habe ich nur von Mitte August bis zu den ersten Tagen des September in Süd-Tyrol beobachtet, niemals zu andern Zeiten; noch habe ich das Nest nicht auffinden können. In Nord-Tyrol ist sie noch nie gesehen worden.
58. „ *hypolais et italica*. Kommt im Mai, nistet, zieht Anfang Septembers fort.
59. *Salicaria turdina*. Kommt im April in spärlicher Anzahl, nistet, zieht im August fort.
60. „ *arundinacea*. Wie vorige.
61. „ *palustris*. Wie vorige, aber häufiger.
62. „ *phragmitis*. Wie vorige.
63. „ *aquatica*. Wie vorige.
64. „ *Locustella*. Selten. Ich bin noch nicht sicher, ob sie hier nistet.
65. *Lusciola Philomela*. Sehr selten in Süd-Tyrol, weniger selten in Nord-Tyrol, wo in jedem Frühjahr einige gefangen werden.

*) Kommt wol später, und zieht früher fort?

66. *Lusciola Luscinia*. In Nord-Tyrol nicht sehr häufig, aber nistend; in Süd-Tyrol sehr zahlreich vom Mai bis zum September.
67. „ *Phoenicurus*. Sehr gemein vom Mai bis zum October, nistet; in noch grösserer Anzahl in Nord-Tyrol.
68. „ *Thitys*. Wie vorige, aber weniger zahlreich.
69. „ *Rubecula*. Fast Standvogel in Süd-Tyrol, nistend; findet sich vom Mai bis zum October in Nord-Tyrol.
70. „ *Cyanecula*. Kommt im Mai und zieht im September fort. Ich habe nur Exemplare mit weissem Stern beobachtet; auch die Alten mit ganz blauer Brust und Kehle sind nicht selten, aber bei uns finden sich keine andern Species? oder Racen? oder Varietäten? als die genannte.
71. *Saxicola Oenanthe*. Kommt im April, nistet, zieht im Oct. fort.
72. „ *stapazina*. Kommt im April, nistet in der Nähe bewohnter Orte in den Mauern der Gärten und Höfe in ziemlicher Anzahl, und zieht Anfangs September fort. Nicht in Nord-Tyrol.
73. „ *aurita*. Wie vorige Art, aber weniger zahlreich. Nicht in Nord-Tyrol.
74. „ *rubetra*. } Kommen Ende April, nisten und ziehen im Sep-
75. „ *rubicola*. } tember fort.
76. *Anthus aquaticus*. Kommt nach Mitte März, und zieht sich auf unsere Hochgebirge um zu nisten, geht im October fort.
77. „ *pratensis*. Wie vorige.
78. „ *pratensis rufigularis*. Selten. Niemals in Nord-Tyrol beobachtet.
79. „ *Richardii*. Nur im Herbste. Selten.
80. „ *campestris*. Doppelter Durchzug.
81. „ *arboreus*. Kommt im April, nistet, zieht im August fort.
82. *Motacilla alba*. } Fast Standvögel.
83. „ *boarula*. }
84. „ *flava*. Erscheint in den ersten Tagen des Mai, nistet und zieht Anfang Septembers fort.
85. „ *flava cinereocapilla*. Wie vorige, aber in geringerer Anzahl.
86. „ „ *melanocephala*. Selten, ich habe sie nur im Frühjahr beobachtet. Sowol diese als vorige Art wurden nicht in Nord-Tyrol beobachtet.

87. *Turdus viscivorus*. Standvogel.
88. „ *pilaris*. Kommt gegen Ende des Herbstes und hält sich hier während des Winters auf und zieht im Februar fort. Im vergangenen Jahre habe ich eine sehr schöne Varietät dieser Drossel mit ganz weissem Kopfe und Halse gesehn.
89. „ *iliacus*. Doppelter Durchzug.
90. „ *musicus*. Desgleichen, nistet aber hier. Einige halten sich den Winter über in Süd-Tyrol auf.
91. „ *atrigrularis*. Nur zwei-junge Individuen wurden in Tyrol erlegt.
92. „ *torquatus*. }
 93. „ *Merula*. } Standvögel.
94. „ *saxatilis*. Kommt im April, nistet, geht im August fort. Ist ziemlich selten in Nord-Tyrol.
95. „ *cyaneus*. Standvogel*). Nistet in grosser Anzahl, aber stets an schwer zugänglichen Orten. Ist in Nord-Tyrol noch nicht beobachtet worden.
96. *Oriolus Galbula*. Kommt im April, nistet, zieht im August fort.
97. *Cinclus aquaticus*. Standvogel in Süd-Tyrol, in Nord-Tyrol nur während des Sommers.
98. *Accentor alpinus*. Standvogel.
99. „ *modularis*. Kommt im Mai, bleibt den ganzen October hindurch. Nistet.
100. *Troglodytes parvulus*. Standvogel. Während des Winters häufig in Nord-Tyrol.
101. *Regulus cristatus*. }
 102. „ *ignicapillus*. } Standvögel. Im Winter häufig in N.-Tyrol.
103. *Parus major, ater*. }
 104. „ *palustris*. } finden sich das ganze Jahr hindurch in Süd-
 105. „ *coeruleus*. } Tyrol; sind bei der grössten Kälte in Nord-
 106. „ *cristatus*. } Tyrol häufig.
 107. „ *caudatus*. }
108. „ *biarmicus*. Selten, aber in Nord-Tyrol beobachtet.
109. „ *pendulinus*. Wie vorige.
110. *Certhia familiaris*. Standvogel.

*) Auffallend, da *saxatilis* nicht als Standvogel bezeichnet wird.

111. *Sitta europaea*. Standvogel.
112. *Picus martius*. }
 113. „ *viridis*. } Desgl.
114. „ *canus*. Ziemlich selten. Ich weiss nicht sicher, ob er hier nistet.
115. „ *leuconotus*. Ein einziges Mal habe ich diese Species im Herbste gesehn. Ich weiss noch nicht, ob er in Nord-Tyrol nistet.
116. „ *major*. Sehr gemeiner Standvogel.
117. „ *medius*. Selten. Nistet.
118. „ *minor*. Sehr gemeiner Standvogel.
119. „ *tridactylus*. Nicht sehr häufig, aber Standvogel.
120. *Jynx torquilla*. Kommt im April, nistet, zieht im August fort.
121. *Cuculus canorus*. Kommt Anfang April und geht im Sept. fort.
122. *Upupa epops*. Hält sich in kleiner Anzahl um zu nisten in Tyrol auf, kommt im April und zieht im September fort.
123. *Alcedo ispida*. Standvogel, aber selten.
124. *Merops apiaster*. Ist von ziemlich unregelmässiger Passage im südlichen Tyrol, und wurde bisher immer gegen Mitte Mai und immer in kleiner Anzahl gesehn; nicht in N.-Tyrol.
125. *Corvus corax*. }
 126. „ *corone*. } Standvögel in Tyrol, häufiger in Nord-Tyrol.
 127. „ *cornix*. }
128. „ *frugilegus*. Kommt in zahlreichen Schwärmen im Herbst, bleibt während des Winters, und kehrt im Februar und März nach dem Norden zurück.
129. „ *Monedula*. In Süd-Tyrol von unregelmässigem Durchzuge, in manchen Jahren in Nord-Tyrol bleibend und nistend.
130. *Pica varia*. Standvogel.
131. *Nucifraga Caryocata*. Sehr zahlreich in Nord-Tyrol, wo er nistet; erscheint unregelmässig in Süd-Tyrol.
132. *Garrulus glandarius*. Standvogel.
133. *Pyrrhocorax alpinus*. Desgl.
134. *Fregilus graculus*. Nur einmal erhielt ich diesen Vogel in Süd-Tyrol; er ist selten in Nord-Tyrol; in der That fehlte er — und das als Beweis — der ornithologischen Sammlung des Museums zu Innsbruck noch im Jahre 1855.

135. *Coracias garrula*. Unregelmässiger Durchzug und in geringer Anzahl.
136. *Bombycilla garrula*. Desgl., seit 1848 in Tyrol nicht mehr geschn.
137. *Sturnus vulgaris*. Doppelter Zug; nistet nicht in Tyrol.
138. *Pastor roseus*. Ist immer im Juni erschienen. Ich beobachtete ihn 1854 und 1855 in ziemlich zahlreichen Schwärmen, welche sich einige Tage in Süd-Tyrol aufhielten. Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich diese Vögel alle 8 bis 10 Jahre zeigen.
139. *Alauda arvensis*. }
 140. „ *cristata*. } Standvögel in Süd-Tyrol, Zugvögel in N.-T.
 141. „ *arborea*. }
 142. „ *brachydactyla*. Zeigt sich unregelmässig im Spätherbste.
 143. „ *calandra*. }
 144. „ *alpestris*. } Zufälligen Vorkommens.
145. *Fringilla coelebs*. Standvogel.
146. „ *montifring*. Doppelter Zug.
147. „ *nivalis*. Standvogel, aber mehr einzeln.
148. „ *chloris*. Standvogel; doppelter Zug in Nord-Tyrol.
149. „ *citrinella*. Unregelmässiger Zug und in geringer Anzahl, im Herbste.
150. „ *cannabina*. Standvogel in Süd-Tyrol, doppelter Zug in Nord-Tyrol.
151. „ *flavirostris*. }
 152. „ *linaria*. } Diese 3 Species erscheinen nur im Herbste,
 153. „ *canescens*. } unregelmässig, häufiger stets in Nord-Tyrol.
154. „ *carduelis*. Standvogel in Süd-Tyrol, doppelter Zug in Nord-Tyrol.
155. „ *spinus*. Doppelter Zug.
156. *Passer domesticus*. Standvogel in Nord-Tyrol, niemals in S.-Tyrol gesehen.
157. „ *domest. cisalpinus*. Standvogel in Süd-Tyrol, niemals in Nord-Tyrol beobachtet.
158. „ *montanus*. Standvogel in Süd-Tyrol. und fast Standvogel in Nord-Tyrol.
159. „ *petronia*. Sein Erscheinen in Süd-Tyrol ist unregelmässig, er zeigt sich im Herbste in geringer Anzahl; sehr selten in Nord-Tyrol.

160. *Coccothraustes vulgaris*. Doppelter Zug. Nistet.
161. *Pyrrhula vulgaris*. Standvogel. *Pyrrh. coccinea* wurde niemals beobachtet.
162. „ *Serinus*. Doppelter Zug, nistet; viel seltener in N.-Tyrol.
163. „ *erythrina*. }
 164. „ *enucleator*. } Sehr selten im Herbste.
165. *Loxia pityopsittacus*. Selten.
166. „ *curvirostra*. Von irregulärem Zuge in Süd-Tyrol, wo einzelne nisten. Fast Standvogel in Nord-Tyrol, wo sehr viele nisten; auch *L. rubrifasciata* erscheint zugleich mit *curvir*.
167. „ *bifasciata*. Sehr selten in Süd-Tyrol; in Nord-Tyrol werden alle Jahre einige gefangen in denselben Netzen, welche man auf *L. curvir*. stellt.
168. *Emberiza citrinella*. Standvogel in Süd-Tyrol; doppelter Durchzug in Nord-Tyrol, wo er gleichfalls nistet.
169. „ *Cirlus*. Selten.
170. „ *hortulana*. Kommt im April an, geht im August fort, nistet; ziemlich selten in Nord-Tyrol.
171. „ *cia*. Standvogel in Süd-Tyrol; doppelter Durchzug in Nord-Tyrol, wo er gleichwohl nistet.
172. „ *Schoeniclus*. Doppelter Zug, nistet.
173. „ *palustris*. Selten, wurde noch nicht in N.-Tyrol beobachtet.
174. *Plectrophanes nivalis*. }
 175. „ *calcaratus*. } Sehr selten.
176. *Columba Palumbus*. }
 177. „ *Oenas*. } Doppelter Zug.
178. „ *Turtur*. Kommt im April, nistet, zieht im August fort.
179. „ *livia*. Findet sich nur im Zustande der Zählung.
180. *Tetrao Urogallus*. }
 181. „ *Tetrix*. } Standvögel in Tyrol; auch *T. medius* wird
 182. „ *Bonasia*. } häufig erlegt.
 183. „ *lagopus*. }
184. *Perdix graeca*. Sehr gemein in S.-Tyrol, nistet in grosser Menge, ist Standvogel. Sehr selten in Nord-Tyrol.
185. „ *cinerea*. Standvogel.
186. *Coturnix vulgaris*. Doppelter Zug, nistet.
187. *Otis tarda*. Erscheint zufällig; im Winter.

188. *Otis tetrax*. Sehr selten, erscheint im Winter.
189. *Glareola pratincola*. Zeigt sich, jedoch selten, am Gardasee.
190. *Oedicnemus crepitans*. Doppelter Zug, in kleiner Anzahl.
191. *Charadrius pluvialis*. Doppelter Zug, nistet in Nord-Tyrol.
192. „ *morinellus*.
 193. „ *cantianus*.
 194. „ *hiaticula*.
 195. „ *minor*. } Doppelter Zug, und eher selten.
196. *Vanellus cristatus*. Doppelter Zug.
197. „ *Squatarola*. Erscheint im Frühjahr, selten.
198. *Haematopus ostralegus*. Besucht zufällig die Ufer des Gardasees
199. *Scolopax rusticola*.
 200. „ *major*.
 201. „ *gallinago*.
 202. „ *gallinula*. } Doppelter Zug, und alle 4 nisten*) in Tyrol
 obwohl in geringer Anzahl.
203. *Limosa melanura*.
 204. „ *rufa*. } Selten, zeigen sich im Frühjahr.
205. *Tringa Canutus*.
 206. „ *subarquata*.
 207. „ *Cinclus*. } Zeigen sich beim Frühjahrszuge.
208. „ *minuta*. Erscheint auf dem Zuge im Juni.
209. *Machetes pugnax*. Zieht in Menge im Frühjahr durch; in S.-Tyrol niemals im Hochzeitkleide gesehn.
210. *Actitis hypoleucis*. Doppelter Zug; in grösserer Anzahl im Frühjahr.
211. *Totanus fuscus*.
 212. „ *glottis*.
 213. „ *stagnatilis*. } Selten, im Frühjahr.
214. „ *Glareola*. Selten, im Juni.
215. „ *calidris*.
 216. „ *ochropus*. } Die beiden häufigsten Arten dieses Genus im
 Herbst und Frühjahr.
217. *Numenius arquata*.
 218. „ *phaeopus*. } Zufälliger Durchzug.
219. *Recurvirostra avocetta*. Erscheint zufällig im Sommer am Gardasee.
220. *Himantopus melanopterus*. Zufällig an Gardasee.

*) Auch *gallinula*? Ist wol ein Irrthum! B.

221. *Ardea cinerea*. }
 222. „ *purpurea*. } Doppelter Zug, aber häufiger im Frühjahr.
 223. „ *egretta*. }
 224. „ *garzetta*. } Selten und nur im Frühjahr.
225. „ *comata*. }
 226. „ *nycticorax*. } Im Frühjahr regelmässig durchziehend, sel-
 227. „ *stellaris*. } ten im Herbst.
 228. „ *minuta*. }
229. *Ciconia alba*. Doppelter Zug.
 230. „ *nigra*. Frühjahrzug; nistete im Zillertal, Nord-Tyrol.
 231. *Ibis falcinellus*. Unregelmässiger Zug, im Frühjahr.
 232. *Platalea leucorod*. Zufälliger Zug.
 233. *Grus cinerea*. Doppelter Zug; wurde aber, so weit ich mich er-
 innere, nur 2 mal erlegt.
 234. *Fulica atra*. Doppelter Zug; einige Paare nisten in Nord-Tyrol.
 235. *Gallinula chloropus*. }
 236. „ *porzana*. } Doppelter Zug, nisten.
 237. „ *pusilla*. Desgl., selten.
 238. „ *Bailloni*. Noch seltener, als vorige Art.
 239. *Crex pratensis*. }
 240. *Rallus aquaticus*. } Doppelter Zug, nisten.
241. *Podiceps cristatus*. Man sieht in Süd-Tyrol nur junge Individuen
 im Winter; in Nord-Tyrol zeigen sich auch alte.
 242. „ *rubricollis*. Zeigt sich immer nur im Jugendkleide im Win-
 ter, nur ein einziges Mal erhielt ich ein sehr schönes altes
 Individuum.
 243. „ *auritus*. Wie vorige; ich habe in Tyrol nie ein altes Indivi-
 duum gesehen.
 244. „ *minor*. Ist der gemeinste, einzelne nisten; auch kann man
 sagen: Standvogel.
 245. *Colymbus glacialis*. Es erscheinen nur Junge im Winter.
 246. „ *arcticus*. Wie voriger; nur einmal erhielt ich, im Januar
 1854, zwei sehr schöne alte Individuen.
 247. „ *septentrionalis*. Ist der gemeinste. Im Winter, aber stets
 im Jugendkleide.
 248. *Anser cinereus*. Auf dem Zuge. Selten.
 249. „ *segetum*. Doppelter Zug. Erscheint in grossen Haufen.

250. *Anser albifrons.* }
 251. „ *Bernicla.* } Im Winter. Sehr selten.
252. *Cygnus olor.* }
 253. „ *musicus.* } Haben sich immer nur in sehr strengen Wintern
 auf den Seen Tyrols gezeigt.
254. *Anas boschas.* Standvogel.
255. „ *crecca.* }
 256. „ *querquedula.* } Alle diese Enten kommen im October und
 257. „ *strepera.* } November an, halten sich auf unsern Seen
 258. „ *penelope.* } auf, und wandern im Februar nach Norden
 259. „ *acuta.* } zurück.
 260. „ *clypeata.* }
261. „ *tadorna.* Selten, im Winter.
262. „ *mollissima.* Ich habe nur 2 junge Individuen dieser Art ge-
 sehen, im December.
263. „ *nigra.* }
 264. „ *fusca.* } Nur Junge zeigen sich im Winter auf dem
 Gardasee.
265. „ *glacialis.* Die Jungen kommen im Winter auf die Seen von
 Nord-Tyrol.
266. „ *clangula.* }
 267. „ *fuligula.* } Ziemlich zahlreich im Winter auf dem Gardasee.
268. „ *marila.* }
 269. „ *ferina.* } Ebenso, aber weniger häufig.
 270. „ *nyroca.* }
271. „ *rufina.* Ziemlich selten und nur im Winter.
272. *Mergus merganser.* }
 273. „ *serrator.* } Selten, sehr selten die Alten.
274. „ *albellus.* Die Jungen, im Winter, sehr selten die Alten.
275. *Pelecanus onocrotalus.* Ein einziges Mal wurden 2 Pelckane auf
 dem Gardasee gesehn und 2 Tage später auf dem See von
 Mantova geschossen.
276. *Carbo cormoranus.* Erscheint, im November und hält sich den
 Winter über auf der Etsch und dem Gardasee auf.
277. *Larus marinus.* }
 278. „ *argentatus.* } Zeigen sich im Sommer auf dem Gardasee,
 aber selten.
279. „ *canus.* Auf dem Gardasee in allen Jahreszeiten gemein,
 nistet nicht.

280. *Larus tridactylus*. Zeigt sich auf den kleinen Seen, aber selten und im Jugendkleide.
281. „ *ridibundus*. Gemein und zahlreich auf dem Gardasee in allen Jahreszeiten; nistet.
282. „ *ridibundus minor*. Zeigt sich im Sommer auf dem Gardasee.
283. „ *melanocephalus*. } Selten, ich erhielt nur einige Individuen
284. „ *minutus*. } vom Gardasee, im Sommer.
285. *Sterna hirundo*. Auf dem Gardasee und der Etsch in der schönen Jahreszeit.
286. „ *minuta*. } Diese Arten besuchen den Gardasee, aber
287. „ *nigra*. } unregelmässig, so dass mehre Jahre verge-
288. „ *leucoptera*. } hen, ohne dass man sie sieht.

N. 25. (19.)

Die Sylvien der Insel Sardinien.

von

Dr. Alfred Hansmann.

Sänger, *Sylvia*, *Lath.*

Wir haben von dieser Gattung, welche wieder in die sieben Untergattungen der Rohrsänger, Spötter, Laubvögel, Strauchsänger, Grasmücken, Erdsänger und Rothschwänze zerfällt, 25 Arten auf der Insel Sardinien.

Den Cistensänger können wir wohl kaum, und den Cettisänger vielleicht kaum zu den Sylvien rechnen. Indessen mögen sie vorläufig bei ihnen stehen bleiben.

(Da die Bezeichnungen der Sarden zu wissen, manchem Leser der *Naumannia* angenehm sein könnte, habe ich diejenigen der am meisten verschiedenen Dialecte des C. M. (*Capo meridionale*, südlicher Theil der Insel zwischen den Städten Cagliari und Oristano, die Ebene des Campidano umfassend) und des C. S. (*Capo di sopra*, nördliche Hälfte von Oristano bis zum *Capo del Falcone*) bei jedem Vogel hinzugefügt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Althammer Luigi

Artikel/Article: [Verzeichniss der bis jetzt in Tyrol beobachteten Vogel. 392-404](#)