

kleinen Vorwerkes zu flüchten, wo sie unter den breiten Blättern des Kohls und der Rüben sichern Schutz fanden. In der ganzen hiesigen Provinz wird dieselbe grosse Anzahl dieser Raubvögel bemerkt. Vor zwei Jahren sollen zum ersten Male diese Vögel in grösserer Menge als gewöhnlich gesehen sein, doch lange nicht so sehr häufig als in diesem Herbste.

No. 22.

Verzeichniss der in West-Gothland bis jetzt von mir brütend gefundenen Vögel, so wie der Zugvögel im Jahre 1857 — 1858.

Von

H. Gadamer.

	Gesehen.	Brütend.	Im Winter.	Vorkommen.
<i>Aquila fulva</i>	*		*	
" <i>albicilla</i>	*	*	*	am Strande des See Wettern.
" <i>haliaetos</i>	*	*	—	
<i>Falco gyrfalco</i>	—	—	*	selten.
" <i>peregrinus</i>	*	*	—	auf dem Trappfelsen ein Paar.
" <i>subbuteo</i>	*	*	—	
" <i>lithofalco</i>	—	*	—	Angabe von Kolthoff.
" <i>tinnunculus</i>	*	*	—	auf den Trappfelsen.
" <i>buteo</i>	*	*	—	gemein.
" <i>lagopus</i>	*	—	—	im Herbstzuge.
" <i>apivorus</i>	—	*	—	Angabe von Kolthoff.
" <i>melvus</i>	*	*	—	nicht häufig.
" <i>nisus</i>	*	*	—	nicht häufig.
" <i>palmarius</i>	*	*	—	häufig.
" <i>cyaneus</i>	*	—	—	selten.
<i>Stryx nyctea</i>	—	—	*	Winter 1857.
" <i>temminckii</i>	—	—	*	selten.
" <i>noctua</i>	*	*	—	ziemlich häufig.
" <i>uralensis</i>	*	—	*	selten.

	Gesehen.	Brütend.	Im Winter.	Vorkommen.
<i>Strix funerea</i>	*	—	*	nicht so selten.
„ <i>aluco</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>Bubo</i>	*	*	—	in mehreren Paaren auf den Trappfelsen.
„ <i>otus</i>	*	*	—	seltner.
<i>Lanius excubitor</i>	*	—	*	jedes Jahr.
„ <i>collurio</i>	*	*	—	ziemlich gemein.
<i>Picus martius</i>	*	*	—	gemein.
„ <i>viridis</i>	*	*	—	seltner.
„ <i>canus</i>	*	—	—	nur einmal gesehen.
„ <i>leuconotus</i>	*	—	—	sehr selten.
„ <i>major</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>minor</i>	*	*	—	nicht selten.
„ <i>tridactylus</i>	*	*	—	nicht häufig.
<i>Cuculus canorus</i>	*	*	—	häufig.
<i>Jynx torquilla</i>	*	*	—	sehr häufig.
<i>Certhia familiaris</i>	*	*	—	ziemlich selten.
<i>Sitta europaea</i>	*	—	*	nicht häufig.
<i>Corvus monedula</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>corax</i>	*	*	—	nur einige Paare.
„ <i>frugilegus</i>	*	—	—	junges, welches ich früher für <i>corone</i> hielt.
„ <i>cornix</i>	*	*	—	häufig.
<i>Pica varia</i>	*	*	—	sehr häufig.
<i>Caryocatactes guttata</i>	*	?	—	gesehen am 8. Juni 2 Stück.
<i>Garrulus glandarius</i>	*	*	—	häufig.
<i>Sturnus vulgaris</i>	*	*	—	gemein.
<i>Bombycilla garrula</i>	*	—	—	einige Individuen.
<i>Upupa epops</i>	*	*	—	bei dem Städtchen Hjo.
<i>Coracias garrula</i>	—	—	—	nach Angabe Anderer bei Hjo.
<i>Cypselus apus</i>	*	*	—	gemein.
<i>Caprimulgus europaeus</i>	*	*	—	gemein.
<i>Hirundo rustica</i>	*	*	—	gemein.
„ <i>urbica</i>	*	*	—	gemein.
<i>Muscicapa grisola</i>	*	*	—	gemein.
„ <i>atricapilla</i>	*	?	—	selten.

	Gesehen.	Brütend.	Im Winter.	Vorkommen.
<i>Cinclus aquaticus</i>	*	*	—	am Tidaflusse.
<i>Turdus pilaris</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>musicus</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>viscivorus</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>merula</i>	*	*	—	nicht häufig.
<i>Anthus pratensis</i>	*	*	—	in Menge.
„ <i>arboreus</i>	*	*	—	gemein.
<i>Saxicola rubetra</i>	*	*	—	gemein.
„ <i>oenanthe</i>	*	*	—	gemein.
<i>Alauda arborea</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>arvensis</i>	*	*	—	häufig.
<i>Motacilla alba</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>flava</i>	*	*	—	nicht so häufig wie vorige.
<i>Sylvia cinerea</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>curruca</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>hortensis</i>	*	*	—	ziemlich in Menge.
„ <i>trochilus</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>abietina</i>	*	?	—	häufig.
„ <i>sibilatrix</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>hypolais</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>phoenicurus</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>rubecula</i>	*	*	—	seltner.
<i>Parus major</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>palustris</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>var. borealis</i>	*	*	—	häufiger.
„ <i>caudatus</i>	*	?	—	in Menge.
„ <i>ater</i>	*	*	—	in Menge.
„ <i>cristatus</i>	*	*	—	ziemlich häufig.
<i>Accentor modularis</i>	*	—	—	selten.
<i>Regulus cristatus</i>	*	*	—	häufig.
<i>Troglodytes europaeus</i>	*	*	—	selten.
<i>Emberiza citrinella</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>hortulana</i> .	*	*	—	nicht selten.
„ <i>schoeniclus</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>nivalis</i>	*	—	*	in Zügen jeden Winter.
<i>Fringilla coccothraustes</i>	*	*	—	selten.

	Gesehen.	Brutend.	Im Winter.	Vorkommen.
<i>Fringilla chloris</i>	*	*	—	selten.
„ <i>coelebs</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>domestica</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>montana</i>	*	*	—	ziemlich selten.
„ <i>cannabina</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>montifringilla</i>	*	—	*	in Flügen.
„ <i>flavirostris</i>	*	—	*	selten.
„ <i>linaria</i>	*	—	*	in Zügen.
„ <i>spinus</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>carduelis</i>	*	*	—	selten.
<i>Pyrrhula vulgaris</i>	*	*	—	in Menge.
<i>Loxia curvirostris</i>	*	*	—	in Menge.
„ <i>pityopsittac.</i>	*	*	—	selten.
<i>Corythus enuel.</i>	*	—	*	einmal gesehen.
<i>Columba oenas</i>	*	*	—	einige Paare.
„ <i>palumbus</i>	*	*	—	jährlich einige Paare.
<i>Perdix cinerea</i>	*	*	—	häufig.
<i>Tetrao tetric</i>	*	*	—	häufig.
„ <i>urogallus</i>	*	*	—	ziemlich häufig.
„ <i>bonasia</i>	—	*	—	nach Angabe Anderer.
<i>Charadrius minor</i>	*	*	—	selten.
„ <i>hiaticula</i>	*	*	—	am Wartostasee ein Paar.
„ <i>apricarius</i>	*	?	—	auf den Bergplateaus.
<i>Vanellus cristat.</i>	*	*	—	selten.
<i>Ardea cinerea</i>	*	*	—	am Wetterensee.
<i>Ciconia alba</i>	*	—	—	selten.
„ <i>nigra</i>	*	—	—	häufiger, öfters geschossen.
<i>Grus cinerea</i>	*	*	—	nach Angabe Anderer.
<i>Numenius arquatus</i>	*	*	—	gemein.
<i>Machetes pugnax</i>	*	*	—	Wartostasee ziemlich gemein.
<i>Totanus glareola</i>	*	*	—	ziemlich allgemein.
„ <i>ochropus</i>	*	*	—	wie vorige.
„ <i>hypoleucos</i>	*	*	—	wie vorige.
„ <i>calidris</i>	*	—	—	Wartostasee.
<i>Scolopax rusticola</i>	*	*	—	in Menge.
„ <i>major</i>	*	*	—	in Menge.

	Gesehen.	Brütend.	Im Winter.	Vorkommen.
<i>Scolopax gallinago</i>	*	*	—	in Menge.
„ <i>gallinula</i>	*	—	—	einmal im Herbste gesehen.
<i>Gallinula crex</i>	*	*	—	gemein.
„ <i>porzana</i>	*	?	—	einmal auf der Entenjagd.
<i>Sterna nigra</i>	*	*	—	Wartostasee.
„ <i>hirundo</i>	*	*	—	am Wettersee.
<i>Larus canus</i>	*	*	—	am Wettersee.
<i>Cygnus musicus</i>	*	—	—	auf dem Zuge gemein.
<i>Anser cinereus</i>	*	—	—	auf dem Zuge gemein.
„ <i>albifrons</i>	*	—	—	auf dem Zuge gemein.
„ <i>torquatus</i>	*	—	—	Herbstzug.
<i>Anas boschas</i>	*	*	—	sehr gemein.
„ <i>crecca</i>	*	*	—	hier und da.
„ <i>acuta</i>	—	*	—	hat auf den Wiesen am Tida gebrütet, nach Audern.
„ <i>penelope</i>	*	*	—	einige Male gebrütet.
„ <i>clangula</i>	*	—	*	auf dem Zuge.
„ <i>glacialis</i>	—	—	*	einmal auf dem Tida geschos- sen.
„ <i>fusca</i>	—	—	—	nach Angabe Andrer manch- mal auf Wetter.
<i>Mergus merganser</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>serrator</i>	*	*	—	nicht häufig.
„ <i>albellus</i>	*	—	*	Tida, einmal gesehen.
<i>Colymbus arcticus</i>	*	*	—	ziemlich häufig auf dem Wet- tern- und allen Seen darum.
„ <i>septentrionalis</i>	*	*	—	seltner.
<i>Podiceps rubricollis</i>	*	*	—	Wartostasee.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Gadamer H.

Artikel/Article: [Verzeichniss der in West-Gothland bis jetzt von mir brütend gefundenen Vögel, so wie der Zugvögel im Jahre 1857-1858 291-295](#)