

N a c h t r a g

von

Herrn Bergrath GOTTLIEB PUSCH

in Warschau.

Ausser den hier verzeichneten Petrefakten hat Hr. Staatsrath FISCHER v. WALDHEIM aus denselben Tertiär-Gebirgen noch bestimmt:

A. A u s P o d o l i e n .

Cardium revolutum.	Erycina costata.
Modiola pectiniformis? DESH.	Fistulana muricata.
„ sulcata.	Solen effusus LK.
Solen ovalis DESH.	„ laevigatus.
Venericardia clathrata.	Lucina gibbosula LK.
„ intermedia.	„ sulcata LK.
Turbo squamalurius LK.	Venericardia scalaris Sw.
Pecten triplicatus.	„ deltoidea Sw.
Cerithium thiarella DESH.	Cytherea suberycinoides D.
Cardium gracile PUSCH.	Saxicava modiolaris DESH.
Venericardia carinata.	Crassatella laevigata LM.
„ laevicosta.	Buccinum baccatum BAIBERAU.
Cytherea obliqua DECH.	Trochus Buchii DUB. (T. Puschii ANDRZ.).
Erycina plana.	Trochus imbricatus Sw.
„ rostrata.	Turbo obliteratedus.
Cyclostoma sulcatum.	Helix Tristani BRNGN.
Mytilus gibbosus.	„ Ferrandi? DESH.
„ laevigatus.	Melania laevigata.
Cardium nobile.	Lima granulata.
Solen succinctus.	

B. A u s B e s s a r a b i e n .

Turbo bicarinatus ANDRZ.	Cerithium laevigatum.
Trochus podolicus DUB.	„ tricostatum.
„ quadrisulcatus D.	Venericardia patula.
„ semigranulatus D.	Corbula sulcata.
„ interstinctus n. sp.	Mytilus alaeformis Sw.
„ coronatus.	„ margaritinus.
„ reticulatus PUSCH.	Plagiostoma planicostatum.
„ Cremenensis ANDRZ.	Venericardia cardiiformis.
„ depressus.	Arca carinata.
„ sulcatus LK.	Solen distinctus.
Turritella sulcata.	Cardium emarginatum.
„ bicarinata PUSCH.	Mytilus distinctus.
Melania cochlearella.	Trochus dubius.

Melania turritelliformis.	Cardium emarginatum.
„ laevigata DESU.	Cytherea nitens LK.
Cardita triplex n. sp.	Cerithium thiaræ LK.
Venericardia chamaeformis.	„ plicatum BRUG.
„ orbicularis.	Astarte crassatellaeformis P.
Paludina semicarinata BRCH.	Cardita sulcata.
Tornatella insignis.	Venericardia radiata.
Melanopsis fusiformis Sw.	Petricula rupestris BROCCHI.

Anmerk. Dem Wunsche des Vf's. gemäss habe ich dieses zweite Verzeichniss nach den Bestimmungen des Hrn. Staatsrath FISCHER hienach beigelegt, ohne jedoch von meiner Seite eine Verantwortung mehrerer dieser Bestimmungen übernehmen zu können; denn so entspricht z. B. das aufgeführte *Buccinum baccatum* BASTEROT, wie ich schon in meiner Paläontologie von *Polen* gezeigt habe, nicht dieser französischen Art, sondern gehört zu *Buccinum propinquum* Sow. Offenbar enthält das oben zuerst gegebene Verzeichniss nach den Bestimmungen von Hrn. EICHWALD nur einen kleinen Theil der *Podolisch-Bessarabischen* Tertiär-Petrefakten: gar viele fehlen darinnen, die in jenen Gegenden sehr häufig und zum Theil charakteristisch sind, so z. B. alle *Nassa*-, *Mitra*-, *Conus*-, *Natica*-, *Cancellaria*-, *Murex*- und *Pleurotoma*-Arten, wie mau leicht bei der Vergleichung mit dem Verzeichniss erkennen wird, was ich davon in meiner polnischen Paläontologie gegeben habe.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie](#)

Jahr/Year: 1841

Band/Volume: [1841](#)

Autor(en)/Author(s): Pusch Georg Gottlieb

Artikel/Article: [Nachtrag 544-545](#)