

Ziegler Sturau, k. k. pens. Hauptmann in Gratz. — Einges. 500
Expl. aus der Flora von Venedig.

Da ich mich im Laufe des Jahres über alle den Verein, dessen Tausch und Verkauf betreffenden Angelegenheiten im I. Jahrgange des Oesterreichischen botanischen Wochenblattes ausgesprochen habe, so bedarf es in diesem Bericht keiner weiteren Erörterungen.

V. Continuatio

Elenchi duplicatorum.

Omnes plantae in statu spontaneo lectae sunt.

- | | | |
|---|---|---|
| Abies
excelsa DC. | Asterolimon
stellatum Link. | Cirsium
oleraceo-bulbos. Næg.
setosum M. B. |
| Achillea
lingulata W. K.
odorata L. | Astragalus
Wulfenii K. | Clypeola
Josthaspi L. |
| Aconitum
septentrionale Bmg. | Ballota
urticaefolia Ortun. | Colechicum
arenarium W. K. |
| Ajuga
alpina Vill. | Barkhausia
scariosa Mönch. | Convolvulus
Imperati Vahl. |
| Aldrovanda
vesiculosa L. | Bromus
confertus M. B. | Coronilla
valentina L. |
| Allium
Chamaemoly L. | Bupleurum
caricifolium W. | Crocus
speciosus M. B.
variegatus Hoppe. |
| Allyssum
sinuatum L. | Buphtalmum
cordifolium W. K. | Cuscuta
monogyna Vahl. |
| Andropogon
pubescens Vis. | Callitriche
caespitosa Schultz.
vernalis Kütz. | Cynanchum
contiguum Koch. |
| Antemis
altissima L. | Campanula
garganica Ten.
Waldsteiniana R. S. | Cyperus
polystachyos Brtt. |
| Anthrolobium
scorpioides Desf. | Carduus
leucographus L. | Cytisus
elongatus W. K. |
| Arabis
incana Roth. | Carex
Balbisii Spr.
filiformis L. | Danthonia
calycina Rb. |
| Aretia
lomentosa Seht. | Carlina
simplex W. K. | Dianthus
petreus W. K.
vaginatus Rb. |
| Arisarum
vulgare Host. | Carpinus
duinensis Scop. | Drosera
obovata M. K. |
| Artemisia
annua Willd.
valesiaca All. | Centaurea
decipiens Rb.
mollis W. K. | Echinospermum
squarrosum Rb. |
| Asparagus
marinus Cus. | Cerastium
strictum L. | Epilobium
collinum Gmel.
grandiflorum Tausch.
lanceolatum S. M. |
| Asplenium
Halleri R. Br. | Chara
hispida L. | Equisetum
campestre Schults.
inundatum Lasch.
pratense Ehrh. |
| Aster
lanceolatus W.
novae Angliae W.
Tradescantii Ait. | Cineraria
pratensis Hoppe | |
| Asterocephalus
Scopolii Rb. | | |

Euphorbia
peploides *Gon.*
Wulfenii *Hoppe.*

Euphrasia
micrantha *Rb.*

Figago
pygmaea *L.*

Fritillaria
montana *Hppe.*

Gagea
Schreberi *Rb.*

Galium
divaricatum *Lam.*
spurium *L.*

Gastroidium
lendergerum *Gaud.*

Genista
diffusa *W.*
nervata *W. K.*

Gentiana
angustifolia *Vill.*

Glechoma
major *Gaud.*

Glyceria
festuciformis *Heyduk.*

Glycyrrhiza
glandulifera *W. K.*

Gypsophila
scabra *Schult.*

Hieracium
flexuosum *W.*

Holochloa
filiformis *Rb.*

Hypericum
Elodes *L.*

Jasminum
fruticans *L.*

Iberis
saxatilis *L.*

Imperata
cylindrica *P. B.*

Juncus
paniculatus *Hoppe.*
stygius *L.*

Klitalbella
vitifolia *Willd.*

Lamium
nemorale *Rb.*

Lemna
archiza *L.*

Leontodon
Berinii *Rb.*
croceus *Haecke.*

Linaria
origanifolia *DC.*

Linum
angustifolium *Huds.*
humile *Müll.*
nodiflorum *L.*
Tommasinianum *Rb.*

Lolium
italicum *R. Br.*

Lotus
major *Scop.*

Luzula
glomerata *Mietich.*
pallens *Hoppe.*

Malva
nicaeensis *All.*
vulgaris *Trag.*

Marubium
candidissimum *L.*

Melampyrum
saxosum *Bing.*

Melilotus
sulcata *Desf.*

Mentha
piperita *L.*
pubescens *W.*

Micropus
erectus *L.*

Mischia
erecta *Fl. W.*

Molinia
litoralis *Hst.*

Myosotis
luxiflora *Rb.*

Narcissus
radiiflorus *Sat.*
Tazetta *L.*

Nepeta
citriodora *Bath.*

Nymphaea
minor *D. C.*

Oenanthe
silatifolia *M. B.*

Ophloglossum
lusitanicum *L.*

Orcis
provincialis *Bath.*

Ornithogalum
refractum *Kit.*
sulphureum *Bert.*

Orobancha
minor *Sutt.*

Orobis
maritimus *Rb.*
venetus *Clus.*

Panicum
stagninum *Hst.*

Passerina
hirsuta *L.*

Pedicularis
Friederici-August. *Tow.*

Periploca
graeca *L.*

Phillyrea
media *L.*

Pieris
umbellata *N. v. Esb.*

Pistacia
lentiscus *L.*

Plantago
Bellardi *All.*
Cornuti *Gon.*
maxima *All.*
minima *DC.*

Polygala
exilis *DC.*

Polygonum
tataricum *L.*

Porrum
Cepa *Rb.*

Potamogeton
praelongus *Wulf.*

Poterium
glaucescens *Rb.*

Prasium
majus *L.*

Psoralea
bituminosa *L.*

Pyrrhetrum
Clusii *Fisch.*

Rosa
villosa *L.*

Rubus
apiculatus *Weibe*
argenteus *Weibe*
carpinifolius *Weibe*
glandulosus *Bell.*
infestus *Weibe*
Schleicheri *Weibe*
suberectus *And.*
villicaulis *Köhl.*

Rumex
divaricatus *L.*
palustris *Sm.*

Rupia
maritima *L.*

Salix
aquatica *Sm.*
gracilentia *Tausch.*
purp. transitoria *Karl.*
sphaelata *Waltg.*
Timmii *Schk.*

Salvia
napifolia *Jacq.*

Saussurea
macrophylla *Sant.*

Saxifraga
Kochii *Hornig.*

Scabiosa
hybrida *All.*

Scelopendrium
officinarium *Sm.*

Sencio
erraticus *Bert.*

Serapias
longipetala *Poll.*

Serratula
nudicaulis DC.
radiata M. B.

Sesell
tortuosum L.

Silene
infracta W. K.
viridiflora L.

Sonchus
maritimus L.

Spergula
Morrisonii Bor.

Stachys
biennis Roth.
maritima L.

Stellaria
Dilleniana Münch.

Symphitum
cordatum W. K.

Taraxacum
alpinum Schultz.

Theligonum
Cynocrambe L.

Tilia
oxycarpa Rb.

Torilis
heterophylla Guss.

Tragopogon
Tommasinii Sch.

Trichonema
bulbocodium Ker.

Trifolium
expansum W. K.
maritimum Hud.

Trigonella
foenum graecum L.

Typha
elatior Rönk.

Valeriana
exaltata M. K.

Veronica
foliosa W. K.

Viola
sordida W. K.

Vigna
microstachia Ehrh.
Alex. Skofitz.

Mittheilungen.

— Der neuen französischen Strafkolonie in Cayenn soll eine wissenschaftliche Commission, bestehend aus einem Arzte, Botaniker und Geologen, beigesetzt werden. Diese Commission hat den Zweck, den ganzen Theil des südamerikanischen Festlandes bis zum Amazonenstrom zu untersuchen.

— Die Anzahl der Handelsgärtner in Wien beläuft sich nach dem neuesten Ausweise auf 328, darunter 147 Gemüse- und 181 Zier- und Handelsgärtner.

— Einem Briefe aus London an die allgemeine Gartenzeitung (Nr. 1) zufolge, sollen zwei englische botanische Zeitschriften eingehen, nämlich *The Gardener's Mag. of Botany and the botan. Gazette*. Reine botanische Zeitschriften werden also künftig nur zwei bestehen: *Hooker's, London Journ. of Botany* und *Newman's Phytologist*. — Von Dr. Hooker's *Rhododendrons* ist der letzte Theil schon erschienen. Dem Vernehmen nach soll er entschlossen sein, eine Umarbeitung seiner *Rhododendron* in einem botanischen Journale vorzunehmen. Derselbe Berichtsteller meldet auch, dass Herr Fielding, der mit Dr. S. Gardener, dem brasilianischen Reisenden, das *Sertum plantarum* herausgab, gestorben sei. Er hinterlässt eines der reichhaltigsten Herbarien der Welt, das kurz vor seinem Tode noch mit dem Herbarium Gardener's vereinigt wurde. Die Universität Oxford ist Erbe desselben. — Abermals ist in London eine Pflanze aus China angekommen, die man für die echte Reispapierpflanze der Chinesen hält. Hooker wird sie unter dem Namen *Arabis? papyrifera* abbilden und beschreiben.

— Afrikanische Baumwolle aus Liberia ist auch heuer wieder in England angelangt. Erst zwei Jahre sind es, dass daselbst Versuche mit Baumwollpflanzungen gemacht wurden, und sie sind so glücklich ausgefallen, dass die Unternehmer durch ihre ersten Versuche ganz zufriedengestellt sind.

— *Gentiana puberula* Bot. Rep. (erecta Willd.) ist eine der prachtvollsten Pflanzen Nordamerikas, die bei New-York und in mehreren anderen Gegenden in Menge vorkommt. Einigemal wurde schon ihre Einführung in die deutschen Gärten versucht, da sie aber bisher keine reifen Samen erzeugte, konnte sie nicht zur allgemeinen Aufnahme gelangen.

— Ueber die Knollen von *Ullucus tuberosus* wurden bei der letzten Versammlung der Landwirthschafts-Gesellschaft in Leibach zahlreiche Versuche angestellt. Man kam zum Resultate, dass genannte Pflanze wegen ihrer kleinen Knollen und des erdigen und wässerigen Geschmacks derselben, keinen Vergleich mit unseren Kartoffeln aushalten kann.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Skofitz Alexander

Artikel/Article: [5. Continuatio, Elenchi duplicatorum.](#)
[38-40](#)