

d. tenerilla Schaeff. — *Peltigera horizontalis* Hoffm. — *Pell. polydactyla* Hoffm. — *Ramatina caticaris* d. *farinacea* Schaeff. — *R. polissaria* Ach. — *R. polymorpha* Ach. — *Usnea barbata* A. A. *floridula* Hoffm. et A. B. *hirta* Hoffm. — *Prasiola crispa* Rbhst.

Andreaea alpina Hedw. — *Aneura pinguis* Nees. — *Anomodon curtipendulus* Hook. — *Barbula ruralis* Hedw. — *Bartramia fontana* Swartz. — *B. Oederi* Sw. — *B. pomiformis* Hedw. — *Bryum binnum* Schreb. — *Br. caespit. b. gracilescens* Br. Sch. — *Br. pyriforme* Hedw. — *Dicranum pellucidum* Hedw. — *D. undulatum* Ehrh. — *Encalypta streptocarpa* Hedw. — *E. vulgaris* Hedw. — *Ectadium verticillatum* Br. Sch. — *Fissidens bryoides* Hedw. — *Fouquiauxia antipyretica* L. — *Grimia ovata* Web. M. — *Hypnum cupressif. d. fitiforme* Brid. — *H. curvatum* Sw. — *H. torenii* L. — *H. tudescent* Hedw. — *H. riparium* L. — *H. ruscifolium* Hübn. — *H. striatum* Schreb. — *Leskeia patulosa* Hedw. — *L. sericea* Hedw. — *L. trichomanoides* Hedw. — *Orthotrichum affine* Schrad. — *O. anomatum* Hedw. — *O. crispum* Hedw. — *Physcomitrium pyriforme* Brid. — *Polytrichum nanum* Hedw. — *Racomitrium heterostichum* Brid. — *Riccia fluitans* L. — *Schistidium apocarp. rivulare* Nees. — *Thysanomyrtion flexuos. b. saxicola* Rabh. Sämtliche Cryptogamen aus Baiern und Böhmen, eingesandt von Dr. Walther und Karl.

Mittheilungen.

— Eine Ausstellung von Gartenproducten in Pesth hat Dr. Topperzer, aus Gr. Petersdorf, veranstaltet. Selbe umfasste 1200 Gegenstände, darunter 220 Arten Kartoffel, 100 Arten Rüben, 50 Arten Getreide u. s. w.

— Die russische geographische Gesellschaft eröffnete neuerdings ihre Sitzungen am 4. November. Die Gesellschaft steht im Begriffe mehrere Unternehmungen auszuführen, deren erste in einer Expedition nach Ost-Sibirien und Kamtschatka besteht, welcher sich mehrere bekannte Gelehrte anschliessen werden, die Forschungen in Bezug auf Landwirtschaft, Naturwissenschaft und Geologie anstellen wollen. (Nord. Bienn.)

— Das Klima von Siam und sein Boden in den der Überschwemmung ausgesetzten Landesteilen sind der Pflanzentwicklung sehr günstig. Der Reiss ist vortrefflich. Cocosnuss wird vielfach gezogen. Bangkok ist von einem Walde von Fruchtbäumen umgeben, deren Erträgnisse eben so mannigfaltig als ausgesetzt sind und die Früchte von Bengalen, Bombay, Ceylon und Java noch übertreffen. Die gesuchtesten Früchte sind die des Nongo, des Mongustan, des Durian, die Orangen und Ananas. Der Anbau des Zuckerrrohrs hat beißauß seit 40 Jahren unter den chinesischen Colonisten begonnen. Pfeffer, Cardamome, Tabak, Baumwolle, Gummigut, Adlerholz, Sandholz etc. etc. wird in grossen Mengen ausgebeutet.

— *Laurus nobilis* L. ist ein in Grossbritannien sehr gewöhnlicher Gartenbaum und zwar ist derselbe im Süden Englands in Cornwall und Irlands, in Tipperary naturalisiert, er pflanzt sich nämlich dasselbst durch Früchte freiwillig fort, weiter nach Norden ist er blos noch akklimatisirt, d. h. er trägt noch Früchte, pflanzt sich jedoch freiwillig nicht mehr fort, noch nördlicher blühet er zwar, trägt aber keine Früchte mehr. Endlich an den nördlichsten Punkten seines Vorkommens in Schottland blüht er nicht einmal mehr, gedeihet blos an den Meeresküsten und kommt im Innern des Landes gar nicht mehr fort. Dabei ist der 50% hohe Lorbeerbaum des Südens im Norden nur noch ein kümmerlicher Strauch von 3' Höhe.

— Correspondenz. — Herrn T — i, in T — i, und B — k, in F — n: „Bereits vergriffen.“ — Herrn N.: — „Von den in Nr. 46 aufgeführten Werken sind vergriffen die Nummern: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17.“

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [002](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mittheilungen. 416](#)