

Thuill., γ) *collina* Jacq., δ) *sepium*
Thuill.

Rosa rubiginosa L.

„ *tomentosa* Smith.

„ *pomifera* Herm. — Tesino gegen Tolvá.

„ *ciliato-petala* Bess. — von Rovereto nach Vallonga.

„ *arvensis* Huds.

„ *gallica* L. — unter Hafling gegen Marano, Fassa
(Dr. Facchini).

(Fortsetzung folgt.)

Diversión.

Im Jahre 1845 stellte Gasparini in „*Parlatore giornale botanico italiano*, An. 1. T. V. Part 8., p. 815, V“ eine *Visiania* auf, die er aus *Ficus elastica* Auct. bildete, da jedoch bereits 1844 Decandolle in „*Alph. Decandoll. prodr.* 8. p. 289“ eine Gattung *Visiania* aufgestellt hat, die aus *Olea Wallich* und *Phillyrea* gebildet ist, daher die Priorität für sich hat, so muss die erstere Gattung einen neuen Namen erhalten, wozu ich den Namen *Kolenatia* vorschlage, zu Ehren des k. k. Professors Herrn Kolenati zu Olmütz, der durch seine naturhistorischen Reisen nach dem Kaukasus und seine naturhistorischen Werke bereits rühmlich bekannt ist, und sich auch durch Gründung des in Prag erstandenen naturhistorischen Vereines „Lotos“, ein wesentliches Verdienst um Weckung des Sinnes für Naturstudien erworben hat; *Ficus elastica* Auct. müsste sonach künftig *Kolenatia elastica* Opiz genannt werden.

P. M. Opiz.

Prag, den 13. September 1853.

Die Honigpflanzen.

Von J. Schädle.

(Schluss.)

Nur gesellige Pflanzen sind geeignet, um damit Beobachtungen anzustellen, zerstreute Gewächse erlauben nur bei fortgesetzter Aufmerksamkeit einen etwas sicheren Schluss. — Die Kornblume *Centaurea Cyanus* ist honigreich, dafür die neben ihr wachsende *Agrostemma Githago* seiner gänzlich entbehrt. — Auffallend ist, dass im ersten Frühling die Biene fast jede Blume besucht, den *Crocus vernus*, die Leberblume *Anemone Hepatica*, den Ehrenpreis *Veronica triphyllos*, selbst die Vogelmiere *Stellaria media*, und auch nicht vergeblich. Später aber geht die Biene nicht mehr der letzten Blume nach, die doch das ganze Jahr blüht, selbst im heissen Sommer nicht, wo doch jede Blume mehr Honig erzeugt.

Papaver somniferum, *P. Rhoeas*, *Reseda odorata*, *Cucumis sativa*, *Cucurbita Pepo*, *Narcissus poeticus*, *Jasione montana* und andere werden von den Bienen besucht, doch ist dadurch noch nicht entschieden; ob sie von allen auch Honig holen, oder nur Wachs.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Opiz Philipp Maximilian

Artikel/Article: [Diversion. 309](#)