

Xanthosoma robustum aus Mexico, bietet nachstehende Merkmale: *Caudez* 5—6 *pollices crassus*. *Folia laete viridia, maxima*. *Spathae flavidae lamina ampla, tubo duplo fere longior*. *Spadix ad cuspidem spathae fere productus, subacutatus*. *Staminodia infima reliquis aequilonga*. *Stigmata mox nigricantia*.

Xanthosoma violaceum. Die Blattstiele, die unterseitige Aderung, so wie die Blüthenstengel violett, die ganze Unterfläche des Blattes bleich, in's Violette spielend. Der *Spathae tubus extus pallidus, violascens, intus pallide-flavescens, lamina ex albido-flavicante duplo fere brevior*. *Spadix ad cuspidem spathae fere productus, subacutatus*. *Staminodia violascentia, infima crassiora reliquis subaequilonga*.

(Schluss folgt.)

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

- Primula farinosa* L. — von Palù nach Regnana in Piné, Berg Tatóga.
- „ *longiflora* All. — ober Gertraud, Predazzo nach Fol, Berg Gavanello in Valsugana, Kuppen von Feltre.
- „ *officinalis* Jacq.
- „ *elatior* Jacq.
- „ *acaulis* Jacq.
- „ *Auricula* L. mit der Var. β) *ciliata* Moretti.
- „ *villosa* Jacq. — Conseria, Valzion, südlich und östlich von Lagorai, bei Coleman, Gipfel des Frate, Montalone.
- „ *spectabilis* Tratt. — Campogrosso, ober Ronchi gegen Vallarsa, Derocca, Tremals, Tombéa, Turano, Artilon, Portole.
- „ *glutinosa* Wulf. — Gipfel des Asta, Montalon, Lagorai, Laaseralpe.
- „ *Allionii* Lois. — Castellazzo, Cimonega, und bei Neve, ober Sagron, Thal Caldiera in Valsugana, Kuppen von Feltre.
- ° „ *Floerkeana* Schrad. — Gipfel des Frate.
- „ *minima* L. — Fassa.
- Cortusa Matthioli* L. — ober Sagron, Broccon in Tesino, bei Neve in Primiero, Kuppen von Feltre.
- Soldanella alpina* L.
- „ *pusilla* Baumg.
- „ *minima* Hoppe.

Cyclamen europaeum L.

Samolus Valerandi L. — Riva gegen Abola, Bolgiano.

Globularieae DC.

Globularia vulgaris L.

„ *nudicaulis* L. — Molvén, Spinale, Tombéa, Gipfel des Frate und südlich beinahe auf allen Bergen Tirols.

„ *cordifolia* L.

Plumbagineae Juss.

Statice alpina Hoppe. — Campogrosso, Conseria, gegen Colem.

Plantagineae Juss.

Plantago major L.

„ *media* L.

„ *lanceolata* L. mit den Var. β) *altissima* L., γ) *pumila*, δ) *lanuginosa*.

„ *Victorialis* Poir. — Trient auf dem Calisberg, Cengialto in Rovereto, Thal Sella.

„ *montana* Lam. — von Serrada nach Fulgaria, Broccon in Tesino.

„ *maritima* L. — Turano, Trient, Rovereto, Moena, Setteselle und Montalone in Valsugana.

„ *arenaria* W. et K. — Salurn, Leifers.

Amarantaceae Juss.

Amarantus sylvestris Desf.

„ *Blitum* L.

„ *retroflexus* L.

Phytolacceae R. Br.

Phytolacca decandra L. — nächst des Sees Caldaro (Dr. Facchini).

Chenopodeae Vent.

Polycnemum arvense L. — Fiemme nächst Cavalese (Dr. Facchini).

Chenopodium hybridum L. — Thal Venosta, Merano.

„ *arabicum* L.

„ *murale* L.

„ *album* L. mit der Var. β) *viride*.

„ *polyspermum* L. mit der Var. β) *acutifolium* Kit.

- Chenopodium Vulvaria* L.
 „ *Botrys* L. — Valfloriana gegen Avisio, Fa-
 stro.
Blitum virgatum L. — Udai, nächst des Sees Prags, Schlu-
 derns (Dr. Facchini).
 „ *Bonus Henricus* Mey.
 „ *rubrum* Rchb.
 „ *glaucum* Koch.
Atriplex hortensis L. — in Gärten von Fassa.
 „ *patula* L. — Fiemme unter Tesero gegen Cavalese.
 „ *latifolia* Wahlenb. — Silian, See Caldaro, Tren-
 to, Lienz.
 „ *hastata* L. — Trembelen, Condino, Agordo.

Polygoneae Juss.

- Rumex conglomeratus* Murr.
 „ *pulcher* L. — Riva, Trient, Valsugana, Bolgiano.
 „ *obtusifolius* L.
 „ *crispus* L. — Fassa, Bolgiano.
 „ *Patientia* L. — Costalonga.
 „ *Hydrolapathum* Huds. — Salurn, Trient, Bol-
 giano.
 „ *aquaticus* L. — Pustaria, Silian (Dr. Facchini).
 „ *alpinus* L. — Fassa, Primiero.
 „ *scutatus* L.
 „ *arifolius* All. — Judicarien, Fassa, Nuova-ita-
 liana.
 „ *Acetosa* L.
 „ *Acetosella* L.
Oxyria digyna Campd. — Lagorai, Settelaghi, Mon-
 talon.
Polygonum bistorta L. — Pera, Duron, S. Pellegrino, ober
 Tesino, Manasso.
 „ *viviparum* L.
 „ *amphibium* L. mit den Var. α) *natans* Mönch.,
 γ) *terrestre*.
 „ *lapathifolium* L. mit der Var. β) *incanum* Schm.
 „ *Persicaria* L.
 „ *mite* Schrank. — Merano, zwischen Pergine
 und Susá.
 „ *Hydropiper* L.
 „ *aviculare* L.
 „ *Convolvulus* L.
 „ *dumetorum* L.
 „ *Fagopyrum* L.
 „ *tataricum* L. — Peniola (Dr. Facchini).

Thymelaeae Juss.

Passerina annua Wickstr. — Trient, links von Fersina.

Daphne Mezereum L.

„ *Laurcola* L. — Tremosine, Ponale.

„ *alpina* L. — Marzola gegen Susá.

„ *striata* Tratt. — Campiglio, Setteselle und Montalone in Valsugana, Stalleralpe.

„ *rupestris* — *D. caule distorto ramosissimo, foliis laurinis glabris, perigonio hirsuto, lobis ovatis obtusis. Detexit Cl. Facchinus* im Thale Vestino.

„ *Cneorum* L. — Primiero, Thal Sella.

Santalaceae R. Br.

Thesium montanum Ehrh.

„ *intermedium* Schrad.

„ *alpinum* L. — Berg Tatóga, Spinale.

„ *rostratum* M. K. Primiero, Unter-Valsugana.

Eleagneae R. Br.

Hippophaë rhamnoides L. — Thal Sarca.

Aristolochiae Juss.

Aristolochia Clematitis L.

Asarum europaeum L. — Thal Vestino, ober Tenno, Tremosine, von Telve gegen Pontarso, Berg Vista, Tezze.

Empetreae Nutt.

Empetrum nigrum L. — Stelvio, Marmolata, Padon italiano.

Euphorbiaceae Juss.

Buxus sempervirens L. — Riva auf dem Berge Brione.

Euphorbia helioscopia L.

„ *platyphyllos* L.

„ *dulcis* L.

„ *carniolica* Jacq. — Unter-Valsugana, Turichio.

„ *verrucosa* Lam. — Berg Baldo.

„ *palustris* L. — von Riva gegen Torbole.

„ *Gerardiana* Jacq. — Bolgiauo (Hausmann).

„ *amygdaloides* L. — Thal Ronchi auf Höhen, Vesi im Thale Ledro. Molvén nördlich.

„ *Cyparissias* L.

„ *Ésula* L. — nächst Borghetto, Trientan der Etsch.

„ *nicacensis* All. — Thal Vestino, Riva.

„ *Peplus* L.

- Euphorbia falcata* L. — bei Laste in Trient, Rovereto in Vallonga.
 „ *Lathyrus* L. — zwischen Bolgiano und Terlan (Dr. Facchini).
Mercurialis perennis L. — Thal Ronchi auf grösseren Höhen, Lanciada, Tiers, Berg Lefre.
 „ *ovata* Sternb. Hoppe. — Egna, zwischen Lizzana und Marco, Riva, Berg Brione.
 „ *annua* L.

Urticeae Juss.

- Urtica urens* L.
 „ *dioica* L.
Parietaria erecta M. K.
 „ *diffusa* M. K.
Humulus Lupulus L.
Ficus Carica L. — in Felsenspalten des Sarca thales und nächst des Garda-Sees.
Celtis australis L. — Bolgiano, an mehreren Orten Südtirols gebaut.
Ulmus campestris L. — Nuova-italiana, Rovereto.

Cupuliferae Rich.

- Fagus sylvatica* L. mit der Var. β) *sanguinea*.
Castanea vulgaris Lam.
Quercus sessiliflora Smith.
 „ *pedunculata* Ehrh.
 „ *pubescens* W. — von Bus-de-Vila gegen Vezzano
 „ *Ilex* L. — bei Sarche und Massenza.
Corylus Avellana L.
Carpinus Betulus L. — Valsugana.
Ostrya carpinifolia Scop. (Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.

— Kremsier in Mähren, im November. — Mein Vater, Apotheker in Weisskirchen, beobachtete dieses Jahr zum ersten Male eine interessante Erscheinung an *Phalaris canariensis*, nämlich das Vorkommen von *Secale cornutum* an den Aehren dieses Grases, welches er schon seit vielen Jahren anbauet, allein noch nie eine ähnliche Monstrosität an demselben wahrgenommen hat. A. Vogl.

— Gratz im November. Mit der *Flora styriaca* bin ich nun fertig. — Herr Dr. Prasil, Brunnenarzt in Gleichenberg, der die dortige Flora fleissig durchforscht, brachte mir kürzlich seine diessjährige Ausbeute zur Durchsicht und wieder fand sich eine für Steiermark neue Pflanze vor, nämlich *Fumaria capreolata* L., die sich durch die grosse Blumenkrone auszeichnet. Auch *Silene linicola* Gmel. und *Pulmonaria azurea* Bess. sammelte Dr. Prasil in jener