©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

III. Jahrgang	. . .		4 fl. C. M.
I. und II. „	. . .	à	2 „ „ „
I. bis III. „	zusammen um		6 „ „ „

Die Redaction.

Pflanzenskizzen.

Entworfen von H. Schott.

(Schluss.)

Philodendron eximium. Folia longe-grosseque petiolata, lamina rotundato-cordiformi undata, venis crebris subapproximatis, sulcis paginae immesis, lobis posticis rotundatis, costa basi latiuscula. Inflorescentiae plures ex una eademque axilla. Spathae lamina lanceolata, alba, tubo sesquilongior. Ovaria subnovemlocularia.

Philodendron sagittaefolium aus Mexico. *Folia longe et grosse petiolata; petiolo basi ex rubro punctato, reliqua parte viride variegato, lamina sagittata l. sagittato-oblonga, laevigata, venis distantibus, fere angulo recto exsertis, lobis posticis rotundatis brevibus subcontractis. Inflorescentia unica ex axilla, pedunculo longitudine spathae. Vaginae interfoliares rubro-punctatae. Spathae lamina alba.*

Philodendron radiatum gleichfalls aus Mexico. *Folia longe- et grosse-petiolata. Lamina ambitu ex oblongo-ovato cordiformis, profunde laciniata, laciniis elongato-lanceolatis, sensim angustatis, obtusiusculis. A Ph. lacero abunde diversum!*

Philodendron ornatum. Folia longe- et tenuiter petiolata, lamina ovato-cordiformis, undata, venis crebis subapproximatis, sulcis paginae immersis, lobis posticis rotundatis, costa angusta. Inflorescentia solitaria. Brasilien.

Philodendron Priecerianum. Folia breviter ac tenuiter petiolata, bifariam exserta, arcteque trunco l. ramo suffulcienti appressa. Lamina rotundato-ovata, cuspidulata, reversa, basi cordata, lobis brevibus contiguis.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Salicineae Richard.

Salix pentandra L. — Gardena östlich von Santa Cristina.
„ *alba* L. mit der Var. γ) *vitellina* L.
„ *amygdalina* L. mit der Var. β) *concolor (S. triandra* L.) — Fiemme (Dr. Facchini).
„ *daphnoides* Vill. — Paneveggio, Ritten, unter Kematen (Dr. Facchini).

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Salix Pontederana W. — Fassa.
„ *purpurea* L.
„ *salviaefolia* Link. — Thal Vestino.
„ *incana* Schrank.
„ *cinerea* L.
„ *nigrescens* Fries.
„ *grandifolia* Seringe.
„ *Caprea* L.
„ *glabra* Scop.
„ *hastata* L.
„ *repens* L. — Bondon, zwischen Ampezzo und Innichen.
„ *arbuscula* L. mit den Var. α) *Waldsteiniana* W., β) *foetida*, γ) *prunifolia* Smith.
„ *Lapponum* L. — Kals, Pusteria nördlich, Thal Sole (Dr. Facchini).
„ *caesia* Vill. — Fassa, Livinallongo.
„ *myrsinites* L. — Alpen des Nonthales, Fassa (Dr. Facchini).
„ *reticulata* L.
„ *retusa* L. mit den Var. β) *major* (*S. Kitaibeliana* W.), γ) *minor* (*S. serpyllifolia* Scop.)
„ *herbacea* L.
Populus alba L.
„ *canescens* Smith. — Comano, Vigo bei Fassa.
„ *tremula* L.
„ *nigra* L.

Betulineae Rich.

Betula alba L.
„ *pubescens* Ehrh. — Fassa, Penia.
Alnus viridis DC.
„ *incana* DC.
„ *glutinosa* Gärtn.

Coniferae Juss.

Ephedra distachya L. — Gebirgsrücken von Trient.
Taxus baccata L. — Ronchi in Ala, Valsugana.
Juniperus nana W. — Bondon, Spinale, Thal Breguzzo, Berg Telve, Torcegno und Roncegno.
„ *communis* L.
„ *Sabina* L. — Penía, Gries.
Pinus sylvestris L.
„ *Mughus* Scop.
„ *Cembra* L. — Fiemme, Fassa.
„ *Picea* L.
„ *Abies* L.
„ *Larix* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: 003

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: Flora von Südtirol. 378-379