

III. Jahrgang	.	.	.	4 fl. C. M.
I. und II.	"	.	.	2 " " "
I. bis III.	"	zusammen um		6 " " "

Die Redaction.

Pflanzenskizzen.

Entworfen von H. Schott.

(Schluss.)

Philodendron eximium. Folia longe-grossequ petiolata, lamina rotundato-cordiformi undata, venis crebris subapproximatis, sulcis paginae immesis, lobis posticis rotundatis, costa basi latiuscula. Inflorescentiae plures ex una eademque axilla. Spathae lamina lanceolata, alba, tubo sesquilingior. Ovaria subnovemlocularia.

Philodendron sagittae-folium aus Mexico. Folia longe et grosse petiolata; petiolo basi ex rubro punctato, reliqua parte viride variegato, lamina sagittata l. sagittato-oblonga, laevigata, venis distantibus, fere angulo recto exsertis, lobis posticis rotundatis brevibus subcontractis. Inflorescentia unica ex axilla, pedunculo longitudine spathae. Vaginae intersolares rubro-punctatae. Spathae lamina alba.

Philodendron radiatum gleichfalls aus Mexico. Folia longe- et grosse-petiolata. Lamina ambitu ex oblongo-ovato cordiformis, profunde laciniata, laciniis elongato-lanceolatis, sensim angustatis, obtusiusculis. A *Ph. lacero* abunde diversum!

Philodendron ornatum. Folia longe- et tenuiter petiolata, lamina ovato-cordiformis, undata, venis crebris subapproximatis, sulcis paginae immersis, lobis posticis rotundatis, costa angusta. Inflorescentia solitaria. Brasilien.

Philodendron Prieceirianum. Folia breviter ac tenuiter petiolata; bifariam exserta, arctequo trunco l. ramo suffulcanti appressa. Lamina rotundato-ovata, cuspidulata, reversa, basi cordata, lobis brevibus contiguis.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Salicineae Richard.

- Salix pentandra* L. — Gardena östlich von Santa Cristina.
 „ *alba* L. mit der Var. γ) *vitellina* L.
 „ *amygdalina* L. mit der Var. β) *concolor* (*S. triandra* L.) — Fiemme (Dr. Facchini).
 „ *daphnoides* Vill. — Paneveggio, Ritten, unter Kematen (Dr. Facchini).

Salix Pontederana W. — Fassa.

- „ *purpurea* L.
- „ *salviaefolia* Link. — Thal Vestino.
- „ *incana* Schrank.
- „ *cinerea* L.
- „ *nigrescens* Fries.
- „ *grandifolia* Seringe.
- „ *Caprea* L.
- „ *glabra* Scop.
- „ *hastata* L.
- „ *repens* L. — Bondon, zwischen Ampezzo und Innichen.
- „ *arbuscula* L. mit den Var. α) *Waldsteiniana* W., β) *foetida*, γ) *prunifolia* Smith.
- „ *Lapponum* L. — Kals, Pusteria nördlich, Thal Sole (Dr. Facchini).
- „ *caesia* Vill. — Fassa, Livinallongo.
- „ *mysinites* L. — Alpen des Nonthales, Fassa (Dr. Facchini).
- „ *reticulata* L.
- „ *retusa* L. mit den Var. β) *major* (*S. Kituibeliana* W.), γ) *minor* (*S. serpyllifolia* Scop.)
- „ *herbacea* L.

Populus alba L.

- „ *canescens* Smith. — Comano, Vigo bei Fassa.
- „ *tremula* L.
- „ *nigra* L.

Betulineae Rich.

Betula alba L.

- „ *pubescens* Ehrh. — Fassa, Penia.

Alnus viridis DC.

- „ *incana* DC.
- „ *glutinosa* Gärtn.

Coniferae Juss.

Ephedra distachya L. — Gebirgsrücken von Trient.

Taxus baccata L. — Ronchi in Ala, Valsugana.

Juniperus nana W. — Bondon, Spinale, Thal Breguzzo, Berg Telve, Torcegno und Roncegno.

- „ *communis* L.

- „ *Sabina* L. — Penia, Gries.

Pinus sylvestris L.

- „ *Mughus* Scop.
- „ *Cembra* L. — Fiemme, Fassa.
- „ *Picea* L.
- „ *Abies* L.
- „ *Larix* L.