

III. Jahrgang	.	.	.	4 fl. C. M.
I. und II.	"	"	"	à 2 "
I. bis III.	"		zusammen um	6 "

Die Redaction.

Pflanzenskizzen.

Entworfen von H. Schott.

(Schluss.)

Philodendron eximium. *Folia longe-grosseque petiolata, lamina rotundato-cordiformi undata, venis crebris subapproximatis, sulcis paginae immesia, lobis posticis rotundatis, costa basi latiuscula. Inflorescentiae plures ex una eademque axilla. Spathae lamina lanceolata, alba, tubo sesquialtier. Ovaria subnovenlocularia.*

Philodendron sagittae folium aus Mexico. *Folia longe et grosse petiolata; petiolo basi ex rubro punctato, reliqua parte viride variegato, lamina sagittata l. sagittato-oblonga, laevigata, venis distantibus, fere angulo recto exsertis, lobis posticis rotundatis brevibus subcontractis. Inflorescentia unica ex axilla, pedunculo longitudine spathae. Vaginae interfoliares rubro-punctatae. Spathae lamina alba.*

Philodendron radiatum gleichfalls aus Mexico. *Folia longe- et grosse-petiolata. Lamina ambitu ex oblongo-ovato cordiformis, profunde laciniata, laciniis elongato-lanceolatis, sensim angustatis, obtusiusculis. A Ph. lacero abunde diversum!*

Philodendron ornatum. *Folia longe- et tenuiter petiolata, lamina ovato-cordiformis, undata, venis crebis subapproximatis, sulcis paginae immersis, lobis posticis rotundatis, costa angusta. Inflorescentia solitaria.* Brasilien.

Philodendron Piceerianum. *Folia breviter ac tenuiter petiolata; bifariam exserta, arcteque trunko l. ramo suffulcenti appressa. Lamina rotundato-ovata, cuspidata, reversa, basi cordata, lobis brevibus contiguis.*

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

Salicineae Richard.

- Salix pentandra* L. — Gardena östlich von Santa Cristina.
" *alba* L. mit der Var. γ) *vitellina* L.
" *amygdalina* L. mit der Var. β) *concolor* (*S. triandra* L.) — Fiemme (Dr. Facchini).
" *daphnoides* Vill. — Paneveggio, Ritten, unter Kematen (Dr. Facchini).

Salix Pontederana W. — Fassa.

- „ *purpurea* L.
„ *salviaefolia* Link. — Thal Vestino.
„ *incana* Schrank.
„ *cineraria* L.
„ *nigrescens* Fries.
„ *grandifolia* Seringe.
Caprea L.
„ *glabra* Scop.
„ *hastata* L.
„ *repens* L. — Bondon, zwischen Ampezzo und Innichen.
„ *arbuscula* L. mit den Var. α) *Waldsteiniana* W., β) *fœtidia*, γ) *prunifolia* Smith.
„ *Lapporum* L. — Kals, Pusteria nördlich, Thal Sole (Dr. Facchini).
„ *caesia* Vill. — Fassa, Livinallongo.
„ *myrsinifolius* L. — Alpen des Nonthales, Fassa (Dr. Facchini).
„ *reticulata* L.
„ *retusa* L. mit den Var. β) *majore* (*S. Kitaibeliana* W.), γ) *minor* (*S. serpyllifolia* Scop.)
„ *herbacea* L.
Populus alba L.
„ *canescens* Smith. — Comano, Vigo bei Fassa.
„ *tremula* L.
„ *nigra* L.

Betulinaeae Rich.

Betula alba L.

- „ *pubescens* Ehrh. — Fassa, Penia.
Alnus viridis DC.
„ *incana* DC.
„ *glutinosa* Gärtn.

Coniferae Juss.

Ephedra distachya L. — Gebirgsrücken von Trient.

Taxus baccata L. — Ronchi in Ala, Valsugana.

Juniperus nana W. — Bondon, Spinale, Thal Breguzzo, Berg Telve, Torcegno und Ronceno.

- „ *communis* L.
„ *Sabina* L. — Penia, Gries.

Pinus sylvestris L.

- „ *Mughus* Scop.
„ *Cembra* L. — Fiemme, Fassa.
„ *Picea* L.
„ *Abies* L.
„ *Larix* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: [Flora von Südtirol. 378-379](#)