

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 15. Dec. 1853. III. Jahrg. № 50.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl. die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Insetate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Flora von Südtirol. Von Fr. Ambrosi. — *Carex ornithopodioides*. Von Hausmann. — Personalnotizen. — XXX. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. — Literatur. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen.

Flora von Südtirol.

Von Fr. Ambrosi.

(Fortsetzung.)

- Carex dioica* L. — Seiseralpe, Duron, Bellamonte, Thal Sella.
- „ *Davalliana* Smith. — Ospitaletto in Valsugana, Fassa.
- „ *capitata* L. — Seiseralpe (Dr. Facchini).
- „ *rupestris* All. — Monzoni, Padon, Kals, Contrin, Palberg.
- „ *pauciflora* Lightf. — Bellamonte, Paneveggio.
- „ *microglochin* Wahlenb. — Seiseralpe, Giurebel, Kasern.
- „ *baldensis* L. — Lanciada, Turano, Benaco an Ufern, Berg Sconupia, Berg Baldo.
- „ *curvata* All. — Conseria, gegen die Spitze von Asta.
- „ *incurva* Lightf. — Schlern (Dr. Facchini).
- „ *foetida* All. — Thal Sole (Dr. Facchini).
- „ *stenophylla* Wahlenb. — Laas (Dr. Facchini).
- „ *vulpina* L.
- „ *muricata* L.
- „ *divulsa* Good. — Isera (Dr. Facchini).
- „ *teretiusecula* Good.
- „ *paniculata* L.
- „ *Schreberi* Schrank. — Umgebung Trients.
- „ *leporina* L.
- „ *stellulata* Good.

Carex remota L.

- „ *elongata* L. — Wald nächst Ziano (Dr. Facchini).
 „ *lagopina* Wahlenb.
 „ *canescens* L. — Ritten, Fassa (Dr. Facchini).
 „ *mucronata* All.
 „ *stricta* Good.
 „ *caespitosa* Auct.
 „ *acuta* L. — Badia, Trient bei Vila.
 „ *bicolor* All. — Schlern (Pacher).
 „ *Buxbaumii* Wahlenb. — Ritten (Hausmann).
 „ *VahlIIi* Schk. (*alpina* Wahlenb.) — Bilsberg bei Gerdraut (Dr. Facchini).
 „ *nigra* All. — Lanciada, Monzoni, Gardena, Kuppen von Feltre.
 „ *aterrima* Hoppe.
 „ *atrata* L. — Bondon, Berg Pozza, italienisch Pad'ona.
 „ *irrigna* Smith. — Prettau nördlich (Dr. Facchini).
 „ *limosa* L. — Seiseralpe, Fassa, Paneveggio.
 „ *pilulifera* L. — von Villa nach Tione, von Samon nach Biunno, von Telve nach Pontarso.
 „ *tomentosa* L.
 „ *montana* L.
 „ *ericetorum* Pollich.
 „ *praecoX* Jacq.
 „ *longifolia* Host. — von Bolgiano nach S. Jacob, Paneveggio (Dr. Facchini).
 „ *humilis* Leyss.
 „ *gynobasis* Vill. — Trento bei Laste.
 „ *digitata* L.
 „ *ornithopoda* W.
 „ *reclinata*. — *C. spiculis paucis congestis atris, feminea suprema masculam superante, utriculis glabris.*
 Aufgefunden von Cl. Facchini auf der Vaelalpe in Ampezzo, und im Thale von Fassa.
 „ *alba* Scop.
 „ *nitida* Host. — Fiemme, Bolgiano.
 „ *panicea* L.
 „ *glauca* Scop.
 „ *maxima* Scop. — auf dem Berge Gries in schattigen Wäldern (Dr. Facchini).
 „ *pallens* L.
 „ *capillaris* L. — Fassa, Berg Sconuppia, Kuppen von Feltre.
 „ *fuliginosa* Schk. — Kals, Isnitz (Dr. Facchini).
 „ *frigida* All. — bei Viiose, unter Tolvá, Sverta, Alpe Antholz.
 „ *sempervirens* Vill. — Campogrosso, Lorina.
 „ *firma* Host.

Carex ferruginea Scop.

„ *tenuis* Host. — von Broccon nach Ronco in Canal
S. Bovo, Camposilvano, Udai.

„ *Michelii* Host. — Fassa, Valsugana.

„ *flava* L.

„ *Oederi* Ehrh.

„ *fulva* Good.

„ *Hornschuchiana* Hoppe. — Schloss Lodron, Bolgiano
Bellamonte in Fiemme.

„ *distans* L.

„ *sylvatica* Huds. — Thal Breguzzo, Berg Oiverone
bei Borgo, Tione.

„ *Pseudo-cyperus* L. — Bolgiano (Dr. Facchini).

„ *ampullacea* Good.

„ *vesicaria* L. — Egna, Piné, Bolgiano.

„ *paludosa* Good.

„ *riparia* Curt. — See Caldaro, Bolgiano (Dr. Facchini).

„ *filiformis* L. — Thal Ledro, Bondone in Trient.

„ *hirta* L. — Thal Ledro, Ora, Fiemme, Fassa, Valsugana.

Gramineae Juss.*Andropogon Ischaemum* L.

„ *Gryllus* L. — nördlich von Nogaredo, Gargnano
auf Wiesen von Borgo nach Telve,
Wiesen bei Aguedo und gegen Pontarso.

Heteropogon Allionii R. et Schultz. — nördlich von Limone,
Bolgiano.

Sorghum halepense Pers. — ober Villa, bei Sega in Rovereto,
Arco.

Tragus racemosus Desf. — Valsugana nächst Borgo.

Panicum sanguinale L.

„ *ciliare* Retz.

„ *glabrum* Gaud.

„ *Crus-galli* L.

„ *undulatifolium* Ard. — Unter-Valsugana.

Setaria verticillata Beauv.

„ *viridis* Beauv.

„ *glauca* Beauv.

Phalaris arundinacea L.

Hierochloa borealis R. et S. — Fassa (Dr. Facchini).

„ *australis* R. Schultz. — von Tesino nach Broccon
ober der Getreideregion, Berg
Ciolino und Rocchetta
nächst Borgo.

Anthoxanthum odoratum L.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [003](#)

Autor(en)/Author(s): Ambrosi Francesco

Artikel/Article: [Flora von Südtirol. 393-395](#)