

breitete er sich über ein sehr sinnreiches und zugleich einfaches Verfahren, nach welchem es allein möglich wird, äusserst dünne Durchschnittsplättchen von kleinen und harten *Caryopsen* durch Einschmelzung derselben in Sterain zu mikroskopischen Untersuchungen zu erlangen. Schliesslich gab der Herr vorsitzende Vice-Präsidentes Ritter v. Heufler eine umfassende Kritik über die erschienene „Flora Tirols“ von Baron Hausmann, worin er sich unter Darlegung mehrerer Combinationen sehr günstig über dieses Werk aussprach.

Literatur.

— Curtis's Botanical-Magazine enthält beschrieben und abgebildet, Jänner 1854: T. 4758 *Ceropegia Thwaitesii* Hook., *Asclepiadeae* aus Ceylon, eingeführt von Thwaites. — T. 4759. *Epidendrum Stamfordianum* Batem. Von Skinner in Guatemala und von Purdie in Santa Martha entdeckt. — T. 4760. *Dichorisanthra picta* Hort. *Commelyneae* aus Brasilien. — T. 4761. *Angraecum eburneum* Thonars. Von Forbes vor vielen Jahren eingeführt und in Madagascar und Bourbon einheimisch. — T. 4762. *Allosorus flexuosus* Kaulf. In Mexico und Peru einheimisch. — Februar. — T. 4763. *Cissus discolor* Blume. — T. 4764. *Aromum Danielli* Hook. f. *Scitamineae* im tropischen West-Africa einheimisch und von Dr. Daniell eingeführt. — T. 4765. *Cheilanthes farinosa* Kaulf. Farrn von Galeotti in Oaxaca in Mexico gefunden. — T. 4766. *Warrea quadrata* Lindl. *Orchideae* aus Central-Amerika von Warszewicz eingeführt. — T. 4767. *Goldfussia glomerata* Noes. Var. *speciosa*. Die *G. glomerata* ist in Silhet einheimisch. Die Varietät wurde aus dem botanischen Garten von Mauritius eingeführt. — T. 4768. *Scolopendrium Krebsii* Kunze. Von Krebs und Gueinzus im südwestlichen Afrika gesammelt. — März. — T. 4769. *Allosorus calomelanos* Presl. Am Vorgebirge der guten Hoffnung (500 — 4000') einheimisch. — T. 4770. *Pitcairnia muscosa* Mart. In Brasilien in der Serra de Pirdada, in der Provinz Minas Geraes einheimisch. — T. 4771. *Exacum macranthum* Arnott. *Gentianeae* von Frau Walker in den Gebirgen von Ceylon, in einer Höhe von 6000' gefunden. — T. 4772. *Saccolabium denticulatum* Paxt. Soll in Khasya im östlichen Bengalen einheimisch sein. — T. 4773. *Astrocaryum rostratum* Hook. Palme, aus Brasilien eingeführt.

Mittheilungen.

— Vegetationsverhältnisse von Wien. — 30. April. (Tpr. + 7°. 7. : + 3°. 2.) Die Blütenknospen erscheinen an *Philadelphus coronarius*. Die ersten Blüten entfaltet an *Aesculus Hippocastanum*. Allgemeines Blühen von *Pyrus communis*. Abgeblüht *Prunus avium*. — 1. Mai. (Tempr. + 15°. 9. : + 3° 7.) Die ersten Blüten an *Lonicera Xylosteum*. — 2. Mai. (Tempr. + 17°. 0. : + 5° 9.) Die Blattfläche wird sichtbar bei *Fraxinus excelsior*. Die ersten Blüten erscheinen an *Lonicera tatarica*, *Quercus pedunculata*. — 3. Mai. (Tempr. + 19°. 6. : + 5°. 1.) Die ersten Blüten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Literatur 175](#)