

John Fish Allan ist ein Prachtwerk in Elephantfolio und mit 6 Tafeln über *Victoria regia* erschienen.

— J. B. Zobel hat mit Benützung des literarischen Nachlasses von Corda den sechsten und letzten Band von A. C. J. Corda's Abbildungen von Schwämmen, mit zwei lithographirten Tafeln, in Prag herausgegeben.

— Ein neues botanisches Journal nach dem grössten Massstabe soll mit Anfang des künftigen Jahres unter der Redaction des Dr. Pringsheim in Berlin erscheinen. Die Richtung desselben würde eine entschieden und streng wissenschaftliche sein.

Mittheilungen.

— Vegetationsverhältnisse von Wien. — 24. März 1855. (Tp. + 14° 6: + 6° 2.) Die Laubblattknospen schwellen an *Fagus sylvatica pendula*, *Juglans regia*, *Mespilus germanica*, *Populus nigra*. Allgemeines Blühen von *Alnus glutinosa*. — 25. März. (Tp. + 14° 1: + 6° 9). Die Blattknospen schwellen an *Quercus Cerris*. Die ersten Blätter an *Lonicera Caprifolium*. — 27. März. (Tp. + 14° 4: + 3° 6). Die Blattknospen schwellen an *Morus alba*, *M. nigra*, *Quercus pedunculata*, *Robina Pseudoacacia*, *Salisburia adiantifolia*. Die obere Laubblattfläche wird sichtbar bei *Prunus cerasifera*, *Viburnum Lantana*, *V. Opulus*. Die ersten Blätter entfaltet bei *Daphne Mezereum*, *Lonicera Peryclitenum*, *L. tatarica*. Allgemeine Belaubung von *Ribes grossularia*. Die ersten Blüthen an *Ficaria ranunculoides*, *Viola odorata*. Allgemeines Blühen von *Daphne Mezereum*. — 28 März. (Tp. + 10° 2: + 3° 5). Die Blattknospen schwellen an *Ailanthus glandulosa*, *Mespilus germanica*. Die obere Blattfläche wird sichtbar an *Cornus alba*. — 30. März. (Tp. + 3° 5: + 0° 6). Die Blattknospen schwellen an *Fraxinus Ornus*. Die Belaubung beginnt an *Evonymus europaeus*, *Salix daphnoides*, *Syringa vulgaris*. — 1. April. (Tp. + 6° 6: + 0° 6). -- Die Blattknospen schwellen an *Ulmus campestris*. Die obere Blattfläche wird sichtbar an *Philadelphus coronarius*. Die ersten Blüthen entwickelt bei *Primula Auricula*, *Ulmus campestris*, *U. effusa*. — 4. April. (Tp. + 5° 9: + 2° 9). Die obere Blattfläche wird sichtbar an *Ligustrum vulgare*, *Ribes rubrum*, *Rosa canina*. Die ersten Blätter entfaltet an *Sambucus nigra*.

— Als Andersson auf der schönen Sandwichsinsel Oahu durch das reizende Nuanuthal aufwärts wanderte, sah er nicht nur die Spitzen der steilen Felsenberge zu beiden Seiten buchstäblich in den dichtesten Schleier grüner Wälder mit wehenden Wipfeln und flimmernden Blüthen eingehüllt, sondern auch den Boden bedeckte ein eigenthümlicher, mehrere Ellen hoher Wald. *Lobelia* und *Dracaena terminalis* bildeten hier ein so dichtes Netz von verschlungenen Zweigen und Schösslingen, dass man, wie der Reisende sagt, am bequemsten durch den Wald kommt, wenn man über die Aeste der Bäume klettert, denn den Fuss auf den Boden zu setzen, daran ist nicht im Entferntesten zu denken.

— Prof. Th. Orphanides in Athen hat einen von A. Rallis in Triest für die beste Dichtung ausgesetzten Preis von tausend Franken gewonnen und diesen zur Bildung zweier Sammlungen von griechischen Pflanzen bestimmt, von denen die eine dem Museum in Athen, die andere demjenigen Museum Europa's zukommen solle, welches Herr Rallis dazu auserwählen werde.

— Correspondenz. — Herrn R — h in P — g: „Wird mit Dank benützt.“

Redacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz.

Verlag von L. W. Seidel. Druck von C. Ueberreuter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [005](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mittheilungen. 128](#)