wir jedoch Gelegenheit, letztere Pflanze noch öfter, und zwar vorzüglich auf verlassenen Holzverkohlungsstätten zu finden; weiterhin bedeckten die Seitenwände des Grabens *Polytrichum piliferum* Schreb., welches auch in Wäldern nicht selten ist, *Polytrichum urnigerum* L. Auch *Prunella vulgaris* L., *Cirsium lanceolatum* Scopoli, und *Rhinanthus minor* Ehrh., waren uns willkommen. Die Sonne, die nun bereits ziemlich hoch stand, zwang uns endlich irgend wo im Schatten auszuruhen, und bald fanden wir seitwärts von der Strasse ein von Laubholz bewachsenes Thälchen, und hier beschlossen wir eine kurze Siesta zu halten. Hier vegetirten *Corylus Avellana* L., *Solidago virgaurea* L., *Cerastium triviale* Link., *Pimpinella Saxifraga* L., *Hieracium Pilosella* L., *Crepis tectorum* L. und *Potentilla* L. An einem Strauche von *Rhamnus frangula* L. hatte ich Gelegenheit zu gleicher Zeit Knospen, Blüthen und Früchte zu beobachten. (Schluss folgt.)

## Nachträge

zum *Prodromus* einer Flora von Salzburg etc. (Salzburg 1851.)

Von Rudolph Hinterhuber.

(Schluss.)

*Primula longiflora* im Silberthal. Dr. Glanz.
„ *pubescens* Tannengebirge (Flora 1855, Nr. 6.) Hat den von Dr. Sauter am angegebenen Orte getadelten Mangel an Kritik*) sehr für sich. Oder darf man von Jemand mehr fordern, als man selbst leistet? Dass sie in diesen Gebirgen vorkommen soll, ist indess schon in *Prodromus* pag. 179, Z. 8 von oben etc. bemerkt.
*Rumex arifolius* All., in Menge auf der Maffei-Alpe. Eckerfürst, Toerner-Joch. 1855. Pichlmayer, Dr Glanz.
„ *obtusifolius* auf Wiesen des Nassfeldes.
„ *pratensis* Koch. Pinzgau. Dr. Sauter.
„ *nivalis*. Nassfelder-Tauern. (Mielichhofer's Angabe Flora 1855. Nr. 6).
*Thesium pratense* auf Wiesen an der Glan 1855. Dr. Glanz.
*Euphorbia stricta* auf Maria-Hilf bei Mondsee. Dr. Glanz.
*Potamogeton filiforme* in einem Sumpfe bei Abtenau, ebenso bei Kauris. 1854. Dr. Sauter.
„ *pectinatus* im Mondsee. 1854. Dr. Glanz.
„ *densus* häufig im Nonnthal.
„ *rufescens* Griessner-See bei Saalfelden. 1854. Dr. Glanz.
*Naias major* angeblich durch die Flora 1855, Nr. 6, ohne Standort.

*) Gleich der bisher vergeblich gesuchten *P. truncata* nach Irasek.

*Chamaeorchis alpina* 1854 gefunden auf den Schafangern unter dem „Brette". Von Pichlmayer.

*Platanthera chloranta* häufig auf der Maffei-Alpe, ober Kucheln. 1855. Dr. Glanz.

*Spiranthes autumnalis* Rchb., bei Neumarkt am Damme.

*Lloydia serotina* Salisb., blüht gleich nach dem Wegschmelzen des Schnee's in Menge zu höchst des Eckerfürst gegen die Ofner-Seite hin; 1. Juli 1855. Pichlmayer.

*Allium oleraceum* L., (ob Varietät?) auf dem Mönichsberge; Dr. Glanz. im Stein (Vorstadt) Pichlmayer.

*Juncus glaucus* L., gemein in Gräben und feuchten Orten.

*Luzula glabrata.* Eckerfürst.

*Schoenus nigricans* bei Salzburg. Dr. Storch. (?)

*Scirpus radicans* an der Salzach, rechtes Ufer bei Aigen. Dr. Sauter.

*Fimbristilis annua* W., Sanct-Gilgner-See. Dr. Sauter.

*Eriophorum gracile* Koch., an derselben Moorstelle, wo die *Lysimachia thyrsiflora* (bei Kessham) vorkömmt. Pichlmayer.

*Carex Buxbaumii* Whlbg., am Ausflusse des Seekirchner-See's. Dr. Sauter, auf den Moorwiesen Glanegg's 1855. Dr. Glanz.

„ *capillaris* L., sehr häufig im Thale der Bluntau, dann auf der Torenerjoch-Brettstiege und durch den Mairbach. Pichlmayer. Dr. Glanz.

„ *ericetorum* an den Teichrändern zu Hellbrun. 1855. Dr. Glanz.

„ *heleonastes* Ehrh., im Moor zu Seeham. Dr. Sauter.

„ *Hornschuhiana* Hoppe., auf den Moorwiesen von Glanegg 1855. Dr. Glanz.

„ *humilis* Leyss., häufig auf dem Rockstein. 1855. Pichlmayer.

„ *maxima* Scop., am Seehamer Moore. 1855. Dr. Sauter

„ *pallescens* L., auf den Maffei-Alpen sehr zahlreich. 1855 Dr. Glanz

„ *polyrrhiza* Wallr. an der Alm, gleich etwas vorwärts von der Sägemühle; Pichlmayer. Bei Plainfeld; Dr. Glanz.

„ *Pseudo-Cyperus* L., an der Glan. Dr. Storch.

„ *rupestris* auf dem hl. Bluter-Tauern. (Flora 1855, Nr. 6).

„ *semperrirens* besonders auf dem Göll.

„ *tomentosa* L., Moorwiesen von Glanegg. 1855. Dr. Glanz.

*Psilathera tenella* Loc., auf Alpen zwischen Göriach und Lignitz.

*Avena Hostii.* Um den Schmidtenstein. Dr. Sauter.

*Koeleria hirsuta* Gd., auf der Platte; Krimmel. Mielichhofer.

*Festuca Halleri*, Eckerfürst; Dr. Glanz.

„ *pumila* Vill., Eckerfürst; Dr. Glanz.

Mondsee, im August 1855.

## Aus H. Schott's: „*Analecta botanica*".

(Fortsetzung.)

*Campanula consanguinea* Nob. *Foliis caulinis inferiobus lanceolatis antice latioribus, remote-serratis (ciliatisque), caeteris lineari-lanceolatis integerrimis, cor. laciniis recurvo-patulis apiculatis (nervo medio valide excurrente), nervis lateralibus obsoletis.*

*Pedalis, laxe-racemosa Folia radicalia ovata I cordato-ovata, remote-serrata. Cal. laciniae tubum cor. dimidium superantes, erecto- l. horizontaliter-patentes l. superne reflexae. Cor. saturate coeruleae laciniae ovatae.*

Hab. *in alpibus Salisburgensibus? Lecta a Celsiss. Archiduce Ludovico.*

*Campanula exul* Nob. *Foliis caulinis inferioribus lanceolatis antice angustioribus, crebre l. ex toto ciliatis, caeteris lineari-lanceolatis, omnibus integerrimis, cor. laciniis patulis, brevissime apiculatis, nervis lateralibus anastomosanter connexis non prominulis.*

*Digitalis et ultra (specc. descr. uniflora) Folia radicalia (parva), rotundato-cordata l. reniforma, lobulato-crenata. Cal. laciniae tubo cor. triplo breviores horizontales. Cor saturate coeruleae laciniae ovatae.*

Habit....? (*Imperii austriaci incola!*)

*Campanula styriaca* Nob. *Foliis caulinis inferioribus lanceolatis remote-serratis, superioribus linearibus integerrimis, omnibus antice angustatis, cal. limbo reflexo cor. ad ⅓ partem fissa, nervis lateralibus obsoletis, jam a medio evanescentibus.*

*Pedalis, laxe-racemosa Cal tubus campanulato-turbinatus; limbus tubum cor. dimidium saepius superans. Cor. pallide-coerulea.*

Habit. *in alpe Zinken Styriae.*

*Campanula redux* Nob. *Foliis caulinis lanceolatis (brevibus) remote-serratis, superioribus lineari-angustatis, cal limbo erecto-patente, ultra ⅓ partem fissa, nervis lateralibus obsoletis, jam a medio evanescentibus.*

*Digitalis, laxe-racemosa. Cal. tubus hemisphaerico-turbinatus; limbus tubum cor. dimidium subaequans. Cor. saturate-coerulea.*

Habit. *in alpibus Transylvaniae* (Kotschy).

*Campanula inconcessa* Nob. *Foliis caulinis (longis) integerrimis, inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus, om-*

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: 005

Autor(en)/Author(s): Hinterhuber Rudolf

Artikel/Article: Nachträge zum Prodromus einer Flora von Salzburg etc. 347-349