

Aus H. Schott's: „*Analecta botanica*“.

(Fortsetzung.)

Campanula Hochstetteri Nob. Foliis rosularibus supra impresso-venosis opacis, cal. limbo recurvo-divaricato, tubum cor. dimidium aequante, cor. laciniis triangulari-ovatis, nervis lateralibus distinctis, sed extus parum prominulis, suturis paullo prominentibus.

Digitalis et ultra, gracilis, caule fere a basi pedunculos longissimos exserente. Folia rosularia ovata l. subreniformia, grosse remote-serrata, caulina grosse et remote serrata, ima ovalia, caetera anceolata, basi longe-angustata, bracteantia, lineari-lanceolata. Cor. parva, pallide-coerulea; lacinae patulae, apice recurvae, acutae.

Habit. in alpinis Styriae, ubi legerunt Hochstetter et Langenauer.

Campanula notata Nob. Foliis rosularibus supra elevato-venosis nitidis, calycis limbo horizontaliter divaricato et recurvato, cor. laciniis triangulari-ovatis, nervis lateralibus mox in venas solutis et evanescentibus, suturis prominulis.

Digitalis, uniflora, flore majusculo. Folia rosularum supra elevato-venosa, nitida, parva, rotundata, remote-serrata, caulina lanceolata, parcissime serrulata. Cor. lacinae acutae vix apiculatae, apice patentes.

Habit. in alpinis Carnioliae.

Campanula modesta Nob. Foliis rosularibus supra impresso-venosis, calycis limbo subhorizontaliter-divaricato, cor. laciniis triangulari-ovatis, nervis suturisque prominulis.

Digitalis et ultra, caule longiuscule-piloso paucifloro, pedunculis longis fere a basi ejusdem, l. unifloro. Folia sparse-ciliata, rosularum ovata, rotundato-ovata, grosse et remote-serrata, caulina lanceolata, remote serrata. Cor. lacinae triangulari-ovatae, acutae vix apiculatae, patulae.

Habit. in alpinis Transylvaniae (Kotschy). 1850.

Campanula turbinata Nob. (*C. carpathica*, transylvanica, Auctorum pro parte) Hirsuta, foliis opacis rectilineis-serratis, serraturis apice porrectis, calycis tubo campanulato-turbinato, laciniis divaricato-reflexis, sensim cuspidatis, cuspidate lacinia ipsa triplo brevior, corolla late-turbinata (sensim late-dilatata, non ventricosa), laciniis apice porrectis.

Praecox, corolla saturate-violacea.

Habit. in alpinis Transylvaniae (Kotschy).

Lamium cupreum Nob. Foliis breviter-petiolatis rugosis.

Perenne, pedale, pilis in caule folisque reversis hispidum. Caulis adscendens. Folia ovata, basi cordata, imo crenato-serrata,

reliqua inaequaliter - serrata, summa acuminata. Verticillastra 7—9-flora; bracteolae minutae, setaceo-subulatae. Calyx oblique infundibulari-campanulatus, e latere compressiusculus, 10-nervis, extus parce-pilosus; laciniae e basi lata setaceo-subulatae, postica subverticaliter adscendens caeteras subaequilongas superans. Corolla tubo calycino quintuplo longior (pollicaris), a medio tubi erecto-curvata, extus pubescens; tubus tubo calycino duplo longior, basi contractus, ibique supra ovaria plica transversa (quasi diaphragmate), stylo perforata clausus, caeterum intus pilosus; fauæ magna, inflata; labium inferius lacinia media transverse latiore flabellato-obcordata lobis deflexis crenulatis in unguem contracta, laciniiis lateralibus postice deflexis et in dentem setaceum saepe curvatum, partem anticam laciniae in denticulum brevem desinentem subaequantem, antrorsum productis; labium superius fornicato-obovatum, integrum, crenulatum, inferius subaequans. Antherae dorso longe albo-pilosae. Pollen miniatum.

Corolla obscure ex cupreo purpurea, intus, staminibus, tubo et labio inferiore (purpureo-venoso) albidis variegata.

Habit. in alpinis Transylvaniae (Kotschy).

Soldanella pyrolaeifolia Nob. Petiolis semiteretibus, inferne glandulis rarioribus, lamina orbiculato-sub-reniformi, remotissime et leviter-crenata, incisura basilari levissima, scaporum pedicellis subglabris.

Folia saturate-virentia, illis Pyrolae chloranthae non assimilia, petiolis longissimis, lamina crasse-coriacea, supra prominule-venosa.

Habitat in Carnioliae, Croatiae etc. alpinis.

Cortusa pubens Nob. Fol. lamina velutino-pubente, scape petiolisque breviuscule-pilosis (puberulis), corollae limbo expanso-campanulato, laciniiis semiellipticis, rotundato-obtusis.

Cinerascenti-viridis, gracilis, tenuiuscula. Folia minora, minus lobulata l. dentata. Calycis laciniae breviores. Capsula ovato-elliptica (nec oblonga), calyce vix plus duplo longior.

Habit. in Transylvaniae alpinis (Kotschy).

Androsace arachnoidea Nob. Intertexte-villosa, foliis rosularum fertilium lingulatis, sterilium lineari-oblongis l. lanceolatis, omnibus enerviis, bracteis involucrentibus oblongis l. lineari-oblongis planis.

Rosulae pallide-virentes, villis foliorum densis, elongatis, flexis et invicem intertextis quasi filis araneis vestitae. Calycis laciniae oblongo-ovatae. Corollae laciniae retusae, caeterum integerimae, distantes (majusculae).

Habit. in alpinis calcareis Transylvaniae (Kotschy).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [005](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Aus H. Schott`s: "Anatecta botanica". 357-358](#)