

## Aus H. Schott's: „*Analecta botanica*“.

(Fortsetzung.)

*Campanula Hochstetteri* Nob. *Foliis rosularibus supra impresso-venosis opacis, cal. limbo recurvo-divaricato, tubum cor. dimidium aequante, cor. laciniis triangulari-ovatis, nervis lateribus distinctis, sed extus parum prominulis, suturis paullo prominentibus.*

*Digitalis et ultra, gracilis, caule fere a basi pedunculos longissimos exserente. Folia rosularia ovata l. subreniformia, grosse remote-serrata, caulina grosse et remote serrata, ima ovalia, caetera anceolata, basi longe-angustata, bracteantia, linear-lanceolata. Cor. parva, pallide-coerulea; lacinia patulae, apice recurvae, acutae.*

Habit. in alpibus Styriae, ubi legerunt Hochstetter et Langenauer.

*Campanula notata* Nob. *Foliis rosularibus supra elevato-venosis nitidis, calycis limbo horizontaliter divaricato et recurvato, cor. laciniis triangulari-ovatis, nervis lateralibus mox in venas solutis et evanescentibus, suturis prominulis.*

*Digitalis, uniflora, flore majusculo. Folia rosularum supra elevato-venosa, nitida, parva, rotundata, remote-serrata, caulina lanceolata, parcissime serrulata. Cor. laciniae acutae vix apiculatae, apice patentes.*

Habit. in alpibus Carnioliae.

*Campanula modesta* Nob. *Foliis rosularibus supra impresso-venosis, calycis limbo subhorizontaliter-divaricato, cor. laciniis triangulari-ovatis, nervis suturisque prominulis.*

*Digitalis et ultra, caule longiuscule-pilosо paucifloro, pedunculis longis fere a basi ejusdem, l. unifloro. Folia sparse-ciliata, rosularum ovata, rotundato-ovata, grosse et remote-serrata, caulina lanceolata, remote serrata. Cor. laciniae triangulari-ovatae, acutae vix apiculatae, patulae.*

Habit. in alpibus Transylvaniae (Kotschy). 1850.

*Campanula turbinata* Nob. (*C. carpathica, transylvanica, Auctorum pro parte*) *Hirsuta, foliis opacis rectiline-serratis, serraturis apice porrectis, calycis tubo campanulato-turbanato, laciniis divaricato-reflexis, sensim cuspidatis, cuspide lacinia ipsa triplo breviore, corolla late-turbanata (sensim late-dilatata, non ventricosa), laciniis apice porrectis.*

*Praecox, corolla saturate-violacea.*

Habit. in alpibus Transylvaniae (Kotschy).

*Lamium cupreum* Nob. *Foliis breviter-petiolatis rugosis.*

*Perenne, pedale, pilis in caule folisque reversis hispidum. Canalis adscendens. Folia ovata, basi cordata, imo crenato-serrata,*

*reliqua inaequaliter - serrata , summa acuminata. Verticillastra 7—9-flora ; bracteolae minutae, setaceo-subulatae. Calyx oblique infundibulari-campanulatus , e latere compressiusculus , 10-nervis, extus parce-pilosus; laciniae e basi lata setaceo-subulatae, postica subverticaliter ascendens caeteras subaequilongas superans. Corolla tubo calycino quintuplo longior (pollicaris), a medio tubi erecto-curvata, extus pubescens; tubus tubo calycino duplo longior, basi contractus, ibique supra ovaria plica transversa (quasi dia-phragmate), stylo perforata clausus, caeterum intus pilosus; faux magna, inflata; labium inferius lacinia media transverse latiore flabellato - obcordata lobis deflexis crenulatis in unguem contracta, laciniis lateralibus postice deflexis et in dentem setaceum saepe curvatum, partem anticam laciniae in denticulum brevem desinentem subaequantem, antrorsum productis; labium superius fornicato-ovatum, integrum, crenulatum, inferius subaequans. Antherae dorso longe albo-pilosae. Pollen miniatum.*

*Corolla obscure ex cupreo purpurea, intus, staminibus, tubo et labio inferiore (purpureo-venoso) albidis variegata.*

Habit. in alpibus Transylvaniae (Kotschy.)

*Soldanella pyrolaeifolia Nob. Petiolis semiteretibus, inferne glaudulis rarioribus, lamina orbiculato - sub - reniformi, remotissime et leviter-crenata, incisura basilari levissima, scaporum pedicellis subglabris.*

*Folia saturate - virentia , illis Pyrolae chloranthae non absimilia, petiolis longissimis, lamina crasse - coriacea, supra prominule-venosa.*

Habitat in Carnioliae, Croatiae etc. alpibus.

*Cortus a pubens Nob. Fol. lamina velutino-pubente, scape petiolisque breviuscule-pilosus (puberulus), corollae limbo expanso-campanulato, laciniis semiellipticis, rotundato-obtusis.*

*Cinerascenti-viridis, gracilis, tenuiuscula. Folia minora, minus lobulata l. dentata. Calycis laciniae breviores. Capsula ovato-elliptica (nec oblonga), calyce vix plus duplo longior.*

Habit. in Transylvaniae alpibus (Kotschy).

*Androsace arachnoidea Nob. Intertexte-villosa, foliis rosularum fertilium lingulatis, sterilium linearis - oblongis l. lanceolatis, omnibus enervis, bracteis involucrantibus oblongis l. linearis - oblongis planis.*

*Rosulae pallide - virentes, villis foliorum densis, elongatis, flexis et invicem intertextis quasi filis araneis vestitae. Calycis laciniae oblongo-ovatae. Corollae laciniae retusae, caeterum integerimae, distantes (majusculae).*

Habit. in alpibus calcareis Transylvaniae (Kotschy).

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [005](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Aus H. Schott's: "Anatecta botanica". 357-358](#)