

mehre Jahre hindurch beobachteten. Sodann müssen wir bemerken, dass auch die von Herrn Böckeler als *F. Wirtgeni* am Weserufer bei Vegesack gesammelte Pflanze zu *F. rostellata* gehörte, so wie diese Art auch auf Aeckern bei Neisse in Schlesien von Herrn Winkler beobachtet wurde. Bei der Durchsicht der *Fumariaceen* im Herbar des Chemiker Herrn Bauer in Berlin fanden wir auch ein Exemplar der *F. rostellata*, welches dieser Herr schon im Jahre 1818 bei Dresden gesammelt hat.

Ueberblicken wir nun den Verbreitungskreis von *F. rostellata* Knaf, so finden wir, dass diese Art ausser an den vielen Orten im nördlichen Böhmen auch in Schlesien (Neisse), sowie im Königreiche (Dresden) und in der Provinz (Halle) Sachsen, ferner am Unterharze (Ballenstedt, Blankenburg, Elbingerode) und sogar noch am Weserufer bei Vegesack vorkommt.

Berlin im Mai 1856.

Flora von Weisskirchen in Mähren.

Von August Vogl.

(Fortsetzung.)

Moneses Salisb.

uniflora Rchb. In Tannenwäldern hinter Teplitz sehr selten.

Pyrola Salisb.

secunda L.
rotundifolia L.
chlorantha Sw. } In Nadelwäldern hinter Teplitz, Hleis etc.

Monotropa L.

Hypopitys L. gemein.

Vaccinium L.

Myrtillus L. s. gem. Zur Zeit der Reife ihrer Früchte sieht man ganze ProzeSSIONen von Kindern in die Wälder eilen. Jedes trägt einen oder mehre grosse Töpfe, und es gehört unstreitig eine solche Expedition (*na boruvky*) zu den erfreulichsten Begebnissen der Kinderjahre.

Campanula L.

patula L.
Rapunculus L. } gem.

persicifolia L. In allen Wäldern.

rapunculoides L. mit letzterer.

latifolia L. Selten in d. Teplitzer Wäldern.

Trachelium L. s. gem.

glommerata L. Auf Kalkfelsen und in Wäldern des Skřivý.

Cervicaria L. Bei Ribář im Helfensteingebirge.

Phyteuma L.

spicatum L. In den Wäldern verbreitet.

Jasione L.

montana L. gem.

Hieracium L.

Pilosella L. gem.

bifurcum M. B. In d. Hurka.

Auricula L. Auf allen Anhöhen.

collinum Fries. auf Anhöhen d. Süd. O. Seite selten.

murorum L. gem.

sylvaticum Lamk. Mit letzteren in den Wäldern d. O. Seite.

glaucum All. Auf dem Teplitzer Berge.

umbellatum L. In d. Kalksteinbrüchen hinter Teplitz und in Hohlwegen d. N. und S. Seite.

Sabaudum All. In den Wäldern allgemein verbreitet.

Crepis Gärtner.

- tectorum* L. } gem.
biennis L. }
paludosa Mönch.
- Prenanthes* Gärtn.
purpurea L. Im Skřivý und im Gesenke.
- Lactuca* L.
muralis Gärtn. gem.
- Sonchus* Cass.
oleraceus L. } gem.
asper Hall. }
arvensis L. }
- Taraxacum* Hall.
officinale Mönch. s. gem.
- Tragopogon* Tournef.
pratensis L. gem.
- Picris* L.
hieracioides L. Auf Wiesen der Umgegend nicht selten.
- Oporinia* Don.
autumnalis Don. In Wäldern und auf Wiesen.
 Var. *Op. runcinata* Kitt. Im Skřivý.
- Leontodon* Juss.
vulgaris Kitt. s. gem.
 Var. *α. hispidus* L.
 „ *β. hastilis* L. Letztere mit 2—3' hohem Schaft und 1' lang. Wurzelbl.
- Cichorium* L.
Intybus L. gem.
- Lapsana* Tournef.
communis L. gem.
- Lappa* Tournef.
minor D. C. } gem.
major. Gärtn. }
tomentosa Lamk. }
- Cirsium* Tournef.
rivulare All. Auf feuchten Wiesen unter dem Hleizerberge bei Ribář etc.
oleraceum All. ebendasselbst.
canum M. B. ebenso.
arvense Scop. gem.
- Carduus* Gärtn.
crispus L. gem.
acanthoides L. gem.
- Onopordon* L.
Acanthium L. Bisher nur bei der Travníker Mühle gefunden.
- Centaurea* L.
solstitialis L. In einem Exempl.
paniculata L. gem.
Scabiosa L. Auf Kalkfelsen bei Teplitz.
Cyanus L. s. gem.
phrygia L. auf Wiesen nächst der Ludina.
Jacea L. s. gem.
- Carlina* L.
acaulis L. gem.
vulgaris L. hinter Teplitz.
- Echinops* L.
sphaerocephalus L. In einem Exemplar bei Austi gegen Malhotic gef.
- Senecio* L.
vulgaris L. gem.
viscosus L. Im Skřivý, in der Hurka.
sylvaticus L. In allen Waldungen.
Jacobea L. gem.
aquaticus L. In Gräben selten.
saracenicus L. Bečvauffer und Wälder.
nemorensis L. hinter Teplitz.
- Filago* L.
arvensis L. s. gem.
germanica L. bei Zbrašan.
V. f. ramosa hinter Teplitz.
- Antennaria* R. Br.
dioica Gärtn. gem.
- Gnaphalium* R. Br.
sylvaticum L. — Skřivý.
uliginosum L. Auf nassen Aeckern.
luteo-album L. selten im Gesenke bei Hrabuvka.
- Tanacetum* L.
vulgare L. gem.
- Artemisia* L.
vulgaris L. s. gem.
- Matricaria* L.
Chamomilla L. selten.
inodora L. s. gem.
- (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Vogl August Emil von Fernheim

Artikel/Article: [Flora von Weisskirchen in Mähren. 260-261](#)