

Der Blütenstand bei *P. Schwarzenbergiana* zeigt niemals die Tendenz zur Kopfbildung wie bei *P. lanceolata*, sondern die zur zylinderförmigen Verlängerung wie bei *P. maritima* und *major*.

Die Brakteen sind fleischig, und so wie die äussern Kelchabschnitte breiter und stumpfer.

Sehr unterscheidend ist die Frucht oder Kapsel. Diese ist eiförmig, spitz und mit einer Stachelspitze versehen, und gerade in der Mitte rundherum abgeschnitten, zweifächrig, jedes Fach wieder etwa halb zweifächrig und in jedem Fache, mit zwei Samen versehen, als o v i e r s a m i g nicht zweisamig wie bei *P. lanceolata* und somit gar nicht zur Abtheilung, wo *P. lanceolata* hingehört, zu zählen.

Die Samen sind halbzylinderförmig an beiden Enden rundlich braun oder schwärzlich (nicht halbeiförmig wie bei *P. lanceolata*) und etwa nur halb so gross als bei dieser.

Die Scheidewand der Kapsel bei *P. Schwarzenbergiana* bleibt bei dem *Pericarpium*, während bei *P. lanceolata* diese mit dem Samen gleich sich ablöst.

(Fortsetzung folgt.)

Flora von Weisskirchen in Mähren.

Von August Vogl.

(Fortsetzung.)

- | | |
|--|--|
| <i>Linum</i> L. | } allgemein ver- |
| <i>catharticum</i> L. gem. | |
| <i>Acer</i> L. | <i>Barbarea</i> R. Br. |
| <i>Pseudoplatanus</i> L. | } Hier und da
} in den Wäl-
} dern. |
| <i>platanoides</i> L. | |
| <i>campestre</i> L. gem. | <i>vulgaris</i> R. Br. gem. |
| <i>Polygala</i> L. | <i>Turritis</i> L. |
| <i>vulgaris</i> L. gem. | <i>glabra</i> L. Auf Aeckern. |
| Var. α . <i>trivialis</i> | <i>Cardamine</i> L. |
| " β . <i>commosa</i> Schk. | <i>pratensis</i> L. gem. |
| " γ . <i>amara</i> Jacq. | <i>amara</i> L. In Gebirgsschluchten. |
| <i>Fumaria</i> L. | <i>Arabis</i> L. |
| <i>officinalis</i> L. Spärlich verbreitet. | <i>arenosa</i> Scop. Hurka, Šoršov. |
| <i>Corydalis</i> D. C. | <i>Dentaria</i> L. |
| <i>cava</i> Wahlb. } In Hecken und | <i>glandulosa</i> W. et K. In der |
| <i>digitata</i> Pers. } Wäldern verbr. | Hradekschlucht hinter Teplitz;
dann in Schluchten des Draho-
tuch. |
| <i>Chelidonium</i> L. | <i>bulbifera</i> L. Im Pařovicer Hoch-
walde. |
| <i>majus</i> L. s. gem. | <i>Erysimum</i> L. |
| <i>Papaver</i> L. | <i>cheran thoides</i> L. s. gem. |
| <i>dubium</i> L. } Unter der Saat. | <i>orientale</i> R. Br. s. auf Aeckern. |
| <i>Rhoeas</i> L. } | <i>Alliaria</i> Adans. |
| <i>Nasturtium</i> R. Br. | <i>officinalis</i> R. Br. gem. |
| <i>amphibium</i> R. Br. s. selten in | <i>Sisymbrium</i> L. |
| sumpfigen Teichen. | <i>Sophia</i> L. gem. |
| | <i>officinale</i> Scop. s. gem. |

- Sinapis* L.
arvensis L. gem.
Berteroa D. C.
incana D. C. gem.
Alyssum L.
calycinum L. gem.
Draba L.
verna L. Auf Aeckern der N. Seite.
Cochlearia L.
Armoracia L. gem.
Camelina Crantz.
sativa C. Auf Aeckern gem.
Thlaspi L.
arvense L. s. gem.
montanum L. Auf der Home'schen Pasecke s. selten.
Lepidium L.
campestre R. Br. Teufelskanzel.
runderale L. s. gem.
Capsella Vent.
Bursa pastoris Vent.
Neslia Desv.
paniculata Desv. gem.
Raphanus L.
Raphanistrum L. s. gem.
Helianthemum Tournef.
vulgare Gärtn. Auf trockenen Anhöhen.
Parnassia L.
palustris L. Auf feuchten Wiesen hinten v. Skalka.
Viola L.
hirta L. Allgem.
odorata L. gem.
 Die *Variet.* mit weissen Blüten in einer Schlucht zwischen d. Stadt und Teplitz.
- sylvestris* Lamk. gem.
canina L. gem.
Var. α. V. ericetorum Schr.
 „ *β. V. lucorum* Rchb.
persicifolia Schk. selten.
tricolor L. s. gem.
Dianthus L.
Carthusianorum L. S. selten auf den umliegenden Kalkfelsen.
Armeria L. Auf der Teufelskanzel hinter Teplitz; selten.
deltoides L. Mit ersterem, doch häufiger.
Gypsophila L.
muralis L. Auf Aeckern zerstr.
Saponaria L.
officinalis L. gem.
Silene L.
inflata Sm. gem.
nutans L. In Wäldern der Hurka, des Hleizerberges etc.
Melandrium Rochl.
pratense R. s. gem.
Viscaria Rochl.
purpurea Rochl. Hurka.
Lychnis Tournef.
Flos Cuculi L. gem.
Agrostemma L.
Githago L. s. gem.
Cucubalus L.
bacciferus L. s. selten in Hecken bei Teplitz.
Malachium Fries.
aquaticum Fries. gem.
Cerastium L.
arvense L. s. gem.
vulgatum L. gem.
 (Schluss folgt.)

Correspondenz.

— Breslau im Juli. — *Lichenes selecti germanici*, unter diesem Titel beabsichtige ich vom 1. September c. ab in losen je 30 Nummern umfassenden Heften wo möglich sä m m t l i c h e in meinem „*Systema lichenum Germaniae*“ (Breslau 1855) sowie in den unter dem Namen „*Parerga lichenologica*“ von mir demnächst herauszugebenden Nachträgen hiezu als n e u e A r t e n beschriebene L i c h e n e n, wie auch eine ausgewählte Anzahl zwar schon beschriebener, aber höchst seltener und grösstentheils noch nicht herausgegebener deutscher Flechten dem lichenologischen Publikum

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [006](#)

Autor(en)/Author(s): Vogl August Emil von Fernheim

Artikel/Article: [Flora von Weisskirchen in Mähren. 276-277](#)