

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Ärzte, Apotheker und Techniker.

## Wien, 8. Jänn. 1857. VII. Jahrgang. № 2.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 10 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, bis in der Siedlischen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Innerst die ganze Petitszile & hr. C. M.

Inhalt: Beiträge zur Kenntniss der siebenbürgischen Eichen. Von Dr. Schur.  
— Die Feigen Griechenlands. Von X. Landerer. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Literarische Notizen. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Inserat.

### Beiträge zur Kenntniss der siebenbürgischen Eichen.

Von Prof. Dr. Ferd. Schur.

(Fortsetzung).

r) *globulata* foliis discoloribus rigidiusculis 4 poll. longis,  
breiter lobatis. — *Balanis minimis* subglobo sis  
basi contractis et plicatis cupula sua duplo superantibus.—  
*Cupulae squamarum* parte libera adpresso, lanceolata,  
obtusa dorso pilosa marginaque ciliata. Arbor mediocris  
30—40 ped. Im Walde bei Kastenholz. — Aug

s) *Pseudosessilis* m. subspecies!

Foliis brevissime petiolatis, siccatione subcoriaceis subtus  
glaucis. — *Balanis brevissime* pedunculatis, 1—3 confertis  
cupula sua, duplo brevioribus iis. var. *brachibalanis* simili bus. — *Cupula dense* sed brevissime villosa squamarum  
parte libera trianguli, obtuso, ciliato. Pedunculo com-  
muni 3—6 lin. longo, apice 1—3 balanis confertos gerente.  
— Media inter *Quercum Roburem* et *pedunculatum*, et in  
quadem rationem memorabilis forma!

*Arbor speciosa* procerd corona crispa expansa praedita,  
30—40 ped. alta. In den Waldern bei Kastenholz,  
Fogaras und Hammersdorf.

NB. Welche von diesen zahlreichen Formen die *Quercus Robur a L.*, f. *suec. ed. 2. pag. 340*, sei, wage ich nicht massgebend zu entscheiden. — Nach den im nördlichen Deutsch-

land von mir gesammelten Exemplaren dürfte, wenn ich mich nicht irre, die „*Vor. k glaberrima*“ die vermeintliche Liné'sche Pflanze, oder die „*Forma genuina*“ sein.

Die übrigen Synonyme sind:

- = *Quercus pedunculata* Ehrh. *arbor. n.* 17 — Schk. *tab. 301 a.*
- = *Q. " pedunculata* Bmg. *En. II. pag. 139 n.* 1133.  
et *Schur sertum f. Transs.* p. 67 n. 2546 c *Var. a-b.*
- = *Q. " pedunculata* M. Bieb. *fl. taur. II-III.* p. 402—466—621.
- = *Q. " Robur a L. fl. suec. ed. 2.* p. 340.
- = *Q. " Robur a pedunculata* Weinm. fl. petrop. p. 95.
- = *Q. " Robur Sm. fl. brit. III.* p. 1026.
- = *Q. " cupulatus* Gilib. *Exerc. phyt. III* p. 398.
- = *Q. " semina fl. dan. tab. 1080* — *Mill. Dict. n. 2.*
- = *Q. " racemosa* Lam. *dict. I.* 715.
- = *Q. " Robur Host. a II.* p. 622.
- = *Q. " pyrenaica* Stev. *ex M. B.*
- = *Q. " intermedia* Bung. *? teste Reichb. flor. excurs.*  
*p. 177.*
- = *Q. " macrocarpa* } *Lapeyr.*
- = *Q. " microcarpa* } *Lapeyr.*

an = var. c et d mihi *sertum* p. 67?

Ceter. cide Endl. *gen. pl. suppl. IV.* p. 24.

Reichb. *Abbild. a. fl. germ.*

Ein allgemein verbreiteter Waldbaum, welcher in manchen Bezirken des Gebietes alle andern Arten ausschliessend vorkommt. — Seine vertikale Verbreitung erstreckt sich von 600'—2500' absoluter Gebirgshöhe. — Die Substrate sind verschieden. Die Tertiärbildungen sind seine gewöhnlichsten geognostischen Unterlagen, obwohl er den Kalk, wie z. B. bei Kronstadt, nicht ausschiesst. — Blüthezeit April — Mai. — Reife der Eicheln August — September. —

## 2. *Quercus sessilis* Ehrh. arbr. 87.

*Q. foliis petiolatis, basi in petiolum productis vel inaequati-emarginatis, obovatis, sinuato-lobatis. Floribus semineis in pedunculo brevissimo communi apice aggregatis sessilibus.*

Variat:

- a) *barbulata* *foliis subtus in venis pilosis, basique evidenter emarginatis, balanis apice ramorum aggregatis.* = *Q. Robur fl. lanuginosa* Roch. et Roch. *pl. r. banat.* *tab. 38 fig. 79.* In den Waldern bei Hermannstadt, beim Dorfe Grossscheuern gegen Stolzenburg. Aug. Sept. —
- b) *glabrat a* *foliis utrinque glabris basi non emarginatis, balanis, lateralibus binis oppositis cupula gibbosa ore villosa.* — In den Waldern bei Hermannstadt die häufigste Form. Aug. Sept. —

(Fortsetzung folgt.)

# **ZOBODAT -**

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische  
Botanische Zeitschrift – Plant Systematics

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schur Ferdinand Philipp  
Johann

Artikel/Article: Beiträge zur Kenntnis der  
siebenbürgischen Eichen. 9-10