

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 8. Jänn. 1857. VII. Jahrgang. **N^o 2.**

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 3 Rthlr. 30 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, hies in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzelle 5 kr. C. M.

Inhalt: Beiträge zur Kenntniss der siebenbürgischen Eichen. Von Dr. Schur. — Die Feigen Griechenlands. Von X. Linderer. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Literarische Notizen. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Inserat.

Beiträge zur Kenntniss der siebenbürgischen Eichen.

Von Prof. Dr. Ferd. Schur.

(Fortsetzung).

r) *globulata foliis discoloribus rigidiusculis 4 poll. longis, breviter lobatis.* — *Balanis minimis subglobosis basi contractis et plicatis cupula sua duplo superantibus.* — *Cupulae squamarum parte libera adpressa, lanceolata, obtusa dorso piloso margineque ciliata.* Arbor mediocris 30–40 ped. Im Walde bei Kastenholz. — Aug

s) *Pseudo-sessilis n. subspecies!*

Foliis brevissime petiolatis, siccatione subcoriaceis subtus glaucis. — *Balanis brevissime pedunculatis, 1–3 confertis cupula sua, duplo brevioribus iis.* var. *brachibalanis similibus.* — *Cupula dense sed brevissime villosa squamarum parte libera triangulari, obtuso, ciliato. Pedunculo communi 3–6 lin. longo, apice 1–3 balanis confertos gerente.* — *Media inter Quercum Roburem et pedunculatam, et in quadam rationem memorabilis forma!*

Arbor speciosa procerà corona crispa expansa praedita, 30–40 ped. alta. In den Wäldern bei Kastenholz, Fogaras und Hammersdorf.

NB. Welche von diesen zahlreichen Formen die *Quercus Robur* a L., *ß succ. ed. 2. pag. 340.* sei, wage ich nicht massgebend zu entscheiden. — Nach den im nördlichen Deutsch-

land von mir gesammelten Exemplaren dürfte, wenn ich mich nicht irre, die „*Var. k glaberrima*“ die vermeintliche Liné'sche Pflanze, oder die „*Forma genuina*“ sein.

Die übrigen Synonyme sind:

- = ¹*Quercus pedunculata* Ehrh. *arbor. n. 17* — Schkh. *tab. 301 a.*
 - = ²*Q. „ pedunculata* Bmg. *En. II. pag. 139 n. 1133.*
et Schur sertum f. Trauss. p. 67 n. 2546 c Var. a—h.
 - = ³*Q. „ pedunculata* M. Bieb. *fl. taur. II—III. p. 402—*
466—621.
 - = ⁴*Q. „ Robur a L. fl. suec. ed. 2. p. 340.*
 - = ⁵*Q. „ Robur a pedunculata* Weinm. *fl. petrop. p. 95.*
 - = ⁶*Q. „ Robur* Sm. *fl. brit. III. p. 1026.*
 - = ⁷*Q. „ cupulatus* Gilib. *Exerc. phyt. III p. 398.*
 - = ⁸*Q. „ femina* fl. dan. *tab. 1080—Mill. Dict. n. 2.*
 - = ⁹*Q. „ racemosa* Lam. *dict. I. 715.*
 - = ¹⁰*Q. „ Robur* Host. *a II. p. 622.*
 - = ¹¹*Q. „ pyrenaica* Stev. *ex M. B.*
 - = ¹²*Q. „ intermedia* Bungh? *teste Reichb. flor. excurs.*
p. 177.
 - = ¹³*Q. „ macrocarpa* } *Lapeyr.*
 - = ¹⁴*Q. „ microcarpa* }
- an = var. c et d mihi sertum p. 67?
Cster. vide Endl. *gen. pl. suppl. IV. p. 24.*
Reichb. *Abbild. z. fl. germ.*

Ein allgemein verbreiteter Waldbaum, welcher in manchen Bezirken des Gebietes alle andern Arten ausschliessend vorkommt. Seine vertikale Verbreitung erstreckt sich von 600'—2500' absoluter Gebirgshöhe. — Die Substrate sind verschieden. Die Tertiärbildungen sind seine gewöhnlichsten geognostischen Unterlagen, obwohl er den Kalk, wie z. B. bei Kronstadt, nicht ausschliesst. — Blüthezeit April — Mai. — Reife der Eicheln August — September. —

2. *Quercus sessilis* Ehrh. *arbr. 87.*

Q. foliis petiolatis, basi in petiolum productis vel inaequati-emarginatis, obocatis, sinuato-lobatis. Floribus femineis in pedunculo brevissimo communi apice aggregatis sessilibus.

Variat:

- a) *barbulata* foliis subtus in venis pilosis, basi que eidenter emarginatis, balanis apice ramorum aggregatis. = *Q. Robur fl. lanuginosa* Roch. et Roch. *pl. r. banat. tab. 38 fig. 79.* In den Wäldern bei Hermannstadt, beim Dorfe Grossscheuern gegen Stolzenburg. Aug. Sept. —
- b) *glabrata* foliis utrinque glabris basi non emarginatis, balanis, lateralibus binis oppositis cupula gibbosa ore villosa. — In den Wäldern bei Hermannstadt die häufigste Form. Aug. Sept. —

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schur Ferdinand Philipp
Johann

Artikel/Article: Beiträge zur Kenntnis der
siebenbürgischen Eichen. 9-10