

XXX. Terebinthaceen.

Obschon im Rothenhauser Park: *Rhus Cotinus*, *Typhina* und *Toxicodendrum* häufig vorkommt, so kann man selbe doch nur der Cultur zuschreiben und unter die wildwachsenden Pflanzen nicht mit aufnehmen.

XXXI. Papilionaceen.

Sarothamnus vulgaris W i m m. An Waldrändern bei Hauenstein 27. Juli 1844. In den Gebüsch zwischen Rothenhaus und Eisenberg auch, an Park- und Waldrändern bei Eisenberg 5. Juli 1845. Am Schlossberg bei Teplitz 2. Juni 1846. In Teplitz auf der Stephanshöhe bei Schönau 9. Juli 1851. Im Osseger Wald 2. Juni 1852 (A. Roth).

(Fortsetzung folgt).

Zwei Thesium-Arten aus Böhmen.

Dr. W. Wolfner beschreibt in Nr. 36 der Flora (1856) nachfolgende zwei Thesium-Arten:

1. *Thesium carnosum* Wolfn. — *Th. tota planta flavo-virens; radice fusiformi, multicauli; caulibus racemosis (5–10 centim. long.) ramulis fructiferis unifloris, erecto-patentibus, heteromallis; foliis: (1–2 centim. long. $\frac{1}{4}$ –1 millim. lat.) linearibus, obsolete nervosis, curvatis, crassiusculis subcarnosis, supra concavis, subtus subcanaliculatis, concavis; floribus albis, tetrandris, tribracteatis, drupis subglobosis; perigonio fructus tubuloso apice involuto, drupam duplo longiore. Floret mense Junio A. — Habit. in collibus saxosis prope Dobruška in Bohemia. Proximum *Th. alpinum* sed differt: tota planta flavo-virens, non virescens; ramulis fructiferis heteromallis, non secundis: foliis subcarnosis supra concavis, subtus canaliculatis, non planis.*

2. *Thesium macranthum* Presl. — Perenne, caulibus adscendentibus, foliis anguste linearibus, acutis, uninerviis, floribus racemosis, pedunculis apice bracteam solitariam linearem flore subaequalem (duplo longiorem usque subbreviorem) gerentibus, perigonii sessilis ovario globoso quadruplo longioris tubo inflato, staminibus limbo corollae patentissimo duplo brevioribus basi squama lanceolata suffultis; antheris apiculatis, stigmatibus globosis. — Racemus apice comosus. Pedunculi uniflori, basi nudi. Flores tres semi-quartam lineam longi, virides, intus flavescentes. Ovarium globosum obscure striatum. — Fructus ignotus. — Affine *Th. rostratum*, differt: foliis basi longe angustatis nec aequilatis floribus majoribus, staminibus basi squama acuta laciniata ciliata suffultis, nec nudis, antheris apiculatis, stigmatibus globosis nec trilobis. — Craslau in Bohemia. (Diese Pflanze wurde bereits im J. 1843 beschrieben und zwar in Sommer's Topographie von Böhmen. II. Band. p. 26.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Zwei Thesium-Arten aus
Böhmen. 90