

conice attenuata sepala libera paulo superantia. — Uuiana anglica (Schomburgh).

Spathiphyllum blandum. Lamina fol. elliptico-oblonga, utrinque subrepentino-, basi in geniculum longulum, apice in cuspidem cix longum, angustata, venis patentibus, magis approximatis. Spatha elliptico-oblonga, basi repentino acutata, pedunculo longissime decurrens, apice cuspidato-longe-acuminata. Spadix digitiformis, ultra spathae medium valde productus. inferne absque parte libera stipitiformi, pedunculo per 4–5 pollicarem spatium ex toto spathae accreta sustentus. Ovaria ultra sepala libera valde prolongata, loculamentis biculatis.

Synon. Spathiphyllum cannaefolium Hortorum.

Spathiphyllum phrynifolium. Lamina fol. late-orato-oblonga, basi repentino angustata l. rotundata, ima basi ad geniculum longum cuneatim defluens, apice subsensim acutata, cuspidem elongata terminata, venis patentissimis, in margine leviter ascendentibus, remotiusculis. Spatha lanceolato-oblonga, basi subsensim angustata, pedunculo paulo decurrens, apice sensim in acumen cuspidatum angustata, spadiceis stipite libera multoties longior. Spadix digitiformis, spathae medium multo superans, inferne pedunculo longitudine ultrapollicari spathae accreto, apice brevis spatio libero et stipitiformi suffultus, parte florifera stipite soluto 6–7-ies longiore. Ovaria ultra sepala libera valde protensa, loculamentis biculatis. — Isthmus Panamae. (Chagres, in Collect. Fendleri Nr. 425. Januario 1850.)

Spathiphyllum Fendleri. Lamina fol. oblongo-elliptica, basi repentine acutata, apice haud longe-cuspidata, venis apertepatentibus, remotiusculis. Spatha elliptica, basi sensim angustata, pedunculo decurrens, apice subabrupte in cuspidem longum angustata, spadiceis stipitem solum 20-ies et ultra superans. Spadix digitiformis spathae medium circiter attingens, inferne pedunculo per pollicarem l. ultra pollicarem spatium spathae adnato, apice libere et stipitiforme prolato suffultus, parte florifera quam stipes solutus 8-ies longiore. Ovaria ultra sepala libera longe-exserta, loculamentis sub-8-orulatis. — Isthmus Panamae. (Chagres, in Collect. Fendleri Nr. 426. Martio 1850.)

Schönbrunn, 30. April 1857.

Ueber drei neu aufgestellte Labiaten-Gattungen.

Von H. G. Reichenbach fl.

Bei Bearbeitung der „Labiatae“ für die *Icones florum germanicarum* haben sich drei Typen mit den bisherigen Gattungsumschreibungen unvereinbar gezeigt, von denen zwei als neue Gattungen aufgestellt werden, während die dritte bereits von Tournefort gekannt worden war.

Tendana.

Calyx cylindraceus, arctus, nervoso striatus (lacandolaceus) bilabiatus: dentes terni superiores breviores, inferiores longiores. Corolla infundibularis; galea emarginata; labium trilobum, lobi laterales rhombi, lobus medius obovatus cum apiculo in sinu. Filamenta brevissima alte inserta. Antherae trapeziformes connectivo lato inter loculos more Thymi. (An adest sexus duplex?) Stylus filiformis, stigma rotundato-bilamellatum.

Genus dictum in memoriam Tendae vici pedemontani, ubi cum amicissimis Reuter et Lisa anno 1843 per nonnullos dies tot decerpissimus centurias plantarum Stigmati figura ab omnibus reliquis generibus affinis recedit.

Tendana Piperella Thymus Piperella All. Ped. 1, 21. t. 37 f. 3. W. K. Hung. Bar. II. 169 t. 156. Thymus croaticus Pers. Syn. II. 130. Calamintha croatica Hist. Austr. II. 132. Calamintha Piperella Rehb. Exc. 328. Micromeria Piperella Benth. Lab. 379. Thymus subcordatus Vis. Dalm. tab. XIX. Suffruticulosa dense prostrato caespitosa. Caulis obtusissime quadranguli minute puberuli. Folia subsessilia ovata acuta cordata, supra nervum medium puberula, nunc tota puberula, summa colorata, omnia inferne lucide flavo resinosa punctata. Bracteolae linearilanceolatae. Cymae vulgo uniflorae, omnes saepe secundae. Calyces violaceo colorati. Corolla lacte violaceo purpurea, rarissime alba.

Crescit in collibus Pedemontii, Croatiae, Dalmatiae. Aestate ♀. Piemont: mont d'Ormeau: de Charpentier, Requien. Tenda an Dolomittens mit Lavandula vera, Ononis Columnae, Galium purpureum, Boissier! Reuter! Lisa! Reichenbach filii — Dalmatien: Vellebit Clementi! — Croatiae: Plissivica Kitaibel. — Vergleiche die interessanten Berichte Herrn Dr. Schlosser's in diesem Wochenblatt II. 378, 394.

Coridothymus.

Calix utriculatus utrinque alis supra nervos dentium minorum parium decurrentibus, anceps, bilabiatus, labium superius minute tridentatum dente medio minori; seu bidentatum; seu tridentatum dentibus lateralibus supra dentem medium transsilientibus; labium inferius ex dentibus geminis profunde fissis. Corolla infundibularis: galea obcordata, labium trifidum laciniis lateralibus ligulatis, lacinia media spatulata retusiuscula longiori. Filamenta exserta, connectivum umbonato acutum angustum, loculi utrinque deorsum versi. Styli crura inaequalia, nunc uncinata, nunc recta.

Nomen ex Coride et Thymo effectum ob quandam similitudinem inflorescentiae Coridis monspeliensis. Antherarum fabrica prope Saturejarum, sed stamina exserta, et calyx plane diversus, et styli crura valde inaequalia. Thymus contra et calyce et styli cruribus aequalibus et antheris trapezoidis longe abhorret. Calamintha et Micromeria calyce et antheris, illa illis prope Thymi, haec illis prope Melissa. A Thymbra, ad quam cel. Grisebach vulgo fel-

cissimus, semper oculatissimus retulit, nobis antherarum fabrica ac stylo recedit. Thymbra enim pollet antheris ac stylo Thymi; calyce prope Coridothymi.

C. capitatus. Satureja capitata L. Sp. 795. Sibth. Sm. Graec. tab. 544. Thymus capitatus Hoffm. Lk. Port. I. 123. Thymbra spicata Pett. bot. Wegw. 1037. Thymbra capitata Gris Specil. fl. Rum. II. 127. Truncus basi bene lignosus, totus. Rami puberuli, erecti, dense foliati, foliis ob ramulos axillares abbreviatos folia fasciculata ferentibus. Folia linearia, obtuse acuta, nervo medio infra carinato transecta subtriangula, margine denticulato-ciliolata, creberrime fusco seu flavofusco resinoso punctata, subcoriacea. Folia floralia subaequalia. Bracteolae oratae acutae. Cymae vulgo uniflorae in capitulum ob folia floralia imbricata substrobiliforme congestae. Flores purpuri.

Crescit in regione mediterranea. A Junio in Septembrem ♀.

Obs. Specimina orientalia longe macriora, quam occidentalia, culta diversa, characteres ad separandas species non praebuerunt.

Stoechas. T.

Inst. 201.

Omnia Lavandulae, recedit styli capitati cruribus abbreviatis retusis.

Stoechas officinarum Mill. = Lavandula Stoechas. L.

Stoechas pedunculata Rehb. fil. = Lavandula pedunculata. Cav.

Stoechas abrotanoides Rehb. fil. = Lavandula abrotanoides Lam.

Stoechas rotundifolia Rehb. fil. = Lavandula rotundifolia

Benth.

Stoechas pinnata Rehb. fil. = Lavandula pinnata L. fil.

Stoechas dentata Rehb. fil. = Lavandula dentata L.

Leipzig, 10. April 1857.

Verzeichniss

derjenigen Pflanzen, die bisher in dem böhmischen Erzgebirge und in der Gegend von Rothenhaus und Umgebung aufgefunden worden sind.

Von A. Roth.

(Fortsetzung).

Matricaria Chamomilla L. Rothenhaus hinter dem Maierhofs, wo der Getreideschober stand 26. Juni 1851. Beim Eidlitzer Busch 15. Juli 1855 (A. Roth).

Chrysanthemum Leucanthemum L. Auf Rothenhauser Wiesen Mai 1843 (A. Roth).

Parthenium Pers. Rothenhauser Park 14. Juli 1843. Auf der Burgruine Schönburg bei Klösterle 10. Juli 1850 (A. Roth).

corymbosum L. Im Rothenhauser Park und Waldrevier Juli 1843 (A. Roth).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Reichenbach Heinrich
Gottlieb Ludwig

Artikel/Article: Ueber drei neu aufgestellte
Labiaten-Gattungen. 159-161