

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Ökonomen, Forstmänner,
Ärzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 18. Juni 1857. VII. Jahrgang. № 25.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Thlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Innerste die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Aroideen-Fragmente. Von H. Schott. — *Viola Jooi*. Von Janka.
— Ueber *Androsace Packeri*. Von Pacher. — Pflanzen-Verzeichniss.
Von Roth. — Personsnotizen. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

Aroideen-Fragmente.

Skizziert von H. Schott.

Philodendron (Glossophyllum) macroglossum.
Lamina fol. ex obverso-oblongo-lingulata, basi fere truncata, angulis rotundatis, apice subsensim arcuatim angustata, breviter cuspidata, 1½ ped. longa, basi pollices 2, supra medium magis apicem versus 4½ pollices latitudine metiens. Costa crassiuscula in cuspidem fere usque procurrentes. Venae ralde remotae, utrinque 5—6, dextrae sinistris vero approximatae, omnes basi patentissimae, marginem versus arcuatae. — Caracas. (Reichenb. f. commun.)

Philodendron (Oligophlebiun) Reichenbachianum. *Lamina fol. lobato-hastata, basi apertissime sinuata, lobo terminali late-lineari-obverse-oblongo, apice arcuatim subsensimque in cuspidem eix longulum angustato; lobis basilaribus fere horizontalibus l. parum retrospectantibus, oblongis, leviter sursum curvis, apice rotundatis, triplo quadruplo brevioribus, linea ½ ellipsoes cum antico extus confluentibus. Costa apice deliquescentia. Venae (in tota lamina) utrinque solitaria, basilaris, costulis loborum posticorum deliquescentibus approximata, tenuis. Venulae densissimae. — Caracas. (Reichenb. f. comm.)*

Monstera pinnatipartita. *Foli lamina ambitu oblongo-ovala, pinnatipartita, basi rotundato-truncata, apice arcuatim-obtusata, partitionibus lateraliibus approximatis. laminae portione*

angustia secus costam junctis, sinu angusto, basi rotundato, distinctis, apice subtruncato latere superiore subacutatis; unius ejusdemque lateris angustioribus, binerviis, oppositi lateris duplo latioribus quadrimereiis, omnibus fere a basi ad apicem usque aequilatis; partitione terminali trapeziformi, basi cuneata, apice abrupte subrectilineo-acutata, apiculo brevissimo aucta. Costa crassa, in apiculum excurrentis. Venae nervis subparallelae, venulis varie anastomosantibus comitatiae, areolas irregulares majusculas formantibus. — *Caracas (Reichenb. f. comm.)*

Anthurium subtrilobum. Folii lamina sinu amplio rotundato (petiolari) subtrilobo-cordata, lobo terminali subaequilato, (12—13 poll. longo, 5—6 poll. lato), apice arcuatim obtusato, cuspidulato, lobis basilaribus (5 poll. longis, 4 poll. latis), extus lateraliter protensis, divergentibus, intus semireniformibus, apice rotundato retro spectantibus, antico plus duplo bretoribus. Costa crassissima. Venae (l. nervi) lobi antici sub-5, remotae, patentes, in pseudoneurum margini approximatum confluentes; interlobares solitariae, magis aperte patentes, (interdum quasi lobum e lamina proferentes); lobarum posticorum sub-5, inferiores l. interiores rectiusculae, reliquae apice sursum (lobum anticum versus) arcuatae, omnes inferne in costulam ad medium sinum (petiolarem) denudatam conjunctae, exceptis extimis 2bus in pseudoneurum margini proximum cum illo lobi antici continuum apice confluentes. — *Caracas (Reichenb. f. dd.).*

Schönsbrunn, 3. Juni 1857.

Viola (*Nominium*) Joo! Janka.

Von Victor v. Janka.

V. glaberrima pruinosa-glanca; rhizoma horizontale, flavescentia; folia subcoriacea oblongo-vel ovato-cordata opice obtusiuscula, margine subserrato-crenata. Pedicelli numerosi recti, superne declinati, medio vibranteolati: bracteolae lanceolato-lineares 5—8.3 mm. longae 0.7 mm. latae acutae l. acuminatae integerrimae l. denticulatae. Calyxis lobi oblongi obtusi. Corolla lilacina fragrantissima; petala lateralia intus papilloso-barbata; calcar uncatum. Capsula trigona acuta glaberrima pendula: valvae dorso maculis dilute kermesinis notatae.

Synon. Viola sciaphila Joo!

Habitat in Transsylvaniae collibus gypsaceo-cretaceis ad pagum Kolos-Monostor versus Bukk pr. Claudiopolim sitis. Floret Aprili; fructiferam legi 17. Maii 1855 (ibidem occurrit etiam elegantissimus Thymus pulchellus C. A. Meyer).

Anmerkung. Eine der von mir beschriebenen Pflanze sehr ähnliche, vielleicht mit derselben identische *Viola* wächst auch in der Thorda'er Kluft auf Kalkfelsen. Diese liegt mir gegenwärtig nicht vor; daher ich einstweilen nur diess bemerke.

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische
Botanische Zeitschrift – Plant Systematics

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroidien-Fragmente. 197-
198