

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Aerzte, Apotheker und Techniker.

---

Wien, 18. Juni 1857. VII. Jahrgang. N<sup>o</sup> 25.

---

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 40 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

---

Inhalt: Aroideen-Fragmente, Von H. Schott. — *Viola Jooi*, Von Janka. — Ueber *Androsace Pacheri*, Von Pacher. — Pflanzen-Verzeichniss, Von Roth. — Personalnotizen. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

---

## Aroideen-Fragmente.

Skizzirt von H. Schott.

*Philodendron (Glossophyllum) macroglossum*. Lamina fol. ex obverso-oblongo-lingulata, basi fere truncata, angulis rotundatis, apice subsensim arcuatim angustata, breviter-cuspidata, 1 $\frac{3}{4}$  ped. longa, basi pollices 2, supra medium magis apicem versus 4 $\frac{1}{2}$  pollices latitudine metiens. Costa crassiuscula in cuspidem fere usque procurrens. Venae valde remotae, utrinque 5–6, dextrae sinistris vero approximatae, omnes basi patentissimae, marginem versus arcuatae. — Caracas. (Reichenb. f. commun.)

*Philodendron (Oligophlebium) Reichenbachianum*. Lamina fol. lobato-hastata, basi apertissime sinuata, lobo terminali late-lineari-obverse-oblongo, apice arcuatim subsensim-que in cuspidem vix longulum angustato; lobis basilaribus fere horizontalibus l. parum retrospectantibus, oblongis, leviter sursum curvis, apice rotundatis, triplo quadruplo brevioribus, linea  $\frac{1}{4}$  ellipticos cum antico extus confluentibus. Costa apice deliquescens. Venae (in tota lamina) utrinque solitaria, basilaris, costulis loborum posteriorum deliquescentibus approximata, tenuis. Venulae densissimae. — Caracas. (Reichenb. f. comm.)

*Monstera pinnatipartita*. Folia lamina ambitu oblongo-ovata, pinnatipartita, basi rotundato-truncata, apice arcuatim-obtusata, partitionibus lateralibus approximatis, laminae portione

*angusta secus costam junctis, sinu angusto, basi rotundato, distinctis, apice subtruncato latere superiore subacutatis; unius ejusdemque lateris angustioribus, binerviis, oppositi lateris duplo latioribus quadrinerviis, omnibus fere a basi ad apicem usque aequilatis; partitione terminali trapeziformi, basi cuneata, apice abrupte subrectilineo-acutata, apiculo brevissimo aucta. Costa crassa, in apiculum excurrent. Venae nervis subparallelas, venulis varie anastomosantibus comitatae, areolas irregulares majusculas formantibus. — Caracas (Reichenb. f. comm.)*

*Anthurium subtrilobum.* Folii lamina sinu amplo rotundato (petiolari) subtrilobo-cordata, lobo terminali subaequilato, (12—13 poll. longo, 5—6 poll. lato), apice arcuatim obtusato, cuspidulato, lobis basilaribus (5 poll. longis, 4 poll. latis), extus lateraliter protensis, divergentibus, intus semireniformibus, apice rotundato retro spectantibus, antico plus duplo brevioribus. Costa crassiuscula. Venae (l. nervi) lobi antici sub-5, remotae, patentes, in pseudoneurum margini approximatum confluentes; interlobares solitariae, magis aperte patentes, (interdum quasi lobum e lamina proferentes); lorum posteriorum sub-5, inferiores l. interiores rectiusculae, reliquae apice sursum (lobum anticum versus) arcuatae, omnes inferne in costulam ad medium sinum (petiolare) denuadatam conjunctae, exceptis extimis 2bus in pseudoneurum margini proximum cum illo lobi antici continuum apice confluentes. — Caracas (Reichenb. f. dd.).

Schönbrunn, 5. Juni 1857.

## ***Viola* (Nominium) *Jooi* Janka.**

Von Victor v. Janka.

*V. glaberrima* pruinoso-glaucā; rhizoma horizontale, flavescens; folia subcoriacea oblongo-vel ovato-cordata apice obtusiuscula, margine subserrato-crenata. Pedicelli numerosi recti, superne declinati, medio bibracteolati: bracteolae lanceolato-lineares 5—8.5 mm. longae 0.7 mm. latae acutae l. acuminatae integerrimae l. denticulatae. Calycis lobi oblongi obtusi. Corolla lilacina fragrantissima; petala lateralia intus papilloso-barbata; calcar uncatum. Capsula trigona acuta glaberrima pendula: calvae dorso maculis dilute kermesinis notatae.

Synon. *Viola sciaphila* Joo!

Habitat in Transylvanicae collibus gypsaceo-cretaceis ad pagum Kolos-Monostor versus Bukk pr. Claudiopolim sitis. Floret Aprilis; fructiferam legi 17. Maji 1855 (ibidem occurrit etiam elegantissimus *Thymus pulchellus* C. A. Meyer).

Anmerkung. Eine der von mir beschriebenen Pflanze sehr ähnliche, vielleicht mit derselben identische *Viola* wächst auch in der Thorda'er Kluft auf Kalkfelsen. Diese liegt mir gegenwärtig nicht vor; daher ich einstweilen nur diess bemerke.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische  
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische  
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Fragmente. 197-  
198