

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 16. Juli 1857. VII. Jahrgang. N^o 29.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempt., die frei durch die Post bezogen werden sollen, hies in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Pflanzenskizzen. Von H. Schott u. Kotschy. — Neue Arten aus Ungarn. Von Dr. Wolfner. — Pflanzen-Verzeichniss. Von Roth. — Correspondenz Athen. Von Landerer. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

Pflanzenskizzen.

Von H. Schott und Kotschy.

Alyssum argyrophyllum m. Caudex ramosus, ramis brevibus ramulosis, humifusus, densissime albido-lepidotis. Folia approximata, minuta, spatulato-obovata, densissime albido-lepidota, in petiolulum brevem basi attenuata. Racemus multi- et densiflorus, floribus minutis. Pedicelli calycis longitudinem superantes, tandem subelongati. Sepala lepidota, primum albicantia, demum flaticantia; calcaria basi soccata, placentaria pauloproductiora, omnia apice barbulata. Petala flava, ungue lamina duplo longiore, (opposita 2 ungue apice dilatata). Stamina longiora vix e fauce emergentia; filamentum calcarium subulata, interne ad basin processu obtusiuscule-subulato, dimidium fere filamentum metiente, ovario accumbente aucta; placentarium unilateraliter, calcam versus, ad medium usque dilatata, ibique obtuse-unidentata. Ovarium minutum, Stylus crassus, cylindricus, ovario triplo longior. Stigma depresso-hemisphaericum, stylo paulo latius. Silicula compressa; elliptica, basi repentino-angustata, apice leviter-angustata, emarginato-truncata, sparse stellato-lepidota, stylo dimidio breviori coronata. Semen unicum, ex apice placentae pendulum, funiculo paulo breviori affixum, compressum, colore heliolum, margine angustissimo cinctum.

Umbilicus (Rosularia) pallidus. Totus dense glanduloso-pilosus. Folia rosularum carnosae, lingulato-linearis,

antice planiuscula, postice convexa, apice ex triangulari breviter-subacuta; caulina abbreviata, approximata subadpressa, quam inferiora magis acutata. Rami l. caules floriferi laterales, infra rosulas exorti. Cyma laxiflora, floribus 10–16. Calycis sepala ima basi tantum connata, lineari-lanceolata, acuta, ceterum erecta, pedicello centrali breviora, lateralibus longiora. Corollae pallide-flavescentis, calyce duplo longioris partitiones extra calycem patentes, acuminato-lanceolatae, dorso costa glanduloso-puberulae. virente percursae, ceterum glabrae. Filamenta subulata, sepalis opposita fere ad apicem corollae tubi, reliqua paulo altius adnata. Squamulae hypogynae erectae, rotundato-truncatae, breves, latae, luteae.

Habit. in Tauro Ciliciae, ad fodinas Bulgar-magara 7000–7500 ped.

Erigeron (Trimorphaea) olympicus. Rhizoma ramosum. Caulis sub-5-pollicaris, subsimplex l. ramulosus pleiocephalus, horizontaliter-sparse-pilosus. Folia infima lineari-lanceolata, in petiolum praelongum sensim angustata, apice acuta, utriusque praecipue in costa et marginibus pilosa; superiora linearia, patentissima, pariter pilosa. Involucrum polyphyllum, phyllis omnibus strictiuscule erectis, dorso et marginibus pilosis, apice acuminatis. Flores foeminei exteriores ligulati, ligulis erectis! phyllis intimis viz multo-longioribus, angustissimis.

Habit. in Olympo Bithyniae.

Observ. Differt primo intuitu foliorum angustiae et ligulis semper erectis.

Schönbrunn, 3. Juli 1837.

Zwei neue Pflanzenarten aus Ungarn.

Von Dr. W. Wolfner.

1. *Ornithogalum brevistylum* Wolfner.

O. racemo elongato, multifloro; pedunculis patentibus, fructiferis scapo adpressis; bracteis ovatis subito in acumen contractis; stylo staminibus duplo vel subtriplo brevioribus; foliis linearibus canaliculatis. — Flores candidi ovata viridi dorsali. — 2. Juni, Juli. — *Hab. in agris et campis prope Szemlak in Hungaria.*

Bulbus subrotundus, truncatus (1–1½" diam.). Scapus glaucus, teres, crassitie pennae anserinae (2–3½ ped. cum racemo). Folia glauca superne flaccida et emaricida valde canaliculata 1–2½' long. 3–6" lat.). Racemus densus 40–80 flor. (6–12" long.) Pedicelli glaucae floriferi erecto-patentes 8–12" long.), fructiferi stricti, scapo adpressi 14–20" long.). Bractee subito in acumen contractae, albae, dorso virescentes, primum pedicellos superantes, serius iisdem duplo vel triplo

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm,
Kotschy Karl Georg Theodor

Artikel/Article: Pflanzenskizzen. 229-230