

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 20. Aug. 1857. VII. Jahrgang. **N^o 34.**

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 3 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 3 kr. C. M.

Inhalt: Aroideenskizzen. Von Schott. — Reise flora aus Südkroatien. Von Dr. Schlosser. — Pflanzenverzeichniss. Von Roth. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

Aroideen-Skizzen.

Von Schott.

Die zahlreichsten Gattungen der Aroideen scheinen Amerika eigen zu sein. *Philodendron* zählt über Einhundert Arten und *Anthurium* übertrifft die eben genannte Gattung weit über die Hälfte der Hundert zu Hundert. Wir diagnosiren hier einige noch nicht benannte und daher nicht bekannt gewordene Arten, welche sich in verschiedenen Herbarien, so uns zugekommen, vorfinden.

Anthurium Chamissonis S. Caudex, folia, petiolus Geniculum breve. Lamina fol. oblongo-lineari-lanceolata, basi rotundata, apice subacuminata; costa venis remotis venastris interpositis, inferne in marginem excurrentibus, ceterum in pseudoneurum apiculum subpetens, a margine distans anastomosantibus. Pedunculus Spadix teretiusculus, strictiusculus, spatha paululo longior, stipite $\frac{1}{4}$ rhacheos metiente sustentus. Spatha remota, sessilis, sulco tantum pedunculo decurrens. Brasilia.

Anthurium Bredemeyeri S. Caudex assurgens. Folia Petiolus lamina paulo brevior. Geniculum longulum. Lamina fol. elongato-lanceolata, basi breviter-cuneata, apice longe-acuminata; costa venis remotis, (venastris interpositis 1–2) in pseudoneurum apiculum non petens, a margine haud calde remotum, excurrentibus. Pedunculus folio brevior. Spadix gracilis, spatha paulo l. duplo longior, breviter-stipitatus. Spatha remota, sessilis, pedunculo non decurrens. — Caracas.

Anthurium repandum S. Folia digitata. Petiolus longus, (16-pollices circiter). Foliola l. partitiones 11, elongato

lineari-lanceolatae, ad imam basin usque sensim sensimque angustatae, margine medio irregulariter l. utrinque l. unilateraliter dilatatae et hinc repandae, apice subabrupte-angustatae et cuspidate lanceolato-lineariter terminatae elongato; partitione media petioli longitudine Pedunculus petiolo brevior. Spatha lanceolato-linearis, sub 9-pollicaris. Spadix tenuis, sessilis. — Nova-Granata. (Purdie in Herb. Hook).

Schönbrunn, 7. August 1857.

Reiseflora aus Süd-Kroatien.

Von Dr. Schlosser.

(Fortsetzung.)

Am 28. Juni wurde ein Ausflug in die nächste Umgebung von Gospić gemacht und hierbei *Scutellaria peregrina* L., *Convolvulus sylvaticus* WK., *Lactuca sagittata* WK., *Ribes alpinum* L., *Rhamnus saxatilis* L., *Prunus Chamaecerasus* L., *Asparagus tenuifolius* Lam., *Verbascum floccosum* WK. und *V. pulcherrimum* Schrad; ferner *Bromus velutinus* Schr., *Laserpitium verticillatum* WK., *Agropyrum glaucum* Rchb., *Campanula pyramidalis* L. u. s. w. theils eingesammelt, theils im Reise-Tagebuche vorgemerkt.

Der nächstfolgende Tag wurde zu einem Ausfluge nach Karlo-pago verwendet, wo unterwegs nebst vielen andern *Senecio rupestris* WK., *Coronilla Emerus* L. und *C. montana* Scop., *Cirsium eriophorum* Scop., *Senecio umbrosus* WK. gesehen und einige Exemplare vom *Hieracium Lawsonii* Vill. und *H. pallescens* WK. mitgenommen wurden.

Die schroffen Felsen des Sladovac gegen Karlo-pago hin lieferten: *Ruta dicaricata* Ten., *Teucrium supinum* Jacq., *Inula squarrosa* L., *Campanula pyramidalis* L., *C. graminifolia* WK., *C. muralis* Portschl., *C. garganica* Ten., *Calamintha alba* WK., *Scorodonia Arduini* Rchb., *Bupleurum Odontites* L. und *B. aristatum* Bartl., *Corydalis ochroleuca* Koch., *Crepis hispidissima* Bartl., *Leontodon Villarsii* Lois., *Anthyllis atropurpurea* Schl. et Vuh., *Inula hirta* L., *I. candida* Cass., *Carduus candicans* WK., *Silene Saxifraga* L., *Cerastium grandiflorum* WK., *Dorycnium sabaudum* Rchb., *Stachys subcrenata* Vis., *Galium purpureum* L., *Digitalis laevigata* WK., *Daphne alpina* L., *Pleurospermum maritimum* Rchb., *Marrubium candidissimum* Hart. und *M. hirsutum* W., *Euphorbia Wulfenii* Hopp. und *E. Myrsinites* L., beide leider nur in unfruchtbaren Trieben und Sprossen, — ferner *Alyssum medium* Koch., *Camphorosma monspeliaca* L. und *Clematis Viticella* L., dagegen am Meeresufer selbst *Hordeum pseudo-maritimum* Tapp., *Nomordica Elaterium* L., *Drypis pinosa* L. u. s. w. Am Rückwege wurde auf Aeckern bei Ostaria *Bunium montanum* Koch. und auf Grastrieten daselbst *Inula hirta* L. und *Campanula tenuifolia* gesammelt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen- Skizzen 269-270