

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ
für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 10. Sept. 1857. VII. Jahrgang. N° 37.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag
Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Thlr. 20 Sgr. jährlich und zwar
für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Oester-
reichischen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlun-
gen des In- und Auslandes. Inscrete die ganze Petitzeile 3 kr. C. M.

Inhalt: Aroideen-Skizzen. Von Schott. — Besteigung des Hochgollings.
Von Fr. R. v. Grimburg. — Correspondenz. Agram. Von Vukotinovic.
— Personal-Notizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Mittheilungen.

Aroideen-Skizzen.

Von H. Schott.

Mehrere *Anthuria*, welche ich noch in Herbarien vorfand,
scheinen ebenfalls nicht benannt und beschrieben zu sein. Ich führe
deshalb hier einige Species auf, welche ich für neu zu halten ge-
bührtet bin.

Anthurium quindiuense. *Petioli longi, robustiores.*
Lamina fol. ex triangulari-cordiformis, apice acuminato-acutata;
lobi basilaris semi-oblongo-ovati, sinus apertissimum operientes;
nervi interlobariorum in marginem excurrentes, tenis tertius costae,
*(a basi) pseudoneurum proferrentibus. Pedunculus longus subro-
bustus. Spatha elongato-elliptica, erecta, basi apiceque repentinno-
angustata, haud decurrentis, spadicis basin oblique ambiens. Spadix
breviter l. brevissime stipitatus, subcylindricus, apice obtusus,*
spatha paulo brevior, 4 lineas crassus. — *Nova-Granata* (Holton
in Herb. Hook.).

Ob s. Laminae fol. latitudo, castam aequat.

Anthurium fraternum. *Petiolum firmulum, longus. La-*
mina fol. oblongo-ovata, basi profunde cordata, lobis semiocvalis,
tina aperto l. subaperto, apice sensim acuminate;
nervis interlobariorum in pseudoneurum productis. Pedunculus elongatus, petiolum
aequans l. multo longior. Spatha oblongo-ovata, erecta, apice
cuspidato-apiculata, basi amplexa, spadice sublongior. Spadix
breviter-l. brevissime-stipitatus, subcylindricus, apice obtusus, 3
lineas crassus.

Nova-Granata St. Marta (Purdie in Herb. Hook.).

Ob s. Costa latitudinem folii laminas multo superat.

Anthurium ornatum. Petiolus longus, costam superans. Lamina fol. oblongo-ovata, ampla, basi profunde-cordata, lobis basilaribus semiocrotis, distantibus, sinum apertum relinquens, apice extrosum-arcuato-angustata, cuspidulo brevi aucta; verticis interlobariis in marginem excurrentibus 1. in pseudoneurum prolongatis. Pedunculus elongatus. Spatha late-ovata-elliptica, erecta, apicem obtusum versus sensim ex arcuata angustata et apiculata, basi abrupte rotundata, pedunculo ima basi parum decurrentia. Spadix brevissime-stipitatus, cylindricus. Filamenta longe-exserta. Ovaria vertice attenuato sepala superantia — Venezuela. (Linden et Fendler in Herb. H. o. h.).

Anthurium consimile. Petiolus longus. Lamina fol. ex ovato-rotundata, basi modice-cordata, lobis rotundatis, distantibus, sinum in fundo rotundatum excurrentibus, apice cuspidulo lanceolata aucta; nervis interlobariis cum proximis inferioribus in pseudoneurum longum continuum procurrentibus. Pedunculus elongatus crassulus. Spatha lata, oblonga, concolorata, erecta, in cuspidem elongatum, subrepentino-angustata, spadice 4. parte longior. Spadix breviter-stipitatus, cylindricus, absque stipite 5 pollices longus, semipollucem crassus. Peruvia subandina (Poepp. in Herb. C. Vind. absque denominatione).

Schönbühn, 28. August 1857.

Besteigung des Hochgolling's.

Von Franz Ritter v. Grimbürg.

Schon seit einer Reihe von Jahren, während welcher ich die hervorragendsten Kuppen Oberösterreichs und Obersteiermarks, wie den Gjaidstein am Karls-Eisselde des Dachsteingebirges, den grossen Priel bei Hintersöder nächst Windischgarsten, den grossen Buchstein bei St. Gallen, den Hochschwab, den Zeyritzampl nebst vielen anderen zu besteigen, und in botanischer Beziehung vielfach anzubuten Gelegenheit hatte, war es vorzüglich jener mächtige, nordwestliche Gebirgsstock von Obersteiermark, unter dem geographischen Namen der „Sölkeralpen“ begriffen, dessen Granitpyramiden so sehr gegen die in mannigfachen Umrissen gestalteten Kalkgebirge in eigenthümlicher Form und Färbung contrastirten, der von jedem Höhenpunkte aus stets meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog.

Endlich sollte sich mein so langer und so sehnsuchtiv voll gehegter Wunsch in vergangenem Jahre realisiren!

Ein Blick auf die Karte liess mich Schladming im westlichen Ennstale sogleich als den geeignetsten und nächsten Ausgangspunkt zur Besteigung des Hochgolling's (oder hohen Gailing's, 5045 Fuss a. d. M.) erkennen.

Unser Reiseplan, (ich unternahm die Excursion in Begleitung meines Sohnes und Neffen Carl und Rudolf v. Grimbürg,) war also schnell gefasst, die nötigen Zurüstungen, bestehend in etwas Wäsche, starken Bergschuhen, einem handfesten Bergstocke, Compass, Stearinkerzen, ledernem Trinkschiffchen und eigends zum Einlegen von Pflanzen construirten, mit Tragriemen verschenen Mappen, dann

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zeologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift – Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 293-294