

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ
für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Ärzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 17. Sept. 1857. VII. Jahrgang. N° 38.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man kann es auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Thlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, bzw. in der Seli-
del-Paschen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlun-
gen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 8 kr. C. M.

Inhalt: Aroideen-Skizzen. Von Schott. — Besteigung des Hochgollings.
Von Fr. R. v. Grimburg. — Kalederien. Von Dr. Schur. — Personal-
Notizen. — Vervine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarische Notizen. —
Mittheilung.

Aroideen-Skizzen.

Von H. Schott.

*Anthurium Guildingii. Petiolus costa fol. brevior, se-
miterres. Lamina fol. ambitu orata-oblonga, basi profunde-cordata,
lobis oblique-semi-oblongo-ovatis, rotundatis, remotissimis, sinum
½—⅓ costae profundum relinquenter, apice leviter-arcuatim
sensimque angustata, cuspide lanceolato-acuminato, longo, aucta;
costa laminae maximam latitudinem (circa medianam laminam) dimidio
superante; nervis pedatis, extimis (in sinu) anguste-marginatis,
margine in geniculum canaliculatum? defluente, interlobaris basi
patentissimis, calde-arcuatim in pseudoneurum a margine valde-
remotum excurrentibus, proximis inferioribus cum margine confluen-
tibus; venis primariis costae patentissimis. Pedunculus erectus,
petiolo longior. Spatha lanceolata, palenter-erectiuscula, basi pe-
dunculo breviter-decurrens, apice cuspidato-acuminata. Spadix
myosuroides, brevis, spathae longior, inferne stipite longulo sus-
fultus.*

Hab. St. Vincent. (GUILD. in Herb. Hook.).

*Anthurium concinnum. Petiol. . . . Geniculum lon-
gum, antice canaliculatum. Lamina fol. late-triangulare-ovata, basi
profunde-cordata, rigida, lobis (⅓ circiter costae) suboblique semi-
ovatis, distantibus, retrorsis, sinum subaequatum in fundo rotun-
datum amplexantibus, apicem versus arcuatim angustata, cuspide
lanceolato-languido terminata; costa laminae maximam latitudinem
(in media lamina) paulo superante; nervis pedatis (11—13), exti-
mis in geniculi canaliculo quasi peltatum confluentibus, basi denu-*

datis, interlobariis arcuato-erectis, pseudoneurum internum a margine valde remotum (inter costam et marginem fere medium), a basi ad apicem leviter-arcuatum constituentibus, proximis inferioribus aperte-potentibus, arcuatis pseudoneurum externum margini approximatum producentibus, reliquis omnibus marginem varia altitudine potentibus; venis costalibus aperte-potentibus. Pedunculus longus. Spatha anguste-lanceolata, acuminata, patens, basi ablique amplexa, haud decurrentis. Spadix tereti-conoideus, spatham subaequans, basi brevissime-stipitatus. Ovaria conice-prominula.

Hab. St. Vincent. (Guild. in Herb. Hook.).

Anthurium bogotense Lamina fol. late ex ovato-triangulari cordata, lobis solidis, rotundatis, subincumbentibus, dimidiata fere costam metientibus, sinus latum rotundatum ad petioli insertionem relinquenteribus, apice subsensim acutato; costa laminae latitudinem maximam (infra petioli insertionem) plus duplo superante; nervis pedatis, extimis busi longe-denudatis, interlobaris erecto-potentibus, in marginem excurrentibus; venis costalibus potentibus cum nervo interlobari non parallelis, quartis a basi pseudoneurum apicalem constituentibus. Pedunculus . . . Spatha late linearis-lanceolata, concavula, basi antice pedunculo brevi spatio decurrentis, apice acuminata, 6—7 pollices longae, $\frac{1}{4}$ pollicis lata. Spadix cylindricus, obtusus, 9 pollices longus, 8—9 lineas crassus, ovarii prominulis onustus, stipite brevi suffultus.

Hab. in Nora-Granata (Bogota in montib. ad orient. H. Olton. in Herb. Hook.).

Schönbrunn, 5. September 1857.

Besteigung des Hochgolling's.

Von Franz Ritter v. Grimburg.

(Fortsetzung).

Nachdem man in Mitterndorf die Hauptstrasse verlassen, und das Thal in südöstlicher Richtung durchschnitten, gelangt man in ungefähr einer kleinen Stunde an den schmalen Eingang des Passes. Die grossartigsten Felsenpartien in fürchterlichen Wänden übereinander gehürmt scheinen den Schritt des Wanderers zu hemmen — gleichwohl schlängelt sich eine Weile ganz oben eine schmale Fahrstrasse, begleitet von einem ansehnlichen, anfangs in sanftem Gelispel dahin schleichenden, zuletzt aber in wilden Katakakten brausend abstürzenden Bach, durch diese schauerliche Wildniss.

An dem von Erlengebüsch bescharteten Ufer dieses Baches fanden wir *Ranunculus Liugua* L. in vollster Blüthe, die erste Pflanze, die wir als gute Prise in unsere Mappen aufnahmen.

Da, wo der Bach, als wahrer Wildbach im Sturze dem Ennstale zuzueilen beginnt, zieht sich die Strasse im Gegenthale aufwärts, und wird zur eigentlichen Hochstrasse.

Auf der Höhe sammelte mein Sohn *Leptura eirens* L., *Toxotus quadrimaculatus* L. und *Pachyta virginica* L., welche in Menge auf

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische
Botanische Zeitschrift – Plant Systematics

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich
Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 301-302