

Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 17. Sept. 1857. VII. Jahrgang. № 38.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 3 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempt., die frei durch die Post bezogen werden sollen, bias in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Aroideen-Skizzen. Von Schott. — Besteigung des Hochgollings. Von Fr. R. v. Grimbürg. — Koelerien. Von Dr. Schur. — Personal-Notizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarische Notizen. — Mittheilung.

Aroideen-Skizzen.

Von H. Schott.

Anthurium Guildingii. Petiolus costa fol. brevior, semiteres. Lamina fol. ambitu ovato-oblonga, basi profunde-cordata, lobis oblique-semi-oblongo-ovatis, rotundatis, remotiusculis, sinum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ costae profundum relinquuntibus, apice leviter-arcuatim sensimque angustata, cuspidate lanceolato-acuminato, longo, aucta; costa laminae maximam latitudinem (circa mediam laminam) dimidio superante; nervis pedatis, extimis (in sinu) anguste-marginatis, margine in geniculum canaliculatum? defluente, interlobariis basi patentissimis, valde-arcuatim in pseudoneurium a margine valde-remotum excurrentibus, proximis inferioribus cum margine confluentibus; venis primariis costae patentissimis. Pedunculus erectus, petiolo longior. Spatha lanceolata, patenter-erectiuscula, basi pedunculo breviter-decurrentis, apice cuspidato-acuminata. Spadix myosuroideus, brevis, spathae longior, inferne stipite longulo suffultus.

Hab. St. Vincent. (Guild. in Herb. Hook.).

Anthurium concinnum. Petiol. . . . Geniculum longum, antice canaliculatum. Lamina fol. late-triangulare-ovata, basi profunde-cordata, rigida, lobis ($\frac{1}{2}$ circiter costae) suboblique semi-ovatis, distantibus, retrorsis, sinum subaequilatum in fundo rotundatum amplexantibus, apicem versus arcuatim angustata, cuspidate lanceolato longulo terminata; costa laminae maximam latitudinem (in media lamina) paulo superante; nervis pedatis (11—13), extimis in geniculi canaliculo quasi pellatim confluentibus, basi denum-

datis, interlobariis arcuato-erectis, pseudoneurum internum a margine valde remotum (inter costam et marginem fere medium), a basi ad apicem leviter-arcuatum constituentibus, proximis inferioribus aperte-patentibus, arcuatis pseudoneurum externum margini approximatum producentibus, reliquis omnibus marginem varia altitudine patentibus; venis costalibus aperte-patentibus. Pedunculus longus. Spatha anguste-lanceolata, acuminata, patens, basi oblique amplexa, haud decurrens. Spadix tereti-conoideus, spatham subaequans, basi brevissime-stipitatus. Ovaria conice-prominula.

Hab. St. Vincent. (Guild. in Herb. Hook.).

Anthurium bogotense *Lamina fol. late ex ovato-triangulari cordata, lobis validis, rotundatis, subincumbentibus, dimidiam fere costam metientibus, sinum latum rotundatum ad petioli insertionem relinquuntibus, apice subsensim acutata; costa laminae latitudinem maximam (infra petioli insertionem) plus duplo superante; nervis pedatis, extimis basi longe-derudatis, interlobariis erecto-patentibus, in marginem excurrentibus; venis costalibus patentibus cum nervo interlobari non parallelis, quartis a basi pseudoneurum apicalem constituentibus. Pedunculus Spatha late lineari-lanceolata, concavula, basi antice pedunculo brevi spatio decurrens, apice acuminata, 6—7 pollices longae, $\frac{3}{4}$ pollicis lata. Spadix cylindricus, obtusus, 9 pollices longus, 8—9 lineas crassus, ovarii prominulis onustus, stipite brevi suffultus.*

Hab. in Nova-Granata (Bogota in montib. ad orient. Holton. in Herb. Hook.).

Schönbrunn, 5. September 1857.

Besteigung des Hochgolling's.

Von Franz Ritter v. Grimburg.

(Fortsetzung).

Nachdem man in Mitterndorf die Hauptstrasse verlassen, und das Thal in südöstlicher Richtung durchschnitten, gelangt man in ungefähr einer kleinen Stunde an den schmalen Eingang des Passes. Die grossartigsten Felsenpartien in fürchterlichen Wänden übereinander gethürmt scheinen den Schritt des Wanderers zu hemmen — gleichwohl schlängelt sich eine Weile ganz oben eine schmale Fahrstrasse, begleitet von einem ansehnlichen, anfangs in sanftem Gelspel dahin schleichenden, zuletzt aber in wilden Katarakten brausend abstürzenden Bache, durch diese schauerliche Wildniss.

An dem von Erlengebüschen beschatteten Ufer dieses Baches fanden wir *Ranunculus Lingua* L. in vollster Blüthe, die erste Pflanze, die wir als gute Prise in unsere Mappen aufnahmen.

Da, wo der Bach, als wahrer Wildbach im Sturze dem Ennsthale zuzueilen beginnt, zieht sich die Strasse im Gegentheile aufwärts, und wird zur eigentlichen Hochstrasse.

Auf der Höhe sammelte mein Sohn *Leptura virens* L., *Toxotus quadrimaculatus* L. und *Pachyta virginica* L., welche in Menge auf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich
Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 301-302