

Oesterreichisches

Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für
Botanik und Botaniker, Gärtner, Ökonomen, Forstmänner,
Ärzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 5. Nov. 1857. VII. Jahrgang. № 45.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag
Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar
für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, bloß in der Sei-
genischen Buchhandlung am Graben in Wien; außerdem bei allen Buchhandlun-
gen des In- und Auslandes, ferner die ganze Petzcella & Ar. C. M.

Inhalt: *Aroideen-Skizzen*. Von Schott. — Siebenbürgische Characeen.
Von Dr. Schur. — Excursion in die Karpathen. Von Uechtritz. —
Personal-Notizen. — 33. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte.
— Literarisches

Aroideen-Skizzen.

Von H. Schott.

Arisaema eminens. Tuber oblongum, saepe diametro
ultra 5 pollicari, trionem lateraliter proferrens. Foliū solita-
rium. Petiolus crassus (2—2½ pollicaris), bipedalis et ultra, sor-
dide ex fusco cibens, maculis transversis, irregularibus, pallidio-
tibus, rubro-einctis variegatus. Segmenta (3) omnia aequi-ansata,
rubro-marginata; intermedium ; lateralia valde-inaequi-
latera, 1½—2 pedes longa, 8 pollices lata, subtus pallidiora, latere
superiore dimidio angustiora, inferne rotundata, latere inferiore
semicordata, apice utrinque sensim acuminata, venis costalibus
subapproximatis. Pedunculus sere tenuis, maculatus, petiolo bre-
vior. Spatha rubro-violacea l. ex bruno-purpurans, albido-strinta,
in fauci fundo pallida; fauza aperta; lamina alter fornicate, basi
leviter-dilatata, late-oblongo-lanceolata, apice longissime acumi-
nato deflexo-propendens, extus medio dorso cibens, intus venarum
rete pallida pecta; tubo cylindroideo fuscido duplo circiter longior.
Spadix organis neutrī carens, spatha triente brevior, eis stipi-
tatuſ, fusiformis, subrepentino e sauce fili crassissimi, tunc
circumflexi ad instar protensus ac propendens (clava inferne
pallide-purpurans, superne cum filo fuscida). Processus antheri-
ferae longae, 3—4 antheriferae, antheris rima continua aperien-
tibus, non apiculatis. Ovaria breviter-stylata, sere astyla.

Habit. in Indiae orientalis prov. Sikkim. (H o o k. L.).

Schönbrunn, 24. October 1857.

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische
Botanische Zeitschrift – Plant Systematics

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich
Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 357