

Botanische Excursion in die Central-Karpathen.

Von R. v. Uechtritz.

(Fortsetzung.)

Am folgenden Tage brachen wir erst in den Nachmittagsstunden auf, da wir bis dahin mit dem Einlegen der gesammelten Pflanzen vollauf zu thun hatten. Unsere Pflanzenpaquettschickten wir über Djar nach Kásmark voraus, wir selbst aber gingen durch das Kupferschächtenthal und über den Skopapass über das Gebirge nach Rox, wo wir erst spät in der Nacht ankamen, da wir mit Sammeln viel Zeit verbraucht hatten. Die Vegetation des Kupferschächtenthales ist sehr ausgezeichnet und reichhaltig, und hat in vielen Stücken vor der des Thales von Koszielisko den Vorzug. Wir sammelten hier *Gentiana glacialis* in grosser Menge, *Cortusa Matthioli*, *Astragalus alpinus*, *Trifolium badium*, *Atragene alpina*, *Pedicularis Haquetii* Graf an dem Bachufer in Menge und von ansehnlicher Grösse, *Hieracium aurantiacum* roth und gelb, *H. aurantiaco-Pilosella* (selten), *Crepis grandiflora*, *Anthriscus sylvestris* β *alpestris* WGr. *Phleum Michelii*, *alpinum* etc. *Hypochaeris helvetica*, *Centaurea nigra*, *montana*, *Viola lutea*, *Senecio subalpinus*, *Erigeron alpinus*, *Cineraria aurantiaca* β *lanata* Koch (*C. capitata* W. & A. Fl. Carp.) *Avena carpathica*, *Trollius europaeus*, *Delphinium elatum*, *Carex aterrima*, *Polygonum viviparum* in Riesenexemplaren von der Grösse des mit ihnen zusammenwachsenden *P. Bistorta*, *Dianthus superbus* β *alpestris* (D. Wimmeri Wichura), *Anemone narcissiflora*, *Chrysanthemum rotundifolium*, *Doronicum austriacum*, *Neum Mutellina*, *Gentiana verna*, *Anthyllis Vulneraria* β *alpestris*, *Salix retusa*, *Carduus defloratus*, *Cerastium longirostre* Wicht. Beim Besteigen des Skops: *Silene acaulis*, *Dianthus glacialis*, *Dryas octopetala*, *Gnaphalium carpathicum*, *Agrostis alpina*, *Androsace villosa*, *Salix retusa*, *reticulata*, *Avena versicolor*, *Gaya simplex* (sehr gemein), *Ranunculus Thora* (selten), *Carex capillaris*, *frigida*, *atrata*, *Anemone alpina*, *Saxifraga hieracifolia* Wk. (selten), *androsacea*, *muscoidea*. Beim Herabsteigen: *Plantago montana*, *Myosotis alpestris*, *Soldanella*, *Ranunculus montanus*, *Sesleria caerulea*, *Androsace villosa*. Im Schächtengrunde nahmen wir auf: *Polemonium caeruleum*, *Stachys alpina*, *Cimicifuga foetida*, *Bellidiastrum Michelii*, *Saxifraga aizoon*, *Polygala amara*, *Trifolium badium*, *Cirsium Erisithales*, *Gypsophila repens*, *Chrysanthemum corymbosum* var. *hirtum*, *Scabiosa lucida*, *Rosa alpina*, *Euphorbia amygdaloides* und *E. Cyparissias*, deren Vorkommen in Voralpenwäldungen uns sehr überraschte. Im Drechselhäuschen steigt sie sogar bis auf die höchsten Felsen. — Von Rox gingen wir am andern Morgen nach dem nahegelegenen Kásmark, wo wir uns längere Zeit aufzuhalten gedachten. Auf den Wiesen bei Rox wächst *Gladiolus imbricatus* in Menge, ebenso *Gentiana Amarella*. Auf Ackerrainen *Asperula cynanchica*, *Potentilla canescens* Besser und unter dem Getreide *Silene gallica*.

Noch denselben Tag besuchten wir den östlich von der Stadt ganz nahe gelegenen Galgenberg, der uns eine reiche Ausbeute lieferte. *Aster Amellus*, *Draba nemoralis*, *Lavatera thuringiaca*, *Campanula glomerata*, *bononiensis*, *Astragalus Cicer*, *Cineraria campestris* (selten), *Hieracium echinoides* (sparsam), *Cytisus austriacus*, *C. biflorus*, *Thesium L. nophyllum*, *Phleum Boechmeri*, *Centaurea axillaris*, *Potentilla caulescens*, *Anthyllis Vulneraria*, *Seseli Libanotis*, *Bupleurum falcatum*, *Poterium Sanguisorba*, *Carduus hamulosus* WK., *Anthemis tinctoria*, *Gentiana cruciata*, *Euphorbia virgata*, *Rosa pimpinellifolia*, *Caucalis daveoides* und das prachtvolle *Linum flatum* werden hier auf einem kleinen Raume vereinigt gefunden. Von andern in die nächste Umgebung Kasmars unternehmenen Ausflügen war der in den etwa eine halbe Meile nordwestlich von der Stadt gelegenen lungen Wald der lohnendste. Hier sammelten wir *Adenophora suaveolens* in Menge, ebenso *Trifolium pannonicum*, eine prächtige Pflanze, *Hieracium racemosum* WK., *Achillea tanacetifolia*, *Gladiolus imbricatus*, *Pyrethrum corymbosum*, *Centaurea nigra* etc. Auffallend war es uns, hier mehrere Gewächse ganz in der Ebene anzutreffen, welche sonst gewöhnlich nur in subalpinen Gegenden gefunden werden, wie z. B. *Gentiana asclepiadea*, *Carduus personata*, *Stachys alpina*, *Cimicifuga foetida*, *Atragene alpina*, *Bupleurum longifolium*, *Pleurospermum austriacum* und *Crepis grandiflora*, welche letztere auf Ackerrainen am Waldrande in erstaunlicher Menge und Grösse vorkam.

(Fortsetzung folgt.)

Personalnotizen.

— Rudolf Siebeck, der Verfasser der »bildenden Gartenkunst«, des »Decameron« u. a. bisher Rathsgärtner in Leipzig, ist nach Wien übersiedelt, um sich ein grösseres Feld für seine Thätigkeit zu eröffnen.

— Dem bekannten Botaniker und Reisenden Warszewicz, Obergärtner am botanischen Garten in Krakau, ist kürzlich von einer Londoner Privat-Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften die Aufforderung zugekommen, eine botanische Reise nach der Insel Ceylon zu unternehmen, und dieselbe genau zu erforschen, sowie auch die Insel Borneo zu bereisen und so viel wie möglich in ihr Inneres einzudringen. Es sind ihm zu dieser Reise ein dreijähriger Zeitraum, hinreichende Geldmittel bestimmt, und nach ihrer Beendigung eine reichliche Entschädigung in Aussicht gestellt worden. Warszewicz, dem die Botanik viele Entdeckungen verdankt, hat diese Proposition ausgeschlagen. Ein anderer Vorschlag ist Herrn Warszewicz von Seiten des Inspectors zur Bewaldung der Gegenden am Schwarzen Meer, Herrn Stronkow gemacht worden; auch diess hat Warszewicz ausgeschlagen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): At. Uechtritz R. v.

Artikel/Article: Botanische Excursion in die
Central-Karpathen. 360-361