

er sich aus den Fortschritten der Wissenschaft ergibt, nicht unberücksichtigt zu lassen, ihn getreu ihrem Papiere zum Gemeingute zu machen.

Auf die österreicheische botanische Zeitschrift pränumerirt man mit 5 fl. CM. (3 Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang oder mit 2 fl. 30 kr. CM. auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaction (Wieden, Neumannsgasse Nr. 331).

„In diesem Falle werden dem Pränumeranten, der mit 5 fl. CM. directe bei der Redaction auf ein ganzes Jahr pränumerirt, je nach seiner Wahl entweder die 3 ersten Jahrgänge des botanischen Wochenblattes, oder eine halbe Centurie Pflanzen aus dem Bereiche der mitteleuropäischen Flora (wenn derselbe eine Desideratenliste von mindestens 200 Species einsendet) als Prämie offerirt.“

Bei der Zusendung des Pränumerations-Betrages ersuchen wir um die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabe der letzten Post.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat Herr C. Gerold's Sohn am Stefansplatz in Wien übernommen.

Dr. Al. Skofitz,

Wieden, Neumannsgasse Nr. 331. — 11

Aroideen-Skizzen.

Von H. Schott.

Arisaema abbreviatum. Tuber rotundum, diametro pollicari et bipollicari. Folia 2. Petiolus viridis, immaculatus, 6-12 pollices longus. Segmenta 5-13, sessilia, remote- l. remotiusculpedatifida, gradatim minora, ovato-lanceolata, inferne angustata, apice acuminata, venis costalibus principalibus perpaucis, pseudoneuro interno ultra medium laminae costae approximato, venulis pseudoneura connectentibus patentibus plurimis; intermedium 1 1/2-5 pollices longum, 1/2-1 1/2 pollices latum. Pedunculus folii supremi petiolum interdum superans, immaculatus, sesquilinearis l. et 3-4 lineas crassilae meliens. Spatha pollicaris l. bipollicaris; tubus 1/2 totius spathae, virens, striatus; lamina cymbiformis, subacuminata, purpurea-fusca? erecta. Spadix spathae tubum parum superans, 5-12 lineas longus, plerumque androgynus, sessilis l. substipitatus, organo fructificationis dense-contiguis obsitus, neutris carens, appendice brevissima, subcylindrico-clavata, vertice truncata, 1-2 lineas longa terminatus. Antherae subsessiles. Stylus vix ullus.

Habit. in Indiae orientalis provincia Simla (Herb. Hook. f. et Thoms.)

Schönbrunn, 13. November 1857.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics](#)

and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 382