

Zur Flora des Osts.

Von Victor von Janka.

1. *Carex Czetzii* Janka.

Rhizoma caespitosum; foliorum basilarium, marcentium vaginac sanguineo-rufae. Folia linearia plana $1\frac{3}{12}$ lin. lata, margine scabra, supra glaberrima, subtus pilosa, calamo fructifero breviora. Calamus 7—8 poll. altus erectus subtriqueter scabriusculus. Spicae dense congestae. Bractea foliolacea, oblonga, margine scarioso basi dilatata, calatum dimidium amplectens, dein abrupte lanceolato-acuminata 3 lin. longa rigida. Spica mascula solitaria elliptica 4 lin. longa, $2\frac{4}{12}$ lin. lata: squamae late obovatae apice leviter emarginatae fuscae. Spicae semineae 2sessiles subglobosae, squamae obovatae, dorso obsolete carinatae, apice nunc obtusae lacero — vel eroso — denticulatae, breviter v. subaristatae, nunc emarginatae longiusve aristulatae, Utriculus $1\frac{8}{12}$ lin. longus, oblongus, antice latior, subobliquus, elevato-nervatus, breve rostratus, hirtulo-pilosus squama aeque longus, colore lividus. Achenium longitudine utriculi laeve subtilissime punctulatum.

Habitat in Transsilvaniae collibus circa pagum Gánts, ubi mense Aprili a. 1855 detexit cl. Czetz.

A proxima *C. montana* L. abunde differt foliis latioribus, spicae masculae forma, utriculis etc.

2. *Koeleria flexilis* Janka.

Rhizoma breve subrepens. Culmi erecti bi-tripedales gracillimi flexiles laeves. Folia omnia anguste linearia, plana, subtus margineque sicut foliorum culmeorum vaginæ patenter breve-pilosa; ligula brevis eroso-truncata. Inflorescentia paniculata totam secus longitudinem magis minusve interrupta, laxa 18—30 lin. longa, usque 10 lin. lata; rachis dense pubescenti-pilosa. Spiculae biflorae $1\frac{3}{4}$ lin. longae; glumæ valvae inaequales in carina dorsali serrulato-scabrae: valva inferior minor lanceolata, $1\frac{2}{12}$ lin. longa subaristata; superior oblonga $1\frac{7}{12}$ lin. longa acuminata. Palea inferior lanceolata acuminata carina serrulato-scabra, superior complicata bicuspidata.

Hab. in collibus circa pagum Gánts Transsilvaniae septemtrionalis, ubi legit cl. Czetz.

*Nitidissima planta! habitu potius, necnisi spicularum parvitate a Koeleria cristata Pers. diversa. Si notae hæ ad novam distinguendam speciem non sufficiunt, et Koeleria setacea Pers. (*K. valesiaca* Gaud.) sicut *K. albescens* D. C. et *K. grandiflora* Pers. cum illa conjungendae. Koeleriam cristatam genuinam ceterum spiculis variare (vel potius gluma superiore) 2 ad $3\frac{1}{2}$ lin. longis, foliis planis glabris aut pilosis, vel setaceo convolutis, persuasum mihi habeo.*

Wien, im Februar 1858.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Janka Viktor von Bulcs

Artikel/Article: [Zur Flora des Ostens. 93](#)