

welchem die Flechte sich ansiedeln kann. c. Die Exposition des localen Standortes). 4. Die Verwendung der Lichenen in Baiern zu technischen oder sonstigen Zwecken. 5. Specielle Aufzählung der Lichenen Baierns. In letztem Abschnitte werden 133 Gattungen mit 657 Arten und zahlreichen Varietäten in einer systematischen Anordnung nach Massalongo und Körber angeführt. Den neu aufgestellten oder minder bekannten Arten befinden sich Diagnosen beigedruckt. Eine erhebliche Anzahl von Nachträgen und Berichtigungen nebst einem alphabetischen Verzeichniss der im Werke vorkommenden Gattungen Arten und Varietäten bilden den Schluss des Ganzen.

— Das Bulletin der naturf. Gesellschaft zu Moskau 1861 Bd. 1. enthält unter andern: „Uebersicht der Arten der Gattung *Thalictrum*, welche im russischen Reiche und den angrenzenden Ländern wachsen.“ (Mit 3 Tafeln.) Von E. Regel — „Enumeratio plantarum circa Mohileviam ad Borysthenem collectarum.“ Von N. Downar. — „Einiges zur Frage über die relative Lage der Steinkohlen in Central-Russland.“ Von N. Barbot de Morny.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingetroffen: Von Herrn Braunstingel in Wels mit Pflanzen aus Oberösterreich. — Von Herrn Apotheker Patze in Königsberg mit Pflanzen aus Ostpreussen. — Von Herrn Dr. Feichtinger in Grän mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn Baron Schlichting in Gurschen mit Pflanzen aus Posen. — Von Herrn Kanitz in Wien mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn Bayer in Wien mit Pflanzen von Wien. — Von Herrn Juratzka in Wien mit Pflanzen aus Niederösterreich. — Von Herrn Heuser in Neuwied mit Pflanzen aus Preussen.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Krzisch in Baden, Saxinger in Linz, Preuer in Hofgastein, Haszlinsky in Eperies, Dr. Hegelmayer in Ulm, Oberleitner in Windischgarsten, Monheim in Aachen, Hofmayer, Dr. Rauscher und Dr. Endlicher in Wien.

Mittheilungen.

— In einer Papierfabrik zu Cussey in Frankreich wird nach einem neueren Verfahren ausschliesslich *Zostera* zur Erzeugung von Papier verwendet.

— Durch den Genuss von Blättern des *Taxus baccata* fanden zwei Pferde den Tod im vergangenen Juli zu Mariaspring bei Göttingen. Da die tödtliche Wirkung des Taxusgiftes ähnlich jener der Blausäure ist, so kam es schon vor, dass neben einem Taxusbaume angebundene Pferde von dessen Laub genossen und dabei plötzlich verendet haben.

— Aus den Fasern des Bastes von *Asclepias syriaca* haben Pirschkoff und Hartmann zu Kiew durch ein besonderes Verfahren eine Watta bereitet, welche der aus Baumwolle nicht nachsteht.

— Die Erdbeeren - Kultur wird in der Umgegend von Paris in einem ungeheuren Massstabe betrieben. In Bagnolet sind allein 300 Erdbeeren-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [011](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 414](#)