

Verzeichniss

der auf einer Reise nach den quarnerischen Inseln
gesammelten Gefäss-Pflanzen.

Von Carl Petter.

Monte Spaccato bei Triest. 16. April 1862.

- | | |
|--|---|
| <i>Ceterach officinarum</i> Willd., sehr häufig auf alten Mauern. | <i>Hippocrepis comosa</i> L. |
| <i>Carex alpestris</i> All. | <i>Allium neapolitanum</i> Cyrillo, verwildert am Wege nach St. Andrèa unter Gebüsch. |
| <i>Fritillaria montana</i> Hoppe, in zahlloser Menge auf der Nordseite: | <i>Asphodelus luteus</i> L., verwildert am Wege nach St. Andrèa unter Gebüsch. |
| <i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb., in zahlloser Menge auf der Nordseite. | <i>Prunus Laurocerasus</i> L., verwildert am Wege nach St. Andrèa unter Gebüsch. |
| <i>Asparagus acutifolius</i> L. | <i>Cercis Siliquastrum</i> L., bei St. Andrèa. |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. | <i>Centranthus ruber</i> DC., bei San Bortolo (Reichardt). |
| <i>Aristolochia pallida</i> Willd. | <i>Euphorbia Wulfenii</i> Hoppe, an der Eisenbahn bei Triest. |
| <i>Leontodon saxatilis</i> Reich. | |
| <i>Paeonia peregrina</i> Mill., überall am Karst und auf der Nordseite des Berges. | |
| <i>Helleborus dumetorum</i> W. K., sehr häufig. | |

Scoglio: St. Cattarina bei Rovigno. 17. April 1862.

Während eines Aufenthaltes von wenigen Minuten wurde gesammelt:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <i>Asphodelus ramosus</i> L. | <i>Anemone hortensis</i> L. sehr häufig. |
| <i>Hedypnois tubaeformis</i> Tenore. | <i>Euphorbia pinea</i> L. |
| <i>Rhagadiolus edulis</i> Gärtner. | <i>Spartium junceum</i> L. |
| <i>Sherardia arvensis</i> L. | <i>Medicago maculata</i> Willd. |
| <i>Cynoglossum cheirifolium</i> L. | <i>Vicia grandiflora</i> Scop. |
| <i>Verbascum phoeniceum</i> L. | <i>Lathyrus Cicera</i> L. sehr häufig. |
| <i>Scandix Pecten veneris</i> L. | <i>Trifolium stellatum</i> L. |
| <i>Tordylium apulum</i> L. | |

Pola. 17 April 1862.

Die kurze Rast des Dampfschiffes liess nur Zeit während der Besichtigung der Arena zu sammeln:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <i>Parietaria diffusa</i> Mk. | <i>Corydalis acaulis</i> Pers. |
| <i>Linaria Cymbalaria</i> Mill. | |

Lussin piccolo. 18. bis 25. April.

- | | |
|---|---|
| <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> L. bei Zigale. | <i>Avena filifolia</i> Lag., sehr häufig unter Oelbäumen. |
|---|---|

- Carex gynomane* Bertol.
 — *glauca* var. *erythrostachis* Hoppe, häufig in Felsenspalten.
Carex divisa Huds., bei Zigale (Reichardt).
Juncus maritimus Lam.
Asphodelus ramosus L.
Smilax aspera L.
Tamus communis L.
Ophrys Bertolonii Moretti.
 — *atrata* Lindl., sehr häufig.
 — *apifera* Huds.
 — *cornuta* Steven, selten bei Lussin grande, und an der Südspitze der Insel.
Agave americana L., auf Steinmauern.
Ruscus aculeatus L.
Posidonia Caulini König, an seichten Stellen des Meeres bei Lussin pic. und Zigale.
Arum italicum Mill. häufig.
Phoenix dactylifera L. in Lussin grande.
Juniperus Oxycedrus L.
 — *phoenicea* L.
Quercus Suber L., Südspitze der Insel.
Celtis australis L. in Lussin grande.
Theligonum Cynocrambe L., sehr häufig auf Steinmauern.
Parietaria diffusa M. K.
Salicornia fruticosa L.
Aristolochia rotunda L.
Cytinus Hypocistis L. häufig.
Valerianella eriocarpa Desv., in Weingärten.
Statice cancellata Bernh.
Rhagadiolus edulis Gärttn.
Calendula arvensis L.
Picridium vulgare Desf.
Urospermum picroides Desf.
 — *Daleschampi* Desf.
Crepis bulbosa Tausch, grasige Plätze.
Carduus pycnocephalus Jacq.
Anthemis arvensis L.
Leontodon saxatilis Reichb.
- Gnaphalium angustifolium* L.
Rubia peregrina L.
Vaillantia muralis L.
Viburnum Tinus L.
Phillyrea media L.
Olea europaea L.
Salvia clandestina L.
 — *officinalis* L.
Stachys arvensis L., grasige Plätze bei Zigale.
Sideritis romana L.
Ajuga genevensis L.
 — *Chamaepitys* Schreb.
Micromeria Juliana Bernh.
Prasium majus L.
Cynoglossum cheirifolium L.
Vitex Agnus castus L.
Scrophularia peregrina L.
 — *canina* L.
Hyoscyamus albus L., bei Lussin grande.
Cyclamen repandum Sibth., sehr häufig zwischen den Steinmauern.
Erica arborea L., Südspitze der Insel.
Arbutus Unedo L.
Tordylium apulum L.
Ecballion Elaterium Rich.
Ranunculus parviflorus L.
 — *relutinus* Tenore.
Fumaria capreolata L.
Arabis hirsuta Scop.
Aethionema saxatile R. Br.
Cistus salvifolius L., sehr häufig.
 — *villosus* L.
Herniaria glabra L.
Cerastium semidecandrum L.
Silene sedoides Jacq., Meeresstrand.
Sagina maritima Don., Meeresstrand.
Rhamnus Alaternus, Südspitze der Insel.
Euphorbia peploides Gouan.
 — *helioscopia* L.
 — *exigua* L.
 — *fragifera* Jan.

- Pistacia Lentiscus* L., Südspitze der Insel.
 — *Terebinthus* L.
Erodium malacoides Willd.
Linum angustifolium Huds., grasse Plätze bei Zigale.
Myrthus communis L.
Poterium Sanguisorba L.
Lotus ornithopodioides L.
Bonjeania hirsuta Reichb.
Hippocrepis comosa L.
Coronilla cretica L.
- Anthyllis Vulneraria* var. *rubriflora* Sturm.
Vicia gracilis Loisl.
 — *villosa* var. *glabrescens* Roth.
Medicago maculata Willd.
Trifolium stellatum L., sehr häufig.
 — *subterraneum* L.
Lathyrus Cicera L.
 — *setifolius* L.
 — *Aphaca* L.

Sansego. 19. April 1862.

- Equisetum ramosum* Schleich, sehr häufig
Avena fatua L.
 — *hirsuta* Roth.
Dactylis glomerata L.
Arundo Donax L.
Poa bulbosa L.
Hordeum murinum L.
Schoenus nigricans L.
Asphodelus ramosus L.
Muscari comosum Mill.
 — *racemosum* Mill.
Possidonia Caulini König, in Porto Subschansky (Reich.)
Urospermum picroides Desf.
 — *Daleschampi* Desf.
Senecio vulgaris L.
Calendula arvensis L.
Picridium vulgare L.
Crepis bulbosa Tausch zwischen den Häusern sehr häufig.
Rubia peregrina L.
Cyclamen repandum Sibth.
Anagallis arvensis L.
Veronica arvensis L.
Myosotis hispida Schl.
- Convolvulus althaeoides* L. var. *tenuissimus* Koch, sehr häufig.
Euphorbia peploides Gouan.
Hedera Helix L.
Eryngium campestre L.
Crithmum maritimum L.
Geranium pusillum L.
Erodium cicutarium L'Herit.
Sinapis arvensis L.
Cakile maritima Scop.
Diploaxis tenuifolia DC.
Draba verna L.
Fumaria agraria Lag.
Lotus edulis L. selten.
 — *ornithopodioides* L.
 — *cytisoides* L. am Meeresstrande.
Coronilla Emerus L. sehr häufig.
Medicago littoralis Rhode.
 — *tribuloides* Lam. häufig.
 — *lupulina* L.
 — *minima* Lam.
 — — var. *molissima* Sprengl.
Vicia sativa L.
 — *angustifolia* Roth.
 — *peregrina* L.

Canidole piccolo. 19. April 1862.

- Arundo Donax* L.
Narcissus Tazetta L. sehr häufig.
Passerina hirsuta L.
Vaillantia muralis L.
- Cerastium semidecandrum* L.
Euphorbia Ciparissias L.
Lotus cytisoides L.

Zabodaoschi. 19. April 1862.

<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
<i>Ornithogalum collinum</i> Koch.	<i>Euphorbia peploides</i> Gouan.
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Thymus Serpyllum</i> L.
<i>Salicornia fruticosa</i> L.	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.
<i>Parietaria diffusa</i> M. K.	<i>Geranium molle</i> L.
<i>Passerina hirsuta</i> L., massenhaft.	— <i>columbinum</i> L.
<i>Cynanchum fuscatum</i> Link., massenhaft.	<i>Fumaria agraria</i> Lag.

Canidole grande. 22. April 1862.

<i>Arundo Donax</i> L.	<i>Gnaphalium angustifolium</i> D C.
<i>Schoenus nigrirans</i> L., sehr häufig.	<i>Statice cancellata</i> Bernh.
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Onosma montanum</i> Sibth.
— <i>officinalis</i> L.	<i>Marrubium candidissimum</i> L.
<i>Passerina hirsuta</i> L.	<i>Vaillantia muralis</i> L.
<i>Salicornia fruticosa</i> L.	<i>Crithmum maritimum</i> L.
<i>Cynanchum fuscatum</i> Link.	<i>Silene inflata</i> L.
<i>Euphorbia Myrsinites</i> L.	<i>Anthyllis Vulneraria</i> var. <i>rubriflora</i> Lam.
— <i>fragifera</i> Jan.	<i>Lotus cytisoides</i> L.
<i>Picridium vulgare</i> Desf.	
<i>Inula crithmoides</i> L.	

Unie. 22. April 1862.

<i>Equisetum ramosum</i> Schleich., sehr häufig im Sande.	<i>Juniperus Oxycedrus</i> L.
<i>Poa bulbosa</i> L.	<i>Quercus Ilex</i> L.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Letztere drei auf der Westseite mit <i>Pistacia Lentiscus</i> , <i>Erica arborea</i> und <i>Tamus communis</i> fast undurchdringliche Gebüsche bildend.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Passerina hirsuta</i> L., bei der grossen Bucht auf der Südwestseite sehr häufig.
<i>Ornithogalum collinum</i> Koch.	<i>Aristolochia Clematitis</i> L.
<i>Muscari comosum</i> L. sehr häufig.	<i>Plantago maritima</i> L.
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.
<i>Ophrys atrata</i> Lindl.	<i>Crepis bulbosa</i> Tausch.
— <i>Bertolonii</i> Moretti, sehr häufig, besonders auf der Westseite der Insel. Hier wurde auch eine sehr schöne Varietät dieser <i>Ophrys</i> gefunden mit: grünem, blassroth überlaufenem oberen Perigonzipfel, und braungelber Honiglippe.	— <i>vesicaria</i> L., ziemlich häufig.
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	<i>Hypochoeris glabra</i> L., ziemlich häufig.
<i>Smilax aspera</i> L.	<i>Sonchus asper</i> Vill.
<i>Tamus communis</i> L.	<i>Picridium vulgare</i> Desf.
<i>Possidonia Caulini</i> König, in Porto Pogle (Reichardt).	<i>Urospermum Daleschampi</i> Desf.
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	— <i>picroides</i> Desf.
	<i>Carduus nutans</i> L.
	<i>Senecio vulgaris</i> L.

- Rhagadiolus stellatus* Gärtn.
 — *edulis* Gärtn.
Viburnum Tinus L.
Vaillantia muralis L.
Sherardia arvensis L.
Phillyrea media L.
Salvia clandestina L.
 — *pratensis* L.
Thymus Serpyllum L.
Marrubium candidissimum L.
Onosma montanum Sibth.
Myosotis intermedia Link.
Convolvulus arvensis L.
 — *althaeoides* L. var. *tenuis-*
sima Koch.
Veronica arvensis L.
 — *praecoë* L.
Verbascum phoeniceum L.
Trixago latifolia Reich., sehr
 häufig unter Gebüsch auf der
 Ostseite.
Anagallis arvensis var. *phoeni-*
cea Lam.
 — *arvensis* var. *caerulea*
 Schreb.
Erica arborea L.
Arbutus Unedo L.
Scandix australis L., sehr häufig.
Crithmum maritimum L.
Tordylium apulum L.
Anemone hortensis L.
Ranunculus parviflorus L.
Arabis hirsuta L.
Sisymbrium Thalianum Gaud.
Sinapis arvensis L.
Draba verna L.
Vesicaria sinuata Poir.
Alyssum montanum L.
Aethionema saxatile R. Br.
Capsella Bursa pastoris Mönch.
Reseda lutea L.
- Herniaria glabra* L.
Cerastium semidecandrum L.
Sagina maritima Don.
Silene inflata Smith.
Malva sylvestris L., häufig.
Paliurus aculeatus Lam.
Euphorbia fragifera Jan.
 — *Cyparissias* L.
 — *helioscopia* L.
 — *peplodes* Gouan.
 — *Myrsinites* L.
Mercurialis annua L.
Pistacia Lentiscus L.
Ruta divaricata Tenore.
Erodium cicutarium L'Herit.
Geranium columbinum L.
 — *molle* L.
 — *Robertianum* L.
Linum angustifolium L.
Poterium Sanguisorba L.
Spartium junceum L.
Astragalus argenteus Bertol.
 — *Wulfenii* Koch.
Melilotus dentata Pers.
Anthyllis Vulneraria var. *rubri-*
flora Sturm.
Medicago tribuloides Lam.
 — *prostrata* Jacq.
 — *maculata* Willd.
Lotus cytisoides L.
 — *corniculatus* var. *villosus*
 Thuill.
Trifolium procumbens L. var.
minus.
Lathyrus Aphaca L.
Vicia sativa L.
 — *angustifolia* Roth.
 — *hirsuta* Koch.
 — *villosa* var. *glabrescens*
 Roth.

Tersorca. 24. April 1862.

- Avena hirsuta* Roth.
Bromus racemosus L.
Poa bulbosa L.
Arum italicum Mill.
Asparagus acutifolius L.
- Juniperus Oxycedrus* L.
 — *phoenicea* L.
Statice cancellata Bernh.
Crepis bulbosa L.
Gnaphalium angustifolium L.

Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.
Salvia pratensis L.
Marrubium candidissimum L.
Myosotis hispida Schl.
 — *intermedia* Link.
Veronica praecox L.
Anagallis arvensis var. *phoenicea*
 Lam.
Anagallis arvensis var. *coerulea*
 Schreb.
Tordylium apulum L.

Mercurialis annua L.
Euphorbia helioscopia L.
Ruta bracteosa DC. massenhaft.
Geranium columbinum L.
 — *Robertianum* L.
Pistacia Lentiscus L.
Myrthus communis L.
Vicia villosa var. *glabrescens*
 Roth.
Trifolium stellatum L.
Medicago minima Lam.
 — *tribuloides* Lam.
Astragalus hamosus L.

St. Pietro di Nembi. 24. April 1862.

Carex alpestris All.
Asphodelus ramosus L.
Ophrys atrata Lindl.
 — *cornuta* Steven.
Limodorum abortivum Sw. (Reichardt.)
Potamogeton lucens L. und
Zanichellia pedicellata Fries, in
 einem kleinen Sumpfe an der
 Ostseite (Reichardt).
Possidonia Caulini König, Süd-
 ostküste.
Plantago Psyllium L.
Valerianella eriocarpa Desv.
Aristol. Clematitis L., sehr häufig.
Hypochoeris glabra L.
Cynanchum fuscum Link.
Ajuga Chamaepitys Schreb.
Vitex Agnus castus L.
Sideritis romana L.
Lonicera Caprifolium L.
Phillyrea media L.
Verbascum sinuatum L., an Mauern
 (Reichardt).
Erica arborea L.
Saxifraga tridactylides L.

Fumaria agraria Lag.
 — *capreolata* L.
Papaver Rhoeas L.
Glaucium luteum Scop.
Anemone hortensis Scop.
Sisymbrium Thalianum Gaud.
Brassica Rapa var. *campestris*
 Koch.
Bupleurum aristatum Bartl.
Tordylium apulum L.
Alsine mucronata in Maly's Enumer. = *A. tenuifolia* var. *densiflora* Visiani.
Euphorbia Wulfenii Hoppe, massenhaft.
Reseda Phyteuma L.
Oxalis corniculata L.
Cistus monspeliensis L., sehr häufig.
Trifolium subterraneum L.
Spartium junceum L.
Anthyllis Vulneraria var. *rubriflora* Lam.
Medicago marina L.
Lupinus hirsutus L.
Vicia gracilis Loisl.
Pisum arvense L.

Laibach. 28. bis 30. April 1862.

Leucojum aestivum L., im Moor sehr häufig.
Erythronium Dens canis L.
Fritillaria Meleagris L., bereits verblüht.
Cineraria longifolia Jacq., Iskathal.
Aposeris foetida Lessing.

Fraxinus Ornus L., Iskathal.
Gentiana verna var. *elongata* Jacq., Iskathal.
Lamium Orvala L., Iskathal sehr häufig
Omphalodes verna Mönch, Iskathal.
Paederota Ageria L., Iskathal.
Pedicularis acaulis Scop., Saveufer.
Scopolina atropoides Schult. Iskathal.
Hacquetia Epipactis DC. Saveufer.
Rhamnus alpina L. Iskathal.
Euphorbia carniolica Jacq., Iskathal.
Stellaria bulbosa Wulf., Schischkaberg.
Geranium molle L.
Potentilla rupestris L., Schlossberg.
Aremonia agrimonioides Neck., Iskathal.
Cytisus hirsutus L., Iskathal.
 — *purpureus* Scop., sehr häufig, Iskathal.
Genista sagittalis L., Iskathal.
 — *scariosa* Viviani, Iskathal.
Orobus tuberosus L., Iskathal.
Vicia oroboides Wulf., Iskathal.

Wien, im September 1862.

A u s z u g

aus dem

Tagebuch meiner Reise nach Tirol und Kärnthen im Sommer 1850.

Von Vulpius.

III.

Auf Montag den 5. August setzte ich meine Abreise von St. Peter in Kärnthen fest, um über den Lanisch ins Malteinthal zu gehen. Herr Gussenbauer versprach, mich bis auf den Hafner zu begleiten, dessen Uebergangshöhe ungefähr 9000' beträgt. Zu dieser Expedition wurde der Knecht Flor des Försters Klein im Schloss für mich hauptsächlich als Führer bis auf die Maralpe im Malteinthal gemiethet. Für sich selbst nahm G. 3 andere Bursche, theils um Proviant zu tragen, theils um ihm helfen Pflanzen zu sammeln und Käfer und Schmetterlinge zu fangen. Es wurde 8 Uhr bis alles fertig war und ich endlich Abschied nehmen konnte von dem erinnerungsreichen St. Peter. Bei schönem Wetter führte uns unser Weg 3 Stunden lang fast eben durch's Thal hinein, in dessen Hintergrunde der Lanisch liegt und dessen höchste Spitze, die Hafnerspitze, 9600' hoch ist. Den Stern, den Faschauerrock, den hohen Sonnenblick und andere hohe wilde Berge hatten wir zur

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [012](#)

Autor(en)/Author(s): Petter Karl (Carl)

Artikel/Article: [Verzeichniss der auf einer Reise nach den quarnerischen Inseln gesammelten Gefäss-Pflanzen. 350-356](#)