

Berichtigungen zu den Beiträgen der Flora von Salzburg.

(Oesterr. botanische Zeitschrift 1862. 12. Bd. Seite 305.)

Von Julius Hinterhuber.

Thalictrum simplex L. Wurde im Nassfelde von Mielichhofer und nicht von Dr. Sauter aufgefunden. *Anemone baldensis* L. Kommt auf den Fuschertauern nicht vor, sondern wurde von Dr. Sauter ober der Ringalpe in der Fusch, und in der Zwing in Pinzgau gefunden.

Ranunculus alpinus L. Soll bei Maria Ellenberg in Schellenberg nicht Schallenberg heißen.

R. arvensis L. Kommt bei Wals bei Salzburg vor.

R. pantothenia DC. Allgemein in Lungau verbreitet Dr. Sauter.

R. platanifolius L. Ist nur eine Form von *Ranunculus aconitifolius*.

R. pygmaeus Wahlb. Wurde in der Zwing in Pinzgau von Herrn Bamberger aufgefunden.

R. Traunsteineri Hoppe. Dieser von Herrn Jelmelli auf der übergossenen Alpe aufgefundene, ist nicht der wahre, sondern nur eine Form von *R. alpestris* L.

Helleborus foetidus L. Wurde bei Mattsee nicht von Dr. Sauter, sondern von Herrn Pfarrer Michl aufgefunden.

Aquilegia Einseliana Schultz. Ist nur eine Form von *Aquilegia pyrenaica* DC.

Delphinium elatum L. Wurde auf dem Scheidberg von Herrn Pfarrer Michl und nicht von Dr. Sauter aufgefunden.

Fumaria Vaillantii Lois. Kommt bei Salzburg in Garten und nicht in Gräben vor.

Barbarea stricta Andr. Kommt nach Dr. Sauter auf feuchten Wiesen bei Leopoldskron vor.

Arabis Turrita L. Ist auf dem Neuhauserberge bei Salzburg nach Dr. Sauter zu streichen.

Draba tomentosa Wahlb. Soll heißen auf dem Eggerfürst nicht Churfürst. Ueberhaupt wurde der Standort Eggerfürst mehrfach mit Churfürst verwechselt.

Thlaspi montanum L. Soll heißen auf Aeckern in Lungau. Mielichhofer.

Subularia aquatica L. Vor mehreren Jahren von Braune in einer Lache bei Grödig entdeckt. Wurde aber neuerer Zeit nicht mehr aufgefunden.

Aethionema saxatilis R. Br. Kommt auf dem Kies des Rosittenbaches, am Fusse des Untersberges vor. Dr. Sauter.

Viola palustris L. Auf den Torfmooren bei Salzburg nicht selten. Dr. Sauter.

Dianthus Armeria L. Soll bei Eugendorf heissen.

Silene excapa All. Ist nur eine Form von *Silene acutifolia* L.

Facchinia lanceolata Rb. Soll auf der Enskrachse bei Radstadt nicht Rudkrachse heissen.

Arenaria Marschlinii, wurde nicht von Dr. Sauter, sondern von Apotheker Traunsteiner aufgefunden.

Elatine triandra. Soll heissen am nicht in Zellersee.

Hypericum ceromense Schr. Ist nur eine Form von *H. perforatum* L. Diese Pflanze wurde auch von Dr. Sauter bei Golling hinter der Kirche aufgefunden.

Trifolium glareosum Sch. Kommt nach Dr. Sauter allgemein auf Schutt von Gebirgsbächen vor.

Vicia dasycarpa Ten. Ist nur eine Form von *Vicia glabrescens* Koch, und kommt nach Dr. Sauter nicht selten in Getreidefeldern um Salzburg vor.

Vicia pisiformis, ist nach Dr. Sauter aus der Flora von Salzburg zu streichen.

Potentilla norwegica L. Kommt nach Dr. Sauter bei Lambach in Pinzgau vor.

P. salzburgensis. Soll Eggerfürst bei Hallein, nicht Churfürst bei Hallein heissen.

Alchemilla fissa. Soll ebenfalls Eggerfürst bei Hallein, nicht Churfürst bei Hallein heissen.

Cotoneaster tomentosa Lindl. Kommt auf einer Felswand auf dem Mönchberg bei Salzburg, nicht auf einer alten Mauer vor.

Sempervivum arenarium Koch. Ist nur eine Form von *Sempervivum hirtum* L.

S. Funkii Braune. Wurde der Standort sicherlich mit *Sempervivum Wulfenii* Hoppe verwechselt.

Saxifraga Facchini Koch. Wurde auf dem Preber in Lungau von Vierhapper aufgefunden.

S. retusa Stbg. Wurde aufgefunden in der Fusch auf dem Schwarzkopf von Herrn Holgartner Schmid; auf dem Hoch-Golling in Lungau von Dr. Sauter.

Helosciadium repens Koch. Kommt nach Dr. Sauter auch bei Glas vor.

Aster pareiflorus N. E. und *Aster salignus* Willd. sind aus der Flora zu streichen, und dafür *A. bellidiflorus* in den Auen an der Salzach bei Weitwörthen zu setzen. Dr. Sauter.

Carpesium cernuum L. An einem Hügel bei Laufen, nicht in den Auen an der Salzach. Birnbacher Curat.

Artemisia campestris L. Um Salzburg. Dr. Sauter.

Achillea Clusiana Tausch. Auf dem Radstädter-Tauern. Hillebrand.

Senecio alpinus K. Auf dem Radstädter-Tauern. Zwanziger.

S. incanus L. Ist synonym mit *S. carniticus* Willd.

S. nebrodensis L. Ist synonym mit *S. rupestris* Kit.

Carlina longifolia Rb. Kommt nach Metzler auch am westlichen Gehänge von Böckstein vor.

Pieris eriopoides Saut. Ist nur eine Form von *P. hieracioides*.
Leontodon nigricans Kit. und *Taraxacum nigricans* sind synonym.
Hieracium pilosellaeforme Hoppe ist synonym mit *H. Hoppeanum* Sch. Auf Bergmäder ober dem Bade Fusch. Dr. Sauter.
H. rigidum W. ist zu streichen, dafür aber an dessen Stelle *H. nemorosum* Pers. anzusetzen.
Campanula thyrsoides L. Auf einer Alpe im Mühlbachthale, ober Koprin in Ober-Pinagau. Dr. Sauter.
Swertia perennis L. Auf dem Moore unter der Baderluck gegen Fuschel zu. Dr. Sauter.
Linaria Cymbalaria L. An benanntem Orte verwildert. Dr. Sauter.
Orobanche neotrioides Saut. Am Gangsteige von St. Gilgen nach Feistensau im Walde, wie auch bei Abtenau. Dr. Sauter.
Or. pallidiflora Wimm. Ist synonym mit *O. Galii*. Dr. Sauter.
Or. procera K. Ist synonym mit *O. erubescens*. Dr. Sauter.
Or. Sauteri. Ist synonym mit *O. Cardui*. Dr. Sauter.
Galeopsis grandiflora Roth. Ist synonym mit *G. ochroleuca* Lam.
Lysimachia thyrsiflora L. Bei Kasham neben der Strasse nach Pöllheim in einem Sumpfe. Dr. Sauter.
Anagallis tenella L. Bei Saalfelden zu streichen. Dr. Sauter.
Primula truncata Sch. Ist eine Form von *Pr. minima* L.
P. tyrolensis Schultz. Auf dem Tannengebirge Mielichh. Auf dem Bischof neben dem Hallstädter Schneeberge. Fehrenbach.
Rumex obtusifolius L. Allenthalben in Salzburg gemein. Dr. Sauter.
Potamogeton filiformis Pers. In einem künstlichen Sumpfe bei Abtenau. Neuerer Zeit nicht mehr aufgefunden. Dr. Sauter.
Najas major L. In Wassergräben bei Salzburghofen.
Lemma polyrrhiza L. In einer Lache bei Köttelack.
Allium montanum Schmid. Ist synonym mit *A. fallax* Don.
Carex maxima Scop. Ist synonym mit *C. pendula* Schreb.
C. Personii Sieb. Ist synonym mit *C. Gebhardi* Hoppe.

Salzburg, den 7. April 1863.

Correspondenz.

Bihar bei Grosswardein, den 10. September 1863.

Seit ich ihnen das letzte Mal schrieb, bin ich, und zwar seit 29. Juli hier in Bihar, nicht ganz 2 Meilen von Grosswardein, wohin ich auf einem kürzeren Wege reitend, in 1 Stunde gelangen kann. Bei mir besitze ich nur ganz kleine Partien meines Herbars, nämlich solche Gattungen, die ich fort und fort studiere, wie: *Sesleria*, *Colchicum*, *Iris*, *Muscari*, *Trifolium* etc. etc. — Doch reite ich beinahe täglich nach Grosswardein, um irgend im Herbar oder in Büchern etwas über Pflanzen, die mir gerade einfallen, nachzusehen. Die wichtigeren Floren

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische

Botanische Zeitschrift = Plant Systematics
and Evolution

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: 013

Autor(en)/Author(s): Hinterhuber Julius

Artikel/Article: Berichtigungen zu den
Beiträgen der Flora von Salzburg. 327-329