

Oesterreichische BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

Gemeinnütziges Organ

für

Die Oesterreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit 50. 25 kr. Oest. W.
(3 Thlr. 10 Ngr.)
ganzjährig oder
mit 2 fl. 63 kr. Oest. W.
halbjährig.

Inserate
die ganze Petitzeile
10 kr. Oest. W.

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

No. 11.

Exemplare,
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
bloß bei der Redaktion
(Wieden, Neumang. Nr. 7)
zu pränumeriren.

Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
so wie alle übrigen
Buchhandlungen.

XVI. Jahrgang.

WIEN.

November 1866.

INHALT: Descriptiones plantarum. Von Dr. A. Kerner. — Ueber einige Arten von *Cynanchum*, Von Münch. Meine Reise nach Bünden und Tirol. Von Vulpius. — Die europäischen Alopecurus-Arten, Von Janka, — Correspondenz. Von Schiller, Vrabélyi, Schneller, Dr. Kerner, Andorfer, Dr. Milde. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Correspondenz der Redaktion. — Inserat.

Descriptiones plantarum novarum.

Auctore A. Kerner.

1. *Euphorbia alpigena*. — Rhizoma albidum vel roseolum, horizontale, elongatum, teretiusculum et carnosum, crassitudine tamen caulem parum superans, articulato-ramosum, ramis aequalibus, non tuberosis, oblique concatenatis, fibrillis sparsis tenuissimis et squanis albidis oblongo-triangularibus obsitis. Caulis erectus, pilosus, inferne teres, superne subangulatus, ex axillis foliorum superiorum plerumque ramosus cymiferos evolvens, cymis 5 in pseudumbellam dispositis terminatus. Folia tenuia, sessilia vel brevissime petiolata, ter longiora quam latiora, obovato-oblonga, supra medium parum dilatata, obtusa vel acutiuscula, apicem versus minute serrulata, caeterum integra, superne pilosa vel glabra, intense viridia, opaca, inferne pallidiora, leviter glaucescentia, semper pilosa. Folia pseudumbellam involucrantia bis — bis et semissi longiora quam latiora, oblongo-elliptica, caeterum foliis caulinis aequalia. Radii pseudumbellae patenter pilosi, semel — bis bifidi, floriferi folia involucralia aequantes, fructiferi vero excedentes. Involucella glabra, viridia vel livide purpurascens, triangulari-deltoidea, acuta, aequa lata ac longa, in basi truncata

et in angulis lateralibus obtusis integra, caeterum minute serrulata. Glandulae suborbiculatae, sub anthesi viridi-flavae, demum purpureae et dum marcescunt ferrugineac. Capsula depressa, trisulcata, glabra, verrucis sparsis inaequalibus breviter conoideis et cylindricis vel hemisphaericis obsita. Semina ovata, brunea, nitidula, laevia, sub lente minutissime punctulata.

Rhizoma 3—5^{mm} crassum. — Caulis 200—450^{mm} alt. — Fol. caul. media 25—50^{mm} lg. 10—18^{mm} lt. Fol. involucralia 15—30^{mm} lg. 6—14^{mm} lt. Involucellae 8—16^{mm} lg. et lat. — Glandulae 1^{mm} lg. et lat. — Capsulae 3^{mm} lg. 4^{mm} lt. — Sem. 2^{mm} lg. 1^{mm} lt.

Euphorbiae angulatae Jacq. et E. dulci Jacq. proxima. — *E. angulata* rhizomate tenui, repenti, caudiculoso, ad collum et hinc inde in tuberculos inflato, caule eximie angulato et glandulis transverse ovatis; *E. dulcis* rhizomate caulem crassitudine valde superanti, foliis involucralibus elongatis ter-quater longioribus ac latioribus, radios pseudumbellae fructiferae aequantibus vel paene aequiparantibus, involucellis ex truncata basi ovato-oblongis, bis longioribus ac latioribus differt. Caeterum in *E. angulata* et *dulci* caules et ramuli nunquam ejusmodi pilosi quam in *E. alpigena* evadunt.

Nonnullis notis *E. alpigena* medium tenet inter *E. angulata* et *dulcem*, minima tamen hybrida earum est, cum in Tiroli sept. neutra ibi giguitur, ubi *E. alpigena* copiose invenitur.

A botanophilis nonnullis helveticis et tirolensisbus cum *E. dulci* Jacq. commutata esse videtur. Vera *E. dulcis* Jacq. autem a me prope Adelsberg in Carniola, in monte Geissberg prope Petersdorf, juxta Grabmühle prope Mautern et aliis locis Austriae inferioris lecta et in herbario ex Stiria (Marburg) et Bohemia (Hohenelbe) asservata certe diversa et notis supra dictis facillime distinguenda.

Olim plantam supra descriptam pro *E. incompta* Cesati in Linnaea 1839 pag. 88 (mihi solummodo ex diagnosi brevi et insufficiente nota) habui. Secundum cl. Boissier, acuratissimum monographum Euphorbiacearum, qui specimen typicum *E. incompta* Ces. vidit, hac planta vero ab *E. dulci* Jacq. non differt. (Cf. Boissier in DC. Prodr. Pars XV. Sect. post. pag. 127.)

E. alpigena crescit inter frutices in silvaticis subalpinis Tirolis et Helvetiae. — Ex Helvetia specimina exstant a Schleicheru lectae et sub nomine *E. dulcis* communicatae (Herb. Univers. Oenipont.); in Tiroli meridionali in vicinitate lacus Benaci legit Clementi (Herb. Mus. Tirol.), in Judicariis prope Stelle Boni (Herb. Mus. Tirol.); in Tiroli sept. legi ipse ad Weiherburg prope Oenipontem, Hallthal prope Hall et copiosissime in Plätschenthal ad pedem montis Solstein solo calcareo altitud. 2000—4000 hexapod. — Minime dubito plantam et multis aliis locis subalpinis crescere.

2. *Salix subalpina* (*supergrandifolia* \times *incana*). — Frutex ad 6 ped. altus, trunco erecto, ramis subsfurcatis divaricatis, cortice olivaceo tectis. Ramuli sicut gemmae ovatae obtusae glabri. Folia adolescentia revoluta, incano-tomentosa, adulta lanceolato-linearia,

acuta, aut media parte aut supra medium latissima, quinque—sexies longiora quam latiora margine, subdeflexo argute denticulato-serrata, supra obscure viridia, nitidula, glabrata, subtus glauca, tomento tenuissimo ex pilis albidis opacis irregulariter sparsis constituto aequaliter vestita. Costa media valida straminea. Nervi secundarii longiores utroque latere 19—28 sicuti nervi secundarii interjecti breviores sub angulis 80—90° oriuntur et marginem versus antrorum arcuati decurrent. Nervi omnes prominentes cum venis anastomoticis prominulis reticulum elegans constituunt. Stipulae indistincte semicordatae serrulatae. Amenta pistilligera subcoactanea, gracilia, curvula, densiflora, quinque longiora quam latiora, pendunculata, pedunculo foliolis oblongis integris 3—5 obsito. Squamae concavae, oblongae, obtuse, parum et sparsim pilosae, viridulæ, versus apicem purpurascentes et in apice ipso nonnunquam nigricantes. Glandula tori lenticularis, citrina. Germen parvum, ex ovata basi conicum, pilis adpressis tectum, sericeo-canum, in pedicello piloso, glandulam tori sub anthesi quater, post anthesin quinque superante. Stylus brevis, stigmata pallide flava, bifida vel profunde biloba, laciniis oblongis, sub anthesi patulis, deinde conniventibus.

Fol. 50—100^{mm} lg. 10—20^{mm} lt. — Ament. pistilligera 20—30^{mm} lg. 4—6^{mm} lt. — Squamae 1.5^{mm} lg. — Germen 1.5^{mm} lg. — Styl. 0.2—0.3^{mm} lg. — Pedicellus 1.3—1.5^{mm} lg. Glandula tori 0.3—0.4^{mm} lg.

Sine dubio hybrida, orta ex *S. grandifolia* Ser. et *S. incana* Schrank.

Salix intermedia Host, quam etiam hybridam inter *S. grandifoliam* et *incanam* habemus, notis sequentibus a *S. subalpina* differt:

S. intermedia.

Pedicellus glandulam tori sub anthesi bis, post anthesin ter superans.

Stylus elongatus.

Glandula tori ovata, truncata.

Germen anguste conicum 2.5^{mm} longum.

S. subalpina.

Pedicellus glandulam tori sub anthesi quater, post anthesin quinque superans.

Stylus brevis.

Glandula tori lenticularis.

Germen ovato-conicum 1.5^{mm} longum.

S. subalpinam in valle fluvii Sill prope Oenipontem alt. 2000 hexap. cum *S. grandifolia* et *S. incana* florentem legi mense Mayo. Jam diu in Austria inferiori in monte Josefsberg fruticem sterilem, foliis cum planta supra descripta plane congruentem inveni (Cf. A. Kerner Niederöst. Weiden, p. 103).

S. subalpina in Dec. VI. Herbarii austriacarum salicum a me et fratre meo editi sub Nr. 52 dimittetur.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [016](#)

Autor(en)/Author(s): Kerner Josef Anton

Artikel/Article: [Descriptiones plantarum novarum. 337-339](#)