

Oesterreichische BOTANISCHE ZEITSCHRIFT. Gemeinnütziges Organ

Die Oesterreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe,
mit 5 fl. 25 kr. Oest. W.
(3 Thlr. 10 Ngr.)
ganzzählig, oder
mit 2 fl. 63 kr. Oest. W.
halbjährig.
Inserrate
die ganze Petitzeile
10 kr. Oest. W.

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

No. 12.

Exemplare,
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
bloß bei der Redaktion
(Wieden, Neumann. Nr. 7)
zu pränumeriren.

Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
so wie alle übrigen
Buchhandlungen.

XVI. Jahrgang.

WIEN.

December 1866.

INHALT: Descriptiones plantarum. Von Dr. A. Kerner. — Zur Flora des Neutraer Komitats. Von Holuby. — Meine Reise nach Bünden und Tirol. Von Vulpinus. — Die europäischen Brachypodium-Arten. Von Janka. — Die europäischen Nardurus-Arten. Von Janka. — Literaturberichte. Von Reichardt, Dr. Milde. — Correspondenz. Von Janka, Resely, Vulpinus, Haussknecht. — Anweisung. Von Vulpinus. — Botanischer Tauschverein. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Sammlungen. — Correspondenz der Redaktion. — Inserrat.

Einladung zur Pränumeration

auf den XVII. Jahrgang (1867) der

Oesterreichischen

Botanischen Zeitschrift.

(Oesterr. botan. Wochenblatt.)

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift“ pränumerirt man mit 5 fl. 25 kr. ö. W. (3. Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang oder mit 2 fl. 63 kr. ö. W. auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wieden, Neumanngasse, Nr. 7 (331).

Bei der Zusendung des Pränumerations-Betrages ersuchen wir um die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabe der letzten Post.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat Herr C. Gerold's Sohn in Wien, am Stephansplatz, übernommen.

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch vollständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden:
 1. Jahrgang 2 fl. (1 Thlr. 20 Ngr.) — 2. und 3. Jahrgang zu 1 fl. (20 Ngr.) — 7. bis 14. Jahrgang zu 3 fl. (2 Thlr.) — 15. und 16. Jahrgang zu 5 fl. (3 Thlr. 10 Ngr.)

Dr. Alexander Skofitz,

Wieden, Neumanngasse Nr. 7.

Descriptiones plantarum novarum.

Auctore A. Kerner.

3. *Salix Huteri* (*hastata* \times *helvetica*). — Frutex ad 2 ped. altus, rvalue amosus, ramulis patulis brevibus, novellis cano-pubescentibus, adultis glabratris subtorulosis cortice fusco-castaneo-nitido tectis. Gemmae oblongo-ovatae, primum pubescentes, demum glabrae. Folia elliptica vel obovata, basi cuneata, antice breviter acuta, bis longiora quam latiora, plerunque media parte, rarius paullo superius latissima, margine remote crenato-serrata, basin versus integerrima, adolescentia canescentia utrinque villo sericeo-tecta, adulta supra glabrescentia saturate sed pure viridia et nitidula, subtus cano-virentia tenue et molliter tomentosa, ad ramulorum basin pilis sericeis argenteis et nitidis, ad ramulorum apices vero pilis intricatis opacis vestita. Costa media subtus prominula straminea. Nervi secundarii utroque latere 10—14, paralleli, subrecti vel marginem versus paululum antrorsum arcuati. Venulae anostomoticae in tomento delitescentes, obsoleta. Stipulae rarissimae, semiovatae. Amenta pistilligera cylindrica, densiflora, pedunculata, pedunculo brevi foliolis integris sericeo-argenteis 3—4 obsito. Squamae oblongo-spathulatae acutiusculae fulvae, capicem versus ferrugineae, pilis rectis sericeis longissimis dense villosae. Glandula tori oblonga, truncata, flava, basin germinis attingens. Germina ex ovata basi conica, tomento brevi opaco albido denique rarescenti et canescenti vestita, pedicellata. Pedicellus valde brevis, glandulam tori subaequans. Stylus mediocris, crassus purpurascens. Stigmata oblonga, erecto-patula, bifida. Valvae capsule post maturitatem falciformes, extrorsum arcuatae.

Folia 30—50^{mm} lg. 15—25^{mm} lt. — Amenta ♀ 15—25^{mm} lg. 5—6^{mm} lt. — Squamae 1—2^{mm} lg. — Germina 2^{mm} lg. — Styl. c. stigm. 0.5—1^{mm} lg. Pedicell. et gland. tori 0.5^{mm} lg.

De origine hujus stirpis nulla manet dubitatio. Certe e *Salice hastata* et *S. helvetica* Vill. connubio orta est. Habitus inter parentes optime intermedius. Folia lata margine crenato-serrata supra pure viridia *Salicem hastatam* simulant et indicant; vestitus

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [016](#)

Autor(en)/Author(s): Skofitz Alexander

Artikel/Article: [Einladung zur Pränumeration auf den 17. Jahrgang \(1867\) der Oesterreichischen Botanischen Zeitschrift. 369-370](#)