

Antennaria pinophita. Auf Binsenstengeln und Blättern, die faulend am Boden liegen, in den sumpfigen Quellwiesen des Burbaches sehr häufig *Chaetomium elatum*. Am Ufer dieses kleinen Baches auf der Unterseite der Blätter von *Cirsium oleraceum*, *Uromyces Cichoracearum*. Auf einer sehr schattigen Waldblöße am Ufer des Burbaches auf der Unterseite der Blätter von *Aegopodium Podagraria* sehr schön und häufig *Dothidea Podagrariae* und *Agaricus fimi-putris*. Unter Weisstannen am Burbache *Boletus edulis* und *luridus*, *Clavaria pistillaris* und *cristata*, letztere sehr klein, ohne schwarze Spitzen, mit pinselartigen gehäuften Verzweigungen, also die Form *fimbriata*. Ferner für dieses Tagebuch der erste *Agaricus* aus der Section *Amanita*, ein sprechender Beweis für den gegenwärtigen elenden Zustand der Pilzflora, nämlich ein noch jugendliches Stück von *Agaricus pantherinus*, an dem ich, besonders wenn er angeschnitten wird, einen feinen Krengeruch bemerke. Dort fand ich auch vereinzelt die kleine *Russula chamaeleontina* sowohl mit lila-färbigem, als aus dem rosenrothen ins weisse ausbleichenden Hute. Auf einem Weisstannenstumpfe eine Gruppe von jugendlichem *Agaricus flammans* und auf einem anderen Baumstumpfe der gleichen Art in reifem Zustande ein Exemplar des vornehmen *Agaricus bombycinus*.

13. September. Auf der Unterseite eines Blattes von *Quercus sessiliflora* im Eichwalde *Fusidium pallidum Quercus*.

14. September. Auf schattigen mit *Hylocomien* bewachsenen Stellen einer schmalen Waldwiese unweit des Jungendbrunnens *Agaricus epipterygius*. Am Burbache unter Tannen *Gomphidius glutinosus* und *Clavaria rufescens*.

(Schluss folgt.)



Die europäischen *Juncus*-Arten.

Von Victor v. Janka.

1. Testa seminis utrinque in sacculum relaxata. 2.

Testa seminis nucleo conformis. 11.

2. Caules nudi; folia basilaria teretia, pungentia. 3.

Caules basi foliati, superne nudi v. 1—2-phyllici; folia filiformia, setacea v. linearia canaliculata. 6.

3. Perigonii foliola subaequalia; exteriora obtusiuscula v. acutiuscula; capsulae perigonio 2-plo longiores. 4.

Perigonii foliola inaequalia; exteriora acuta v. acuminate; capsulae perigonium subaequantes:

Juncus maritimus Lam. (*J. ponticus* Stev!)

4. Flores 2—4 fasciculato-congesti; capsulae ovali-globosae. 5.

Flores subsolitarii; capsulae ovato-oblongae:

J. multibracteatus Tin.

5. Perigonii foliola exteriora lanceolata; capsulae acuminatae:

J. acutus L.

Perigonii foliola exteriora ovata; capsulae obtusiusculae:

J. Tommasinii Parl.

6. Flores subsessiles cymoso-fasciculati v. fasciculato-capitati nunc
vagina apice foliifera vel bractea triplici ovata, nunc folio flo-
rali brevi suffulti. 7.

Flores foliis floralibus longissime setaceis multoties su-
perati: *J. trifidus* L. (*J. Hostii* Tausch.)

7. Perigonii foliola acuminata; caules superne monophylli; fila-
menta anthera sub-3plo breviora; capsulae retusae perigonio
breviores: *J. Jacquinii* L.

Perigonii foliola acuta, acutiuscula v. obtusa; caules in-
ferne foliati; filamenta anthera longiora; capsulae haud retusae
perigonium excedentes. 8.

8. Folia planiuscula linearis-subulata; rhizoma repens:

J. castaneus Smith.

Folia setacea teretiusscula, rhizoma abbreviatum. 9.

9. Spathae florales bracteaeformes brevissimae: *J. triglumis* L.
Spatha floralis limbo foliaceo instructa. 10.

10. Perigonii foliola obtusa capsula breviora: *J. biglumis* L.

Perigonii foliola capsulam aequantia v. superantia, exte-
riora acuta: *J. stygius* L.

11. Caules nudi basi vaginati; vaginae aphyllae (rarissime in *J.*
filiformi una alterave limbo foliaceo donata). 12.

Caules foliati. 22.

12. Inflorescentia lateralis. 13.

Inflorescentia terminalis: *J. squarrosum* L.

13. Caules tenuissimi, filiformes; inflorescentia (ob folium florale
inferius valde elongatum caulem ipsum longitudine plerumque
aequans) in medio circiter caulis disposita; capsulae subglo-
bosae: *J. filiformis* L.

Caules robustiores; folium florale inferius (continuatis
caulis) caule multo brevius, inflorescentia itaque in parte caulis
superiore disposita; capsulae ovales v. ohlongae. 14.

14. Perigonii foliola ovalia v. ovato-lanceolata. 15.

Perigonii foliola lanceolata 16.

15. Inflorescentia capitata sub-7-flora; perigonii foliola acutiuscula
v. obtusa mutica; caulis laevissimus: *J. arcticus* Willd.

Inflorescentia plus minus decomposita pluriflora; peri-
gonii foliola mucronata; caulis striatus: *J. balticus* Willd.

16. Vaginae basilares nitidae atropurpureae; flores plerumque 6-andri;
capsulae apice attenuatae. 17.

Vaginae basilares opacae testaceae; flores plerumque
3-andri; capsulae apice depresso-truncatae. 21.

17. Herbae virides; caules tenuissime striati. 18.

- Herbae glaucae; caules manifestius elevato-striati 19.
18. Inflorescentia pallida subalbicans: *J. paniculatus* Hoppe.
 Inflorescentia dilutius colorata, fuscescens: *J. glaucus* Ehrh.
19. Stamina 6; capsula perigonum aequans v. brevior. 20.
 Stamina 3; capsula perigonio sub-2plo longior: *J. depauperatus* T. N.
 20. Stamina 6:
 Stamina 3: *J. diffusus* Hoppe.
21. Caules fistulosi:
 Caules farcti: *J. Angelisii* T. N.
22. Caules fistulosi:
 Caules farcti: *J. fistulosus* Guss.
23. Folia septis transversis destituta: *J. communis* E. Mey.
24. Perigonii foliola omnia aristato-acuminata vel saltem acuminata. 25.
 Perigonii foliola plus minus obtusa vel exteriora quandoque acuta. 29.
25. Anthela contracta subcorymbosa; flores densissime capitati;
 capsulae obtusae, mucronatae: *J. Thomasii* T. N.
 Anthela patens v. divaricata laxa; capsulae aequaliter attenuato-rostratae. 26.
26. Perigonii foliola interiora longiora apice subrecurva. 27.
 Perigonii foliola haud extrorsum curvata. 28.
27. Folia laevia vel tenuissime striata: *J. silraticus* Reich.
 Folia elevato-nervata in sicco distincte sulcatula: *J. atratus* Krock.
28. Flores capitati; capsulae perigonium paullo superantes:
J. striatus Schousb. (*J. lagenarius* Gay.)
 Flores fasciculati; capsulae perigonium subduplo excedentes: *J. Gussonei* Parl.
29. Folia omnia homomorpha. 30.
 Folia superiora tereti-compressa, crassa; inferiora subfiliiformia: *J. heterophyllus* Duf.
30. Caulis inferne vaginis aphyllis vestitus, superne 1—3-phyllus:
J. obtusiflorus Ehrh.
 Caulis vaginæ etiam inferiores foliiferae. 31.
31. Anthela erecto-patens v. divaricata folium florale inferius multo superans; perigonii foliola aequalia vel subaequalia. 32.
 Anthela semper erecta folium florale inferius subaequans; perigonii foliola inaequatia: *J. alpinus* Vill.
32. Caulis strictus: stilus ovario longior: *J. anceps* Laharpe.
 Caulis procumbens v. adscendens; stilus ovario brevior: *J. lamprocarpus* Ehrh.
33. Flores solitarii vel subsolitarii corymbulosi v. remoti. 34.
 Inflorescentia e capitulo nunc terminali solitario, vel plu-

- ribus: infimo sessili, reliquis plus minus longe pedunculatis
constans. 41.
34. Perennes, rhizoma horizontaliter repens; flores corymbulosi. 35.
Annuī; flores remoti. 38.
35. Perigonii foliola lanceolato-acuminata: *J. tenuis* Willd.
Perigonii foliola omnia obtusissima. 36.
36. Capsula perigonio 3plo longior; anthela folio florali inferiore
multo brevior vel subaequalis: *J. compressus* Jacq.
Capsula perigonium aequans vel vix longior. 37.
37. Anthela folium florale inferius superans: *J. bottnicus* Wahlb.
Anthela folium florale inferius aequans: *J. elatior* Lge.
38. Capsulae ellipsoideae. 39.
Capsulae globosae vel subglobosae. 40.
39. Perigonii foliola exteriora acuta, interiora obtusa; capsulae pe-
rignonum aequantes: *J. ambiguus* Guss.
Perigonii foliola omnia acuminata vel interiora acuta aut
obtusiuscula, capsulae perigonio breviores:
J. bufonius L. (*J. foliosus* Desf.)
40. Perigonii foliola ovato-lanceolata fusca anguste albo-marginata:
J. Tenageia L.
Perigonii foliola lanceolata virescentia late albo-margi-
nata: *J. sphaerocarpos* N. ab E.
41. Perigonii foliola attenuato-acuta; caules plerumque foliati:
J. pygmaeus Thuill. (*J. bicephalus* Viv.)
Perigonii foliola setaceo-acuminata; caules ima basi fo-
liati, parte reliqua aphylli. 42.
42. Capitula folio florali inferiore multo breviora; capsula linearis-
oblonga: *J. Sorrentinii* Parl.
Capitula folio florali inferiore paullo breviora; capsula
ovata: *J. capitatus* Weig.

Nagy Nyárad (Com. Baranya), am 9. September 1867.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [017](#)

Autor(en)/Author(s): Janka von Bulcs Viktor

Artikel/Article: [Die europäischen Juncus-Arten 316-319](#)