

Öesterreichische Botanische Zeitschrift.

Gemeinnütziges Organ

für

Die österreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit 5 fl. 25 kr. öst. W.
(3 Thlr. 10 Ngr.)
ganzjährig, oder
mit 2 fl. 63 kr. öst. W.
halbjährig.
Insetate
die ganze Petitzelle
10 kr. öst. W.

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

Nº. 3.

Exemplare
die frei durch die Postbe-
zogen werden sollen, sind
blos bei der Redaktion
(Wien, Neumang. Nr. 7)
zu pränumerieren.
Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
so wie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXII. Jahrgang.

WIEN.

März 1872.

INHALT: *Hieracium pallidifolium*. Von Dr Knaaf. — *Hieracium Aschersonianum*. Von Uech-
tritz. — Neue Pflanzenformen. Von Holuby. — Al. Braun über meine *Potentilla digitato-flabellata*.
Von Dr. Heidenreich. — Ueber *Rudbeckia*. Von Dr. Schur. — Skizzen von der Erdumsegelung.
Von Dr. Wawra. (Fortsetzung.) — Flora der Peterwardeiner Grenze. Von Dr. Godra. — Literatur-
berichte. — Correspondenz. Von Dr. Celakovský, Dr. Lerch, Dr. Landerer. — Personalnotizen.
— Vereine, Anstalten, Unternehmungen. — Literarisches. — Sammlungen. — Botanischer Tauschverein.
— Inserate.

***Hieracium pallidifolium* n. sp.**

Auctore Jos. Knaaf *).

Phyllopodium, fere totum eglandulosum. Caulis robustus, rigidus,
sesquipedalis, superne fractiflexus, pleiophyllus (6—4 phyllus), apice
subcorymbosus, a medio ex foliorum axillis ramosus (ramis erecto-patulis,
subfoliosis, 1—3 cephalis), in axillis foliorum inferiorum fovens unum
vel plura folia minora scaber, pilis subtilissime denticulatis sparse ob-
situs. Folia subcoriacea, rigida, pilis denticulatis margine ciliata, ad
petiolum hirsuta, subtus subglauco-pallescentia, ad nervum medium
subhirsuta, ceterum ut supra pilis hirtis adpressis scabriuscula; basalia
pauca (2—4) et caulinis insina late oblongo-lanceolata, acuta vel ob-
tusiuscula, longe petiolata, a parte integrerrima deorsum repando- aut
sinuato-dentata, dentibus baseos majoribus antrorum versis; caulinis
media oblonga in petiolum brevem, latum et integrerrimum attenuata,
grosse sinuato- et paucidentata; suprema breviter petiolata, basi

*). Aus dem Nachlasse Knaaf's mitgetheilt; geschrieben im J. 1863. Die
Pflanze ist im Besitze seines Sohnes, eine Abbildung derselben befindet sich in
dem soeben erscheinenden 2. Theile von Celakovský's Prodromus der Flora
von Böhmen.

integerrimà late ovata, inferioribusque basi latiora, medio paucidentata, apice subito-acuminata, utrinque subglabra. Capitula florentia speciosa, ovato-subglobosa. Pedunculi dense fusco-floccosi et ut involucra sparse subfuscò-floccosa pilis longioribus hirtis, basi atris, apice subcanis, eglandulosis, paucis instructi, paucissimis brevioribus granduliferis immixtis. Squamae in vocluci regulariter multiseriatae, adpressae, obscure virides, nigricantes, exteriores concolores, acutiusculae, interiores elongato-acuminatae, margine pallidae. Ligularum concolorum dentes pilis brevissimis paucis obsiti. Pappus albidus inaequalis. Stylus in sicco obscure viridi-fuligineus. Achenia fusco-atra.

Legi in Sudetis: „Kleine Schneegrube.“ 9. August 4841.

Plantam exakte typicam et characteristicam censeo. Prius quae sive in *H. palescente* W. Kit., sed ex diagnosi in Epicrisi Hieraciorum Cel. Fries neutiquam est. Eam, licet magna adsit similitudo cum „Vulgatis Pulmonareorum“, tamen rectius ad „Alpina Aurellorum“ ob capitula speciosa, ventricosa, involuci habitum et formationem aliasque notas inserendam esse puto. Proxime accedere videtur ad *H. personatum* Fries, praecipue ad formam ejus Lindebergianam; at planta mea cum diagnosi illius accuratius comparata, ab ea certe recedit.

***Hieracium Aschersonianum* (n. sp.)**

Auctore R. von Uechtritz.

H. Aschersonianum (Ser. II. Pulmonarea Fr. Symb. sect. V. Italica).

— Phyllopodium. Caulis vix pedalis (in specimine descripto 0·22 m. altus), simplex, leviter striatus, epilosus, at tenuissime pubescens, basin versus vero glabratus, parce foliosus, oligo-(6-) cephalus. Folia maxime difformia; basilaria numerosa, majora (0·07—0·10 m. longa, 0·015—0·018 m. lata), rigidiuscula, oblongo-lanceolata vel late lanceolata, sensim in petiolum mediocrem attenuata, remote denticulata, ad nervum medium et ad marginem parce atque breviter pilosa, ceterum utrinque glabrescentia; caulinus prorsus dissimilia, pauca (3), diminuta (0·018—0·025 m. longa, 0·003—0·006 m. lata), e basi ovala lanceolata, longe acuminata, integerrima, pilis tenuibus albis elongatis sparsis crinita, sensim in bracteas omnino conformes, at minores, transientes. Inflorescentia exakte racemosa. Pedunculi mediocres, bracteam duplo vel triplo superantes, erecti vel subappressi, cano-floccosi, eglandulosi, moncephali. Involucra mediocria, illis *H. borealis* et *H. barbati* haud dissimilia, deflorata 0·010 m. longa, 0·012 m. lata, basi truncata. Squamae multiseriales, unicolores obscure virides, basi parce cano-floccosae, ceterum glabrae, epilosae, interiores, latae obtusinsculae, extimae paucae, minimae, laxae. Stylus (in sicco) et livido fuliginens. Ligulae glabrae. Achaenia pappum subaequantia, ca. 0·004 m. longa, etiam natura pallida.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [022](#)

Autor(en)/Author(s): Knaf Josef

Artikel/Article: [Hieracium pallidifolium n. sp. 77-78](#)