

Oesterreichische Botanische Zeitschrift.

Gemeinnütziges Organ

für

Die österreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit 8 fl. öst. W.
(5 Thlr. 10 Ngr.)
ganzjährig, oder mit
4 fl. öst. W. (3 Thlr. 10 Ngr.)
halbjährig.
Inserate
die ganze Petitzeile
15 kr. öst. W.

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

Nº 9.

Exemplare
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
blos bei der Redaktion
(Wieden, Neumang. Nr. 7)
zu pränumeriren.

Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
so wie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXII. Jahrgang.

WIEN.

September 1872.

INHALT: *Hieracium Wimmeri*. Von Uechtritz. — Vegetationsverhältnisse. Von Dr. Kerner. — Zur Flora von Böhmen. Von Dr. Celakovský. — Zur Kenntniss der Ranunculaceen-Formen. Von Val de Lievre — Ueber *Abelia*. Von Vatke. — Flora der Peterwardeiner Grenze. Von Dr. Godra. (Schluss.) — Skizzen von der Erdumsegelung. Von Dr. Wawra. (Fortsetzung.) — Literaturberichte. — Correspondenz. Von Prichoda, Pantocsek, Holuby. — Personalnotizen. — Vereine, Anstalten, Unternehmungen. — Botanischer Tauschverein. — Inserate.

***Hieracium Wimmeri* spec. nov.**

Auctore R. v. Uechtritz.

Pulmonareum, e sectione Vulgatorum (Syn. *H. anglicum* Wimmer! Fl. v. Schlés. ed. III. p. 308 non Fr., *H. oreades* Wimmer! olim [nec Fr. nec Heuff.], solummodo nomen sine descriptione sec. specim. et locum, *H. pallescens* Fr. Epicr. p. 94 ex p. [quoad loc. Siles.] non W. et Kit.)

Phyllopodium; caulis gracilis, tenuis, simplex, 2—3 decim. altus, paucifolius (1—3phyllus), foliis valde remotis, apice depauperato-corymbosus (bi- quinqueflorus), glaber vel ad basin parce pilosus. Folia apiculata submembranacea, supra laete viridia, glabra, subtus pallidiora obsolete reticulata, ut in margine sparsim pilosa, praecipue ad nervum medium; — basilaria pauca (2—5) plerumque persistentia, ut caulina inforiora in petiolum mediocrem, tenuem, pilosum attenuata, oblongo-lanceolata vel oblonga, ad apicem subintegra, basin versus plus minus grosse dentata vel tantum denticulata, summa sessilia, late lanceolata, denticulata vel subintegra. Inflorescentia discreta; pedunculi graciles, erecti, apicem versus plerumque arcuati, basi foliolo reducto linearie sussulti. Capitula vix mediocria, gracilia. Involucra nigricantia ut pedunculi leviter cano-floccosa, pilis glanduliferis nigris


sparsis immixtis; squamis angustis cuspidatis flores virgineos haud superantibus, exterioribus paucis brevibus patulis. Ligulae evidenter ciliatae, stylus livido-fuligineus. Achaenia matura badio-atra.

Stirps insignis, a cl. Fries certe erroneo cum *H. pallescente* W. K. commixta, cum nulla sudetica rite comparanda, crescit in declivibus graminosis editioribus Sudetorum occidentalium (in parte silesiaca ad lacum alpinum Kl. Teich! et in fauce Melzergrube, ubi primus invenit cl. Wimmer, rarius ad latera bohemica in fauce Kesselgrube ad montem Kesselkoppe! (Trautmann, Fritze) et in monte Kiesberg! (Fritze); specimina ex his duobus locis paullo elatiora et ex parte magis latifolia. Simile vidi e Croatiae alpibus in herbario Kitabeliano sub titulo *H. saxatilis* (Nr. 7092 [172]), cui cl. Neilreich nomen *H. pallescentis* adscriperat.

Dissert ab *H. pallescente* W. K., cujus specimina authentica in herb. Kitabeliano (Nr. 7220 [287] et 7093 [172 a] e Croatiae alpibus comparari, colore non glauco, caule superne glabro tenuiore, foliis basi minus profunde sinuato-dentatis vel tantum denticulatis, squamis involucralibus extimis patulis nec arcte adpressis, ligulis apice manifeste ciliatis nec glabris, habitu denique alieno graciliore magis ab *H. vulgati* formis, quibus *H. pallescens* verum haud dissimile, recedente.

Ab *H. vulgati* formis alpinis minoribus paucifloris microcephalis diversum colore laete viridi herbae, caule superne glabro graciliore, denticulis foliorum rarioribus minoribusque versus apicem fere evanescentibus vel nullis, pedunculis gracilioribus subarcuatis nec strictis, involucro nigricante, squamis multo longius cuspidatis, ligulis ciliatis, habitu prorsus alio singulare. Cum ceteris speciebus vix ullam praebet affinitatem.

Breslau, am 31. Juli 1872.



Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und östlichen Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens.

Von A. Kerner.

LV.

1044. *Hieracium Bauhini* Schultes Obs. bot. 164 (1809). — Auf trockenen Wiesen und grasigen Plätzen in Niederwäldern, an Weinbergsrändern und an Dämmen. Im mittelung. Bergl. auf dem Szarkáshegy und Kutyahégy bei Erlau; in der Matra bei Parád, Bakta und Bodony und auf dem Sárhegy bei Gyöngyös; auf dem Nagyszál bei Waitzen; in der Pilisgruppe auf dem Kétagohégy bei Csév, bei Sct. Andrae und Pomász, im Wolfsthale und auf dem Schwabenberge bei Ofen, auf der „grossen Haide“ ober Tetény; auf der Kecskem.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [022](#)

Autor(en)/Author(s): At. Uechtritz R. v.

Artikel/Article: [Hieracium Wimmeri spec. nov.. 277-278](#)