

H. poliotrichum Wimm. eingezogen; abgesehen von der Konfusion, welche durch solche Zusammensetzung von verschiedenen Formen hervorgebracht wird, sind alle angeführten Standorte unbrauchbar, da man nicht weiss, zu welchem Namen welcher Standort gehört. Zu *H. praealtum* Vill. führt er als Synonym *H. florentinum* All. an, aus dem ganzen Passus kann ich aber nicht entnehmen, ob diese Pflanze von irgend einem Autor für das Gebiet angegeben wurde. Neben *H. carpaticum* Bess. figurirt als besondere Spezies *H. juranum* Fr., und beide Namen beziehen sich, soweit das Tatragebirge anbelangt, auf eine und dieselbe Pflanze u. s. w.

Schliesslich halte ich es für meine Pflicht, allen denjenigen Herren, welche mir in meinen Studien durch freundliche Einsendung von Exsiccaten behilflich waren, hiermit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Mehr oder weniger reichhaltige Kollektionen erhielt ich von den Herren: Brandmayer, Christener (beat.), Engler, Fritze, Halaczy, Jabłoński, Janota, Ilse, Jablonowski, Kalchbrenner, Kerner, Kloeber, Knaf, Lagger (beat.), Pantocsek, Polak, Reuss jun., Seidel, Skofitz, Sonklar, Trautmann, Uechtritz, Vukotinovicz.

Wien, am 3. Januar 1873.



Neue Standorte zur Flora von Niederösterreich.

Von Dr. Eugen von Halácsy.

- Cladium Mariscus* R. Br. Sumpfige Stellen in der Au bei Ebreichsdorf. 1872.
- Heleocharis uniglumis* Schult. Sumpf bei Ebergassing. 1872.
- Alisma Plantago* L. *β. aquaticum* Neilr. In einer Lache zwischen dem Bahnhofe und dem Orte Grossenzersdorf. 1871.
- Juncus sphaerocarpus* N. v. E. Unter *Lythrum hyssopifolia* an voriger Stelle. 1871.
- Colchicum vernale* Hoffm. Auf der Rohrerwiese bei Dornbach. 1865.
- Lilium bulbiferum* L. Auf Wiesen am Freinsattel und noch häufiger bei dem Erlafsee. 1871.
- Convallaria latifolia* Jacq. Ungemein üppig im Goldwäldchen bei Ebergassing. 1872.
- Gladiolus palustris* Gmel. Sumpfwiesen bei Reichenau. 1867.
- Iris sibirica* L. Wiesen bei Ebergassing. 1872.
- Orchis mascula* L. Auf der Sofienalpe bei Dornbach 1872.
- Gymnadenia odoratissima* Rich. Waldränder bei dem Erlafsee. 1871.
- Goodyera repens* R. Br. In Wäldern am eisernen Thore. 1863.
- Corallorrhiza innata* R. Br. In Wäldern bei Giesshübel. 1861.

- Potamogeton Hornemanni* Näg. In Wassergräben bei Ebreichsdorf. 1872.
- Parietaria erecta* M. et K. Im Gerölle bei Thalhofenge bei Reichenau. 1872.
- Plantago arenaria* W. et K. Sandplätze am Geissberge bei Rodaun. 1872.
- Xeranthemum annuum* L. Sandplätze bei Lassee. 1872.
- Cirsium palustri-rivulare* Näg. Sehr häufig auf Wiesen bei Reichenau 1872.
- Cirsium palustri-oleraceum* Näg. Mit vorerwähntem Bastarte. Selten. 1872.
- Cirsium rivulari-oleraceum* Rich. Ebendasselbst. Häufig. 1872.
- Cirsium Erisithali-oleraceum* Näg. Waldränder bei Steinbach. In mehreren Exemplaren. 1872. Dann in Wäldern bei Nasswald. 1872.
- Hieracium villosomurorum* Neil. In der Griesleiten der Raxalpe. 1871.
- Campanula thyrsoidea* L. Ebendasselbst. 1871.
- Menyanthes trifoliata* L. Sumpfwiesen bei Reichenau. 1872.
- Origanum vulgare* L. Mit weissen Blumen im Krummholze des Grünschachers. 1872.
- Cuscuta europaea* L. Auf *Urtica dioica* in der Thalhofenge bei Reichenau. 1872.
- Orobanche stigmatodes* Wimm. Auf *Centaurea Scabiosa*, auf einer sandigen Stelle bei Ebreichsdorf. Häufig. 1872.
- Caucalis muricata* Bischff. Auf Feldern bei Laxenburg mit *C. daucoides*. 1872.
- Barbarea stricta* Andr. An Bächen bei Mauerbach. 1872.
- Erucastrum obtusangulum* Rchb. Massenhaft an Wegen und in den Auen bei Ebreichsdorf. 1872. Und in einigen Exemplaren im Sande der Liesing im Orte selbst. 1872.
- Euclidium syriacum* R. Br. An den Häusern der Wildgrube bei Grinzing. 1872.
- Lepidium perfoliatum* L. An Häusern in Dornbach. 1870.
- Silene acaulis* L. Weissblühend auf der Heukuppe der Raxalpe. 1871.
- Polygala Chamaebuxus* L. β . *purpurea* Neilr. In Wäldern bei dem Erlafsee. Diese Varietät allein. 1871.
- Potentilla Fragariastrum* Ehrh. Waldränder am Himmel. 1860. Seither vergebens gesucht.
- Spiraea Ulmaria* L. β . *concolor* J. Auf Sumpfwiesen bei Reichenau. mit α . *discolor* Neilr.
- Ononis repens* L. Auf Wiesen bei Reichenau. 1867.
- Vicia oroboides* Wulf. In Wäldern beim „todten Weib.“ 1871.
- Carex cyperoides* L. Im Bette der Donau in der Brigittenau. Nur ein Individuum. 1871.

Wien, 12. Jänner 1873.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [023](#)

Autor(en)/Author(s): Halacsy [Halácsy] Eugen von

Artikel/Article: [Neue Standorte zur Flora von Niederösterreich. 92-93](#)