

gegen Gumpoldskirchen zu häufig vor. Bei Atzgersdorf habe ich zwar noch keine gesehen, der Standort wäre jedoch geeignet, so dass sie auch einmal häufig gewesen sein könnte, sowie bei Giesshübel, wo Herr Dr. Wołoszczak 1870 die *R. reticulata* Kerner gesammelt hat, welche von Christ als Form zu *R. trachyphylla* gezogen wird. — Was den anderen Punkt anbelangt, so scheint Christ ohnehin später von seiner Ansicht abgegangen zu sein, da er in der Flora 1877, Nr. 26 die *R. Boreykiaua* wohl als *R. gallico-obtusifolia* angibt, aber nicht mehr der *R. collina* Erwähnung thut. Ferner habe ich meine Rose eben als *R. collina* Jacq. ihm vorgelegt, und hat gerade er mich von dieser Meinung abgebracht. Die *Rosa Christii* stimmt auch in der That nicht mit *R. collina* Jacq. Fl. austr. tab. 197 überein. Wohl aber liegt im schönen Neilreich'schen Herbar auf dem Bogen Nr. 12687 oben aus dem bot. Garten ein Zweig, der ganz dem Bilde zu entsprechen scheint, aber von *R. Christii* ganz verschieden ist. Hingegen entspricht ein anderer Zweig auf demselben Bogen Nr. 12687 unten ganz der von mir unter Nr. VIII besprochenen *Rosa Boreykiana*. Dieser untere Zweig stammt aus dem Host'schen Garten, wie bereits oben erwähnt worden ist.

Kalksburg, am 10. Februar 1879.

E p i l o b i a n o v a.

Auctore C. Haussknecht.

(Schluss.)

E. Meridense Hausskn. Radice repente radicante, stolones breves rosuliformes gerente, kataphyllis sessilibus confertis oblongis obtusis subcoriaceis. Caule basi sublignescente, simplici, purpureo sublucido, sparse pilosiusculo, folioso, lineis decurrentibus pilosiusculis notato. Foliis sessilibus oblongo-lanceolatis obtusis, in petiolum sensim angustatis, subcoriaceis glabrescentibus, vix repando-denticulatis. Floribus mediocribus pallide roseis, virgineis nutantibus. Stigmate capitato-subclavato. Capsulis purpurascensibus maturis glabrescentibus, longe pedicellatis. Seminibus oblongis, utrinque aequaliter attenuatis, basi obtusiusculis, exannulatis, tenuiter papilloso. Alsine *E. Bonplandiana* Herb. Bpl. Kth.

Hab. in Paramo de Mucuchuc in decliv. leg. Moritzi. Sta. Martha, Magdalena (Herb. Benth.) Venezuela prov. Merida in Sierra Nevada leg. Linden. Doñana, Rio Grande leg. Parry.

E. Haenkeanum Hausskn. Caule basi sublignescente, pedali, teretiusculo, glabrescente purpurascente, superne tantum adpresso pilosiusculo, lineis parum elevatis glabrescentibus notato. Foliis oblongis petiolatis, mediis alternantibus, utrinque angustatis, inferioribus

obtusiusculis, superioribus acutis, tenuibus, utrinque glabris, valde venosis, repando-denticulatis, denticulis argutis, minoribus interpositis. Capsulis glabrescentibus, brevissime pedicellatis. Seminibus minimis, utrinque attenuatis exannulatis, basi acutis, tenuissime papillosum. *E. denticulatum* Presl in Reliq. Haenke.

Hab. in Peruvia leg. Haenke.

E. Gunnianum Hausskn. Caule dodrantali v. pluripedali, basi breviter decumbente, folioso, simplici, tereti, lineis paullum decurrentibus, superne tenuiter crispule puberulo. Foliis lanceolato-oblongis obtusiusculis, supremis mucronulatis, basi abrupte in petiolum brevissimum contractis, subtus nervis prominentibus glabris. Alabastris obtusiusculis. Floribus speciosis, violaceis v. albidis. Calycis lacinias lanceolatis longe angustatis acutis glabrescentibus, tubo brevi canescente. Stigmate capitato-cordiformi, apice emarginato. Capsulis elongatis, crispule puberulis, pedicellis fol. fulcr. aequilongis vel sublongioribus. Seminibus apice rotundatis, basi breviter attenuatis, obtusiusculis, testa dense papillis rotundatis minimis obsitis. Affine *E. junceo* Sol.

Hab. Van Diemens Land leg. R. Gunn nr. 253.

Syn. *E. Billardieri* et *E. Billardierianum* Hook. Fl. N. Zeel., Fl. Tasman. et Handb. Fl. N. Zeel. non Ser. in DC. pr.

E. sarmentaceum Hausskn. Rhizomate tenui longe repente, stolones epigaeos decumbentes numerosos magis minus elongatos gerente, kataphyllis oblongo-ovatis obtusis, in petiolum sensim angustatis. Caulibus basi longe decumbentibus radicantibus, arcuato-adscendentibus, remote foliatis, flaccidis, teretibus, lineis non elevatis, pilosiusculis parum decurrentibus notatis, inferne glabrescentibus, superne crispule pilosiusculis. Foliis glabris obtusis, inferioribus oblongis in petiolum longe angustatis, superioribus ovato-oblongis, abrupte in petiolum brevissimum angustatis, subintegerrimis v. remote subdenticulatis. Floribus parvis lilaciniis, virgineis subnutantibus. Stigmate breviter clavato. Capsulis crispule pilosis, pedicellis fol. fulcr. sublongioribus. Seminibus apice subattennalis, basi acutis, testa glabris.

Hab. in Tasmania leg. R. Gunn. nr. 805 et 1065.

E. chionanthum Hausskn. Rhizomate stolones epigaeos valde elongatos prostratos basi saepe radicantes emitte, kataphyllis valde remotis, infimis parvis, reliquis gradatim majoribus, ovalis obtusis subintegerrimis glabris. Caule virgato simplici paucifloro glabro, superne tantum pilosiusculo, lineis 2 pilosulis notato. Foliis ovato-oblongis in petiolum angustatis, glabrescentibus, tenuiter repando-callosa denticulatis. Alabastris globoso-ovoideis, brevissime constricta apiculatis. Floribus speciosis erectis niveis. Stigmate capitato. Capsulis crassiusculis crispule-pilosiusculis, pedicellis fol. fulcr. duplo longioribus. Seminibus apice paullum, basin versus longe attenuatis acutis, testa glaberrinis lucidis, coma tenuissima longissima, albido-ferruginea.

Hab. ad lacum Takapuna leg. Kirk.

E. chloraeefolium Hausskn. Caule e basi arcuato laxe adscendente, remote foliato, paucifloro, apice subnutante, glabro, tereti, lineis 2 albo-pilosis notato. Foliis glabrescentibus, inferioribus ovato-

oblongis obtusis, vix denticulatis, reliquis late ovatis v. subcordato-ovalis, in petiolum brevem abrupte angustatis, denticulis valde remotis raris vix repandis munitis. Floribus majusculis, virgineis subnutantibus. Stigmate oblongo-capitato. Capsulis brevibus erubescens, sparse pilosiusculis, pedicellis fol. fulcr. longioribus, Seminibus apice sensim rotundatis, basin versus longe attenuatis acutis, testa papillis brevibus dense obsitis.

Hab. in Nova Zelandia ad Waiau leg. Hector. — Prov. Canterbury, ad Mt. Martius leg. Haast.

E. erubescens Hausskn. Suffruticosum, caule simplici folioso, pedali, tereti, bifarium albido piloso caeterum glaberrimo purpurascente, basi stolones epigaeos remotiuscule foliatos gerente. Foliis crassis coriaceis, ovato-oblongis obtusis, sessilibus, dense dispositis, glaberrimis erubescens, utrinque denticulis 3 obtusis parum repandis munitis. Floribus mediocribus erectis, terminalibus, numerosis. Calyce glaberrimo. Stigmate capitato-clavato. Capsulis glaberrimis purpurascentibus, pedicellis fol. fulcr. brevioribus. Seminibus apice rotundatis, basi acutis, testa dense papillosis.

Hab. in Nova Zelandia ad Tavamakan et Waweia leg. Travers.

E. polyclonum Hausskn. Suffruticosum, radice lignescente simplici. Caule dodrantali a basi ad apicem ramoso, ramulis oppositis elongatis gracilibus subcorymbosis, purpurascente, remote foliato, tereti, incerto bifarium crispule-pilosiusculo. Foliis parvis ovato-oblongis, obtusis, sessilibus, cuneato-angustatis, inferioribus subintegerrimis reliquis paucidenticulatis, glaberrimis crassiusculis. Alabastris glaberrimis. Floribus pusillis terminalibus pallidis. Stigmate clavato. Calyce glaberrimo. Capsulis brevibus arcuatis glaberrimis erubescens, pedicellis brevissimis, fol. fulcr. brevioribus. Seminibus apice rotundatis, basi longe attenuatis, testa papillis brevibus dense obsitis.

Hab. in Nova Zelandia ad Otago leg. Hector.

E. pycnostachyum Hausskn. Suffruticosum, rhizomate pluricipiti; caule in parte infima kataphyllis remotis triangulari-lanceolatis acutis oppositis v. alternis obsito. Caulibus simplicibus, fere dodrantibus, subtetragonis, lineis 2—4 elevatis vix pilosiusculis notatis, purpurascentibus, densissime foliosis. Foliis inferioribus oppositis, ab initio basi connatis sed mox basi solutis, crassiusculis, oleoso-nitidis glaberrimis, pallide viridibus v. serius fusco-cinnamomeis, oblongis, in petiolum longe angustatis, margine subrevolutis, apice breviter triangulari acutatis, denticulis obtusiusculis repandis utrinque 4—5 munitis. Floribus parvis erectis in axillis foliorum suboccultis, racemum elongatum spicato-consertum formantibus. Stigmate clavato. Alabastris glaberrimis apiculatis, in foliis occultis. Capsulis brevibus glaberrimis crassiusculis, fol. fulcr. subaequilongis, pedicellis brevissimis 2 mm. longis. Seminibus apice applanatis, basin versus sensim attenuatis acutis, testa papillis subcapitalis dense obsitis.

Hab. in Nova Zelandia leg. Krull. — Waianau leg. Hector. Whitcomb's Pass 4300 ped. alt. leg. Haast.

E. diversifolium Hausskn. Caule herbaceo, in parte inferiore repente radicante, foliis suborbicularibus, breviter petiolatis, argute denticulatis glabris obsito, in parte superiore stricte erecto, tereti, glabro, non bifarium piloso, foliis majoribus ovato-lanceolatis, basi abrupte in petiolum brevissimum contractis, apicem versus sensim angustatis, 0·15 mm. longis, 0·04—5 mm. latis. Calycis laciniis glabris, tubo pilosiusculo. Stigmate clavato-capitato. Alabastris oblongo-ovoideis apiculatis, vix adpresso pilosiusculis. Floribus eis E. rotundifoliae submajoribus, terminalibus, erectis.

Hab. Van Diemens Land leg. Schayer. Hb. Berol.

E. confusum Hausskn. Pallide virens, radice tenui rosulifera. Caule stricte erecto simplici v. parum ramoso, inferne subglabrescente, superne pilis arcuato-inflexis, glandulosis crebris patentibus immixtis pubescente, tereti, lineis decurrentibus densius pubescentibus notato. Foliis rigidiusculis sessilibus parum nervosis, inferioribus oblongo-lanceolatis obtusis, vix remote denticulatis, superioribus basi angustatis, acutiusculis, vix pilosiusculis. Floribus mediocribus erectis. Stigmate clavato. Capsulis glanduloso-pubescentibus, pedicellis fol. fulcr. dimidio brevioribus. Seminibus apice rotundato-umbonatis, basi obtusis, dense breviter papillois.

Hab. in Armenia ruthenica versus Daraschitschan leg. C. Koch sub *E. virgata*. Ulutau in salicetis Hb. Petrop. sub *E. origanif.*

E. Griffithianum Hausskn. Radice brevi rosulifero. Caule simplici stricte erecto, remote foliato, apice subnutante, glaberrimo lucido, lineis glabris elevatis e foliorum marginibus decurrentibus notato. Foliis glaberrimis lucidis crassiusculis sessilibus, e basi dilatato breviter in apicem subobtusum angustatis, leviter repando-denticulatis, ca. 3 cm. longis, 1 $\frac{1}{2}$ em. latis. Alabastris glaberrimis ovoideo-oblongis acutis, non constrictae apiculatis, basi applanatis. Floribus parvis carneis erectis. Stigmate clavato. Calyce glaberrimo. Capsulis crassiusculis glaberrimis, brevissime pedicellatis. Seminibus obovoideo-oblongis apice rotundatis, basi obtusiusculis, testa densissime papillis brevibus rotundatis obsitis. Affine *E. minutiflora* m.

Hab. in Affghania ad Hadjiyuk et ad Bamian leg. Griffith nr. 1227 Hb. Hock. Benth. Petrop.

Vimariae m. Octob. 1878.



Beiträge zur Kenntniss der adriatischen Algen.

Von F. Hauck.

XI.

Nemacystus ramulosus Derb. et Sol. (Sur les organes reproduct. des Algues. — Annal. des scienc. 3. ser., Tom. 14, p. 269 pl. 33, fig. 14—17).

Rovigno (Istrien) auf *Cystosira* und *Possidonia* in der Litoral-region bis zu 5 Meter Tiefe. — Mai, Juni. — Selten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [029](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Epilobia nova. 148-151](#)