

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch vollständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden: 2. und 3. Jahrgang zu 1 fl. (2 R. Mark) — 9. bis 22. Jahrgang zu 2 fl. (4 R. Mark) — 23. bis 29. Jahrgang zu 5 fl. (10 R. Mark) — 30. Jahrgang 8 fl. (16 R. Mark). Bei Abnahme sämtlicher Jahrgänge von der Redaction, 20 Procent Nachlass.

Einzelne Hefte können nur vom laufenden und letztvergangenen Jahrgange abgegeben werden.

Von den bisher erschienenen 23 Porträts der „Galerie österreichischer Botaniker“ können einzelne Exemplare und zwar in Octav à 50 kr. (1 R. Mark) und in Folie auf chin. Papier à 1 fl. (2 R. Mark) abgegeben werden.

Skofitz.

(V. Schloessgasse 15.)

Silene Schlosseri Vuk.

Von L. v. Vukotinovic.

Inflorescentia cymosa; cyma densa; flores pusilli, 10—20—40 et ultra; verticillastris contiguis, vel inferiore remoto, infimo vero adhuc remotiore, paucifloro; petala alba, rotundata, emarginata, calyce multo longiore; calyx campanulatus; glaber pallide virescens ac saturatius striatus, segmentis rotundatis, hyalino marginatis, tenuissime fimbriato-ciliatis; pedicelli filiformes arrecti, breviter ac sparsim retrosum pilosiusculi, ad basim bracteolis duabus pallidis, hyalinis vel cartilagineis pubescenti villosulis ac ciliatis inclusi.

Cyma terminalis bracteolis duabus brevibus lanceolatis basim amplectentibus pubescenti-pilosellis suffulta; verticillastrum inferius pauciflorum bracteolis duabus aut quatuor foliaceis lanceolatis stipatum.

Caulis praesertim, strictus, teres, paucifolius, pubescenti pilosiusculus, superne glutinosus.

Folia virescentia, ima ad radicem conferta, spatulata, breviter acuminata, utrinque dense breviterque pilosiuscula, tuberculata, ciliata, in petiolum longum attenuata; caulina sparsa; tribus quatuorve paribus oppositis, decrescentibus, connato adpressis basi caulem nodoso-incrassatum amplectentibus, pubescenti villosulis; radix communis in caudiculos breves divisa et praeter plures caules floriferos turiones etiam foliorum sterilium edens.

Capula ovoidea, basi dilatata, sessili, apicem versus attenuata, glabra, pube et visciditate sub maturitate in pedicellis deficiente; verticillastris serius nec magis evolutis nec elongatis, sed aequaliter ac sub anthesi persistentibus; flores fine Junii initio Julii; lecta in pratis montanis in Javorje ad oppidum Fužine, 1875.

Zagreb (Agram), im November 1880.