

Oesterreichische Botanische Zeitschrift.

Die österreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit 8 fl. öst. W.
(18 R. Mark)
ganzjährig, oder mit
4 fl. öst. W. (8 R. Mark)
halbjährig.
Inserate
die ganze Petitzeile
15 kr. öst. W.

Organ

für

Botanik und Botaniker.

Nº. 2.

Exemplare
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
blos bei der Redaktion
(V. Bez., Schlossgasse Nr. 15)
zu pränumerieren.
Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
sowie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXXI. Jahrgang.

WIEN.

Februar 1881.

INHALT: *Seseli Malyi.* Von Dr. Kerner. — Mykologisches. Von Dr. Poetsch. — Botanisches. Von Hansgirg. — Hymenomycetologisches. Von Hazslinszky. — Plantae novae. Von Ganderer (Fortsetzung). — Ausflug auf den Jauerling. Von Dr. Solla und Dr. Wichmann. — Flora des Etna. Von Strobl (Fortsetzung). — Literatur Ungarns. Von Dr. Börbás. — Literaturberichte. — Correspondenz. Von Kempf. — Personalnotizen. — Sammlungen. — Botanischer Tauschverein. — Inserate.

Seseli Malyi.

Auctore A. Kerner.

*Seseli e sectione Euseseli DC., caule rigido humili ru-
moso, ramis elongatis divaricatis erecto-patulis nudis superne
incrassatis striatis puberulis, foliis glaucis rigidis, inferioribus
circitu ovatis bi- tripinnatisectis, lacinias brevibus linearibus
acutis margine scabris, petiolo brevissimo supra plano vel con-
vexusculo vaginato, foliis summis ad vaginas reductis, umbellae
planae radiis 6—12 confertis subaequalibus angulatis puberulis,
involucro oligophyllo, involucelli polyphyllo foliolis lanceolatis
umbellulam aequantibus, calycis dentibus minutis, stylopodio
pulvinato brevioribus, petalis albis externe saepissime rubentibus,
fructibus ovalibus glabris, jugis utrinque quinis obtusiusculis,
valleculis 1—3 vittatis. ☺*

Hab. in confinibus Croatiae et Dalmatiae in jugis Vellebith. Supra arborum limitem in rupestribus apricis calcareis montis Malovan detexit et legit oculatissimus F. Maly, hortulanus aulicus Vindobonensis. — Floret aestate; in hortum Vindob. translatum Jun. Jul.

Descr. Bienne. Radix fusiformis ramosa. Caulis humilis 60—100 mm. altus farctus rigidus in basi ramosus subcaespitosus, ramis approximatis alternis divaricatis elongatis 40—70 mm. longis adscendentibus nudis infra umbellam incrassatis angulato-striatis et pube subfarinaceo obductis. Folia brevia glauca rigida. Foliorum radicalium

vagina lata membranacea extus nervosa, petiolus latus brevissimus infra angulato-striatus supra planus (nec canaliculatus), lamina 30—50 mm. longa, 20—30 mm. lata ambitu ovata bi-tripinnatisecta; foliorum caulinorum vagina 8—10 mm. longa ovata amplectens margine membranacea extus nervosa et pube subfarinaceo tecta, petiolus nullus, lamina ambitu oblonga pinnatisecta vel (in foliis supremis) in lacinulam linearem singularem reducta. Segmenta foliorum radicum et caulinorum rigida linearia 4—12 mm. longa, 1 mm. lata acuta subtus nervo subcarinata margine scabriuscula. Umbellae, ramis apice incrassatis incidentes, planae 6—12 radiatae, radiis 5—12 mm. longis crassis strictis erecto-patentibus angulato-striatis subfarinaceo-puberulis, involucro submonophyllo, foliolo lanceolato. Umbellae proteranthii ramos primarios terminantes ampliores floribus hermafroditis, umbellae hysteranthii ramos secundarios terminantes minores floribus abortu unisexualibus masculis, qua nota cum pluribus speciebus sect. *Euseseli* convenit. Umbellulae 6—12-florae, involucellis polyphyllis, foliolis distinctis aut vix basi subconnatis 4—5 mm. longis, 1—1.5 mm. latis umbellulam aequantibus vel paululum superantibus lanceolatis subfarinaceo-puberulis margine angustissimo pallido submembranaceo cinctis. Flores pedicellati congesti, pedicellis subaequalibus brevibus (1—3 mm. long.), ovario ovato puberulo demum glabrato, calyce minute quinquedentato, petalis apiculo inflexo emarginatis albis externe rubentibus, stylopodiis pulvinatis stylisque primum erectis dein divaricato-arcuatis atro-purpureis. Fructus glaber ovalis 2.5—3 mm. long., 1.5 mm. lat. jugis utrinque quinis convexo-filiformibus obtusis pallidis albicantibus, valleculis olivaceis, mediis univittatis, exterioribus planiusculis 1—2-, rarissime 3-vittatis, commissura late bivittata, seminibus semiteretibus.

Obs. — Affine *S. tortuoso* L. et *S. annuo* L. (*S. colorato*) — Differt illud caule elato tortuoso ramosissimo, ramis divaricatis brevibus infra umbellam non incrassatis, foliis ambitu triangularibus, petiolis supra canaliculatis, umbellarum radiis inaequalibus divaricatis, fructibus velutinis majoribus; alterum differt caule simpliciusculo, ramis gracilibus foliatis apice non incrassatis, foliis tenuioribus viridibus, foliorum inferiorum petiolis longis canaliculatis, umbellis 15—30 radiatis, fructibus acute-jugatis. — Longius recedunt reliquae species sect. *Euseseli* DC., praeter notas adductas prima fronte involucellis brevioribus flores non attingentibus distinguendas.

Species detectori Francisco Maly hortulano aulico Vindobonensi de floro Croaticae et Dalmatiae exploratione optime merito dicatum.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [031](#)

Autor(en)/Author(s): Kerner Josef Anton

Artikel/Article: [Seseli Malyi. 37-38](#)