

Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung).

- Carex pauciflora* Ligthf. Johanneshütte, Drehberg, Stechpläne, Leiterberg, Abhänge der Hohen Heide.
- *muricata* L. Neureisch, Teltsch, Hradisko, Gross-Meseřitsch. Balin, Bystřitz, Zubstein, Neustadtl, Frischau im Walde Kozlowka, U křiwého Jaworu, Saar, Schlaghammer, Mielkowitz.
- *leporina* L. Neureisch (Polanka, Jezbiny etc.), Teltsch, Borowná, Unt.-Dworce, Wolschy, Krahultschy, Jawořice, Hradisko, Ratkau, Strachoňowitz, Friedrichshof, Radienitz, Mitron, Wald beim Thiergarten nächst Střitesch, Bischowetz, Dwořischtie, Bystřitz (Spitalský Wald, Zubstein etc.), Vitochow, Zwole, Neustadtl, Wlachowitz, Bratraňowská bei Lhotka, Frischau, Gebirgsgruppe der Žakowá hora, Kadau, Kaiserstein, Saar, Schlaghammer, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz (am Starkow etc.), Jaworek, Heinzendorf, Schwarzberg, Neuhausberg, Dreistein, beim Schlägelbrünnel, bei der Kaiserbaude, Gräfenberg, Drehberg, Brünnelheide, Rother Berg, Kl. Seeberg, gr. Kessel, Schlössel, beim Franzens-Jagdhaus.
- *echinata* Murr (1770). Wolschy, Jawořice, Sümpfe beim Teiche Gross-Pařezitý nächst Řasná, Strachoňowitz, Balin, Bystřitz, Vitochow, Zwole, Kaiserstein, Saar, Beberек, Schlaghammer, Schwarze Grabenlehne, Rother Berg, Gr. Seeberg.
- *canescens* L. Heinzendorfer Gründe unterm Schwarzberg, Schwarz-Neuhausberg, Glatzer Schneeberg, Köpernik, Hochschar, Leiterberg; Altvater (Oborny)!
- *remota* L. Hradisko bei Wolschy (Exemplare straff und zwer-gig), Wald beim Teiche Sýkowec bei Dreibrunn, Brataňowská bei Lhotka, Frischau Wald „u křiwého Jaworu“, Žakowá hora, Wald rovné doly bei Kadau, bei den Kalkbrüchen bei Saar, Beberек.
- *cyperoides* L. Teltsch, spärlich beim Teiche in Wiechnow.
- *Schreberi* Schrank. Im Oberen Teesthal, Winkelsdorf.
- *Goodenoughii* Gay (1839). Ob. Fl. v. M. u. ö. Schl. p. 178. Zwolleňowitz, Borowná, Strachoňowitz, Černitz, Jawořice, Řasná, Niwky bei Střitesch, Ob.-Bory, Zwole, Neustadtl, Dreibrunn, Pohledetz, Wald u křiwého Jaworu, Beberек, Schlaghammer, Schwarzberg, Schwarze Koppe, Goldenstein, Schweizerei, Peterstein, Hohe Heide, Var. *turfosa* Fr. l. c. Sümpfe beim Gr. Pařeritý bei Řasná, Wlachowitz, Heinzendorf.
- *pilulifera* L. Teltsch, Černitz, Jawořice, Kl.-Lhotta, Borowná, Wolschy, Schwarze Grabenlehne, Drehberg.

Carex atrata L. Hohe Heide, Heiligenhübl.

— *limosa* L. Johanneshütte, Drehberg, Keilig, Stechpläne, Gr. Seeburg; massenhaft am Wege vom Köpernik zum Fuhrmannsteine (Oborny)!

— *flacca* Schreb. Hradisko, Jawořice, Strachonowitz, Borowná, Witochow, Bystritz, Zwole.

— *panicca* L. Borowna, Gutwasser, Gr.-Vanau, Jawořice, Kl.-Lhotta, Neustadtl, Pohledetz, Beberек, Neudeck, Schlaghammer, Heinzendorfer Gründe unter dem Schwarzberge, Kratzdorf, Altstadt, Goldenstein.

— *pallescens* L. Sehr verbreitet im G. Polanka bei Neureisch, Panské niwy etc. bei Teltsch, Wolschy, Hradisko, Strachonowitz, Jawořice, Rásná, Swietlá, Radienitz, Smrtschek, Wiechnow, Bystritz, Witochow, Zubstein, Ždánitz, Zwole, Neustadtl (Ochoza, Kaiserstein etc.), Wlachowitz, Bratraňowská bei Lhotka, Dreibrunn, Rokytná. Kozlowkawald bei Frischau, u křiwého Jaworu, beim Silberbrünnel, Pohledetz, Saar, Schloss Saar, Ingrowitz, Altstadt, Schwarze Jagd, Heinzendorfer Gründe, Schwarzberg, Dreistein, Schlägelbrünnel, Kaiserbaude, Drehberg, Brünnelheide, Rother Berg, Leiterberg, Altvater, Ob. Teesthal.

— *silvatica* Huds. Radienitz, Frischau, Gebirgsgruppe der Žákowá hora.

— *flava* L. a. *macrorrhyncha* Čelak. Prodr. Fl. Boh. p. 71. Borowná, Wolschy, Rásná, Bystritz, Ždánitz, Witochow, Zwole, Wlachowitz, Pohledetz, Altstadt, Heinzendorfer Gründe unterm Schwarzberg, Goldenstein, Drehberg, Brünnelheide, b. *brachyrrhyncha* Čelak. l. c. Neustadtl.

— *Oederi* Ehrh. Rásná. Sümpfe beim Gr.-Pařeritý nächst Rásná, Strachonowitz, Wiechnow, Zwole; Rokytna, Schwarze Sümpfe bei den Schwarzawaquellen, Dreibrunn, Brünnelheide, Peterstein; Altvater (v. Uechtritz)!

— *vesicaria* L. Verbreitet (Oborny); so: Zwolleňowitz, Borowná, Rásná etc.

— *ampullacea* Good. a. *normalis* Čelak. Prodr. Fl. Boh. p. 73. Wolschy, Ochoz bei Bystritz, Witochow, Zwole, Neustadtl, Brünnelheide, Stechpläne, Oppa unterhalb der Schäferei.

— *riparia* Curtis. Teltsch, Neustadtl, Saar.

— *hirta* L. a. *hirtaeformis* Pers. Zwolleňowitz.

Scirpus compressus Pers. Zerstreut auf Wiesen bei Rotkau nächst Bystritz, Zwole, Neustadtl.

— *maritimus* L. Teltsch, Datschitz, Wiechnow, Bystritz, Zwole, Ober-Rožinka, Neustadtl, Wlachowitz, Pohledetz, Saar, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz, Jaworek.

— *setaceus* L. Radienitz, häufig bei Unt.- und Ob.-Bory, Pikaretz.

— *acicularis* L. Teltsch, Černitzer Teich, Teich bei Wiechnow, Neustadtl.

Eriophorum vaginatum L. Schwarzberg, Neuhausberg, Dürre Koppe, Glatzer Schneeberg (Opiz)! bei der Kaiserbaude, Drehberg,

Rother Berg, Keilig, Stechpläne, Gr.- und Kl.-Seeberg, unter der Schäferei, Hohe Heide.

Eriophorum latifolium Hoppe. Häufig, selbst noch bei Heinzendorf und im Aufstieg zum Schwarzberg.

Juncus glaucus Ehrh. Teltsch, Bystřitz.

— *filiformis* L. Hradisko „nad brankou“ am Wege nach Gutwasser, Unt.-Bory, Pikaretz, Witochow, Bystritz, Zwole, Neustadtl, Altstadt, Neuhausberg, Schwarze Koppe, Hochschar, Gr. Seeberg, Peterstein, Hohe Heide.

— *trijidus* L. Häufig auf den Seefeldern zwischen Fuhrmannstein, und Köpernik (für beide letztern schon Oborny), Johanneshütte, Drehberg, Hohe Heide.

— *supinus* Mönch. Teltsch, Pikaretz, Ober- und Unt.-Bory, spärlich beim Teiche in Wiechnow.

— *squarrosus* L. Ochoza bei Neustadtl, Wlachowitz, Ober-Rožinka.

— *compressus* Jacq. Teltsch, Gr.-Wanau, Wolschy, Radienitz, Ob- und Unt.-Bory, Zwole, Neustadtl, Saar, Altstadt.

— *bufonius* L. Gemein und noch um Altstadt.

Luzula pilosa DC. Teltsch, Hradisko, Bystřitz, Zwole, Neustadtl, Saar.

— *silvatica* Gaud. Dürre Koppe, Schwarze Koppe, Wald bei der Urlichshütte; Glatzer Schneeberg (Opiz)! Schlägelwald, bei der Kaiserbaude, Hochschar, Wald unter dem Drehberge bei Niederthomasdorf, Drehberg, Schwarze Grabenlehne, Rother Berg, Keilig, Uhustein, Kl.- und Gr.-Seeberg, Peterstein, Hohe Heide, Schlössel.

— *multiflora* Lej. Řasná, Jaworice, Strachonowitz, Wiechnow, Zwole, Neustadtl (Ochoza etc.), Pohledetz, Kaiserstein, Kozlowkawald bei Frischau; Var. *fusconigra* Čelak. Schwarzberg, Glatzer Schneeberg, Leiterberg, gr. Kessel.

— *sudetica* Presl. Dürre Koppe; Glatzer Schneeberg (v. Uechtritz)! Leiterberg, Altvater, Peterstein, Hohe Heide.

Lilium martagon L. Altstadt, Kratzdorf, Stubenseifen.

Gagea arvensis Schult. Teltsch (vorgelegt).

Allium sibiricum Willd. Brünnelheide, Gr.- und Kl.-Seeberg, Heiligenhübl, Saugraben beim Franzens-Jagdhaus.

— *oleraceum* L. Neureisch, Černitz, Urbanau, Gr.-Meseřitsch, Wien, Bystřitz, Saar.

Streptopus amplexifolius DC. Schwarzberg, Neuhausberg, Dürre und Schwarze Koppe, Schlägelwald, bei der Kaiserbaude, Fuhrmannstein, Drehberg, Schwarze Grabenlehne, Rother Berg, Gr.-Seeberg, Heiligenhübl, Schlössel, Wilder Stein bis ins Ob.-Teesthal hinuntersteigend und noch bei Wiesenberg, im Aufstieg zum Schmalen Kamm.

Smilacina bifolia Desf. Gemein im g. b. G. hoch hinaufsteigend, so auf der Schwarzen Koppe, bei den Ochsenwiesen, am Keilig; ja sogar am Altvater (Oborny)!

Convalaria majalis L. Makrotin, Černý les bei Schloss Saar, Bebe-

rek bei Schlaghammer, Saar, Altstadt und noch am Schlössel!
nächst dem Franzens-Jagdhause.

Polygonatum verticillatum All. Kozlowkawald bei Frischau, u křiwého Jaworu, Žáková hora, Cikhay, Černý les bei Schloss Saar, Schwarze Jagd, Schwarzberg, Neuhausberg, Schwarze und Dürre Koppe, Glatzer Schneeberg, Goldenstein, Lindewiese, Freiwaldau; bis auf die höchsten Gipfel (Oborny), so Altvater etc. und noch beim Franzens-Jagdhaus und von da bis ins Ob.-Teesthal und Winkelsdorf hinuntersteigend.

Paris quadrifolia L. Gutwasser, beim Bächlein unterhalb und auf der Jawořice, Urbanau, Radienitz, Zlatkow bei Bystřitz, Neustadtl (Ochoza etc.), Frischau, u křiwého Jaworu, Žáková hora, Wald oberhalb der Rumpold'schen Mühle, Rovné doly bei Kadau, Saar, Kratzdorf, Ob.-Teesthal, Winkelsdorf, Reutenhau.

Veratrum lobelianum Bernh. Kratzdorf, Heinzen-
dorf, Stubenseifen, Altstadt, Schwarzberg, Neuhausberg, Schwarze Koppe, Wald bei
Thomasdorf.

Triglochin palustris L. Nedwieditz.

Butomus umbellatus L. Mähr.-Budwitz.

Orchis globosa L. Am Hochschar.

— *maculata* L. Gräfenberg, Freiwaldau, Thomasdorf, Winkelsdorf, Wiesenberg.

— *latifolia* L. Teltsch, Hradisko, Gross-Meseřitsch, hier namentlich häufig bei der Macowá-Kapelle, Křižanau, Bystřitz, Witochow, Zwole, Ober-Rožinka, Neustadtl, Rokytna, Pohledetz, Reutenhau, Wiesenberg.

Gymnadenia conopsea R. Br. Stubenseifen, Goldenstein, bei der Kaiserbaude; Streutenhau (Zelenka).

— *albida* Rich. Dürre Koppe, Hochschar, Keilig, Gr.- und Kl.-Seeberg, Hohe Heide.

Platantheria viridis Lindl. Neuhausberg, Köpernik, Freiwaldau.

Epipactis latifolia All. Neureisch. Teltsch, Wolschy, Střitesch, Černý les bei Schloss Saar, Hansdorf, Altstadt häufig, Kratzdorf, Goldenstein, Brand Ulrich bei Niederlindewiese, beim Franzens-Jagdhaus, Reutenhau, Wiesenberg.

Neottia nidus avis Rich. Kratzdorf, Altstadt, Stubenseifen, Heinzen-
dorf, Schwarzberg.

Leucojum vernum L. Im Parke bei Teltsch; Hostietitz (Krejč).

Callitriche verna Kützing. Teltsch, Gross-Meseřitsch, Ober-Rožinka, Zwole, Neustadtl, Jiřikowitz. Saar, Neudeck.

— *stagnalis* Scop. Unterhalb der Jawořice, Saar.

Euphorbia falcata L. Als Seltenheit im b. G. bei Wolschy.

— *virgata* W. et Kit. Angetroffen bei Mähr.-Budwitz, fehlt sonst fast gänzlich dem b. G.

— *cyparissias* L. Diese gemeine Art hat Prof. Zelenka als Seltenheit für Freiwaldau angetroffen.

Mercurialis perennis L. Teltsch (Panské niwy etc.), Stamberg bei Kl.-Lhotta, Kl.-Deitz, Unt.-Dworce, Střitesch, Bystřitz (Wald

„Špitalský“ und Zubstein), Černý les bei Schloss Saar, Ingrowitz, am Starkow bei Neu-Ingrowitz, Goldenstein und noch bei der Kaiserbaude und am Brand Urlich bei Lindewiese.

Salix vitellina L. Teltsch, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz.

— *viminalis* L. Teltsch, Saar, Ingrowitz.

— *cinerea* L. Teltsch, Altstadt.

— *silesiaca* Willd. Drehberg.

— *aurita* L. Mähr.-Budwitz, Teltsch, Borowná, Mrakotín, Wolschy, Gr.-Meseřitsch, Bischowitz, Neustadtl, Lhotka, Bach Stavištie bei Saar, Schloss Saar, Blanda.

— *repens* L. Mielkowitz bei Saar.

— *hastata* L. Abhänge des Führmannsteins.

— *viminalis* × *purpurea* Wimm. a. *rubra* Huds. Saar unter den Eltern.

— *caprea* × *aurita* Gr.-Meseřitsch, Ochozawald bei Neustadtl, Černý les bei Schloss Saar, Blanda.

Rumex maritimus L. a. *aureus* With. Čelak. Prodr. Fl. Boh. p. 157. Pikaretz, Saar.

— *sanguineus* L. Pernstein, Saar.

— *obtusifolius* L. a. *silvestris* Wallr. spec. 1. c. p. 159. Neureisch, Krahultschy, Wolschy, Uřinau, Swietlá, Řasná, Balin, Kadau, Altstadt, Niederthomasdorf, Rother Berg, Ob.-Teesthal. b. *agrestis* Fries l. c. Dieser Form stehen die Pflanzen von Zwole sehr nahe.


— *arifolius* All. Kratzdorf, Altstadt, Heinzendorf, Stubenseifen, Schwarzberg, Neuhausberg, Dürre und Schwarze Koppe, bei der Urlichshütte, vom Franzens-Jagdhaus bis zur Vaterbaude und den Köhlerhütten im oberen Teesthale und vom Drehberg hinunter bis in den Wald bei Niederthomasdorf.

Polygonum bistorta L. Verbreitet, aber nicht überall. Teltsch, Bystřitz, Neustadtl, Wlachowitz, Pohledetz, Mielkowitz, Saar, Schlaghammer, Neudeck, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz, Jaworek, Borownitz, Altstadt, Heinzendorf, am Glatzer Schneeberge und auf allen benachbarten Gipfeln. Häufig im Verlaufe des Gesenkes (Oborný)! bis nach Winkelsdorf.

— *amphibium* L. a) *natans* Mneh. Ob. Fl. v. M. u. ö. S., b) *terrestre* Leers l. c. In beiden Formen bei: Ober-Bory, Bystřitz, Neustadtl, Dreibrunn, Ingrowitz. In der Form a. beobachtet bei: Černitz, Řasná, Pohledetz, Saar.

— *mite* Schrank. Pohledetz, Saar, Ingrowitz.

(Fortsetzung folgt.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [035](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora der böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. 202-206](#)